






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.461





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.461





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.461




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.461

1.6.461







Δ
A
XIV
SCHWEN

106045



3 148



Stirpium & Fossilium
SILESIÆ
CATALOGVS.
In quo præter etymon, nata-
les, tempus; Natura & vires cum varijs
experimentis assignantur:

Concinnatus per
CASPARVM SCHVVENCKFELT,
Reip. Hirsbergensis Phys. Ordinar.

CVM INDICE REMEDIORVM.

PSAL. LXV. & CIV.

DOMINVS ditat Terram omnis generis
Frugum ac Terræ nascentium varietate
In cibum & Medicinam.

M.



DC.



LIPSIÆ,
IMPENSIS DAVIDIS ALBERTI
Bibliopolæ Vratislaviensis.

Cum gratia & privilegio Sacr. Cæs. Maiest.

Medicum vel maximè sollicitum esse decet, vt simplicis materiæ medicæ ac stirpium notitiam sibi paret, ne videlicet à Rhopopolis aut Pharmacopœis ipsi imponatur: deinde vt fieri poterit, ab externis abstineat, domi verò natis vtatur, quæ & paratu facilia sunt, & adulterari aut contaminari facile nequeant.

II

ANTIQVA GENE-
RIS NOBILITATE, ERVDI-
TIONE AC OMNI VIRTVTVM
LAVDE PRÆSTANT. VIRO, DN.
CASPARO à VVARN-
SDORFF in GVSMANSDORFF,
EQVITI SILESIO, ET IVDIC.
XII VIR. DVCC. Suidnic. & Iaur. Assessori
digniss. Domino ac compatri suo
S.

Homo, Vir nobilissime, ad
imaginem Dei summa in dignitate
& nobilitate, mente purus, corpore
sanus à Creatore suo conditus; in ea
perfectiōe & excellenti statu saluus
& incolumis in æternum perstitisset,
Opificiq; suo deuinctus ac coniun-
ctus mansisset, nisi de arbore ex mandato Conditoris sui
fugienda, dolo & astutia Serpentis seu Draconis veteris
Diaboli deceptus degustasset, & à præcepto Diuino aber-
rasset. Ex cuius esu, ita se corripit Adamus, vt non solum
Diuine Sapientiæ, Scientiæ, Bonitatis Imaginem, qua in eo
relucebat, miris modis obfuscauerit, inquinaueritq; ve-
rum etiam infinitas Corporis & Animæ arumnas ac crucia-
tus Mortis prænuncios, Mortem deniq; ipsam cum corpora-
lem tum spiritualem in suum caput attraxerit, & per tra-
ducem in omnes posteros suos propagarit ac deuoluerit.
Mens enim lucis Diuina plena, non secus ac riuus ex puro
fonte sapientiæ cælestis emanans, fœdas cloacas Diaboli præ-
ter-

4 2

EPISTOLA

ter lapsus, adeò inquinata ac defædata fuit, ut non amplius aque limpida, sed lacuna turpis nomen, i. e. Mentem tenebrarum plenam obtinuerit. Corpus etiam integrè & perfectè sanum, verbo & mandato Maiestatis suprema non acquiescens, & salubri diatâ summi ac verissimi Animi Corporisq. Medici neglectâ, cibum, qui sue natura non conueniebat sed summè aduersabatur, appetens, comedensq., adeò deprauatum & enervatum fuit: ut, quod ante existebat purum, iam sordidum; quod erat robustum optumeq. valebat, iam infirmum ac voregè; quod deniq. integrum laudabili sanguine ac probis humoribus refertum, iam confractum & cacochymicum euaserit, milleq. morbus aptum ac obnoxium. Circundant hoc corpus imbecillum & fragile infiniti morbi & dolores cruciatusq. innumeri: Animum percellunt, & à sua sede dimouent cura, metus, sollicitudines, affectus inordinati & passionés infinite. Hinc tot tanteq. miserie, tot clades & calamitates in uniuersum genus humanum redundârunt.

Adamus miser & inobediens ob crimen lese Sacrosanctæ Maiestatis Diuina, nequissimi & atrocissimi hostis vinculis ac compedib. adeò irretitus, constrictus & horrendo naufragio quasi submersus, ut vi suapte, ex tanta ruina assurgere, & tam horrendo emergere naufragio, conatu ac robore proprio, nunquam se extricare vel expedire posset; nisi Deus clementissimus ac summè misericors eum, in tenebris & umbra mortis iacentem, prostratum, languidum, afflictum ac penè exanimem, facta promissione de Messia liberatore & seruatore, solatū recreasset, crexisset, subleuasset. Ob id Paradiso ciectus & propter inhærentes peccati reliquias in hanc terrenam patriam, spinam & carduum proferentem, ut eam coleret, collocatus fuit; quò nimirum toto huius miserabilis vite curriculo, tanquam in
stadio

DEDICATORIA.

stadio laborioso perpetuis grauiſſimisq; arumnis diuexatus ad cœlestem immortalitatem toto pectore aspiraret & anhelaret.

Noluit tamen Maximus Rerum Opifex lapsum Hominem, in hoc Mundo prorsus deferere, sed in illum (promissione Messiae, in quo Adam ac posterius eius reconciliarentur & vitam aeternam adipiscerentur, recreatum) suae bonitatis & clementiae munera ad vitam conseruandam, protegendam, defendendam copiosè stillauit, & rebus necessarijs abundè prospexit, Creaturis seu operibus manuum suarum eum Psalm. 8. v. 7.
praefecit. Omnia sub pedibus eius posuit. Greges & armen- Sapient. 9. v. 2
ta quotquot sunt, etiamq; bestias agrestes, volatilia cœli &
pisces maris. Omnes item herbas sementantes semen & o- Genes. 1.
mnes arbores. Vnde Psalm. 65. v. 10. 11. Visitas, Iehoua,
hanc terram & appetis eam, plurimùm ditas eam; riuo
Dei pleno aqua, paras frumentum illorum; quum ita pra-
paraueris, porcas eius irrigando, deprimendo liras eius.
Imbribus dissoluis eam, germini eius benedixis, &c. Vestiu- v. 14.
tur pascua gregibus, & conualles obteguntur tritico. Pra-
terea adeò gratiosè hominibus largitur altissimus, non so-
lummodo vitam restituens & subsidia vitae necessaria uti-
liaq; veluti panem, vinum, &c. suppeditans: sed etiam ut
sanè & iucundè viuerent, firmam valetudinem tuerentur,
aduersam seu lapsam recuperarent, ac morbos, qui ob pec-
catū innumeri irrepserant propulsarent, Medicamenta & Eccl. 38. v. 4. 6
remedia è terra produxit varia, & hominibus scientiā de-
dit, quā gloriosi efficerentur rebus admirabilib. ipsius. Tan-
dem ut commodè viuerent, Metallicis eos carere noluit di-
uina benignitas: ob id Metalla, Metallica succos cum liqui-
dos tum concretos, lapides & gemmas viscerib. a fibris ter-
rae implantauit: partim ad quotidianum vsum necessaria;
partim ad medicinam vtilia; partim etiam ad ornatum &

E P I S T O L A

Psalm. 104. voluptatem pertinentia, eruenda, effodienda, excoquenda. Quae omnia Psaltes seipsum ad Deum laudandum concitans elegantissimè perstrinxit, narrans à rebus creatis laudes eius. Iehoua, inquit, Deus mi, magnus es valde, &c. Irrigas montes è canaculis tuis, ut à fructu operum tuorū satiatur terra. Faciens ut germinet fœnum ad iumentum & herba ad hominis vsum seu ministerium, ut de promana cibum è terra. Vino latificas cor mortalis, nitidam efficis faciem oleo, & cibo cor mortalis fulcis.

Genes. 2. Hinc Philosophia naturalis & Medicina studium non ab Ethnicis, Aesculapio nimirum & eius patre Apolline primum inuentum excogitatumq; fuit, ut scriptis prodidit antiquitatis fabulositas, verum à summo rerum opifice & conseruatore originem traxisse, sacra pagina refert. Is enim ex mera gratia Adamo primo generis humani propagatori, omnium rerum creatarum cognitionem infudit, & ut singulas ipsarum formas pro imperio suo & conditione ipsarum appellaret, vsumq; earū posteros edoceret, concessit. Quamuis ante lapsum neq; insalubre neq; inhonestū fuit quicquam, quod postea propter peccatum & valetudini aduersum & probrosum effectum est. Tum enim amicti erant homines, ait Chrysostomus, admirabili gloria & quidem longè maiore, quam ut vestitus ullus eam ornare posset, omniaq; hominis valetudini, commoditati, utilitati, honori & voluntati ancillabantur: deniq; sic erant in terris homines, ut in cœlis Angeli; immunes à rerum istarum, quibus iam homo circumfluit, sollicitudine.

Huius iucunda utilis, summè necessariae scientiae posterorum industria aucta & exulta, antiquissimis temporibus apud omnes maxima fuit auctoritas & veneratio; ut & Reges potentissimos & magnanimos, illustresq; heroes eius amœnitate allectos non puduerit rem herbariam studiosè

DEDICATORIA.

dios excolere & stirpium naturam diligentius rimari: quod præter veterum historias sacra Biblia testantur.

Solomon Regum amplissimus, qui præter immensas opes eam consecutus est à Deo sapientiam ac rerum cognitionem, ut omnes sua ætatis homines doctrina antecelleret, in herbarum notitia mirificè excultus exactèq; versatus legitur: ac differuisse non solum de piscibus, alitibus, quadrupedibus, astris, sed de arboribus etiam & stirpibus à Cedro Libani usq; ad Hyssopum, qui egreditur è pariete, h. e. à minutissima herba ad procerrimas celsissimasq; arbores usq; omnia habuisse cognita & explorata.

Inter Ethnicos, præter belli gloriam, herbarum cognitione illustres fuerunt: Gentius Illyricorum Rex, Gentiana herbe appellationem indidit. Lysimachus Rex Macedoniae inuentor herbe Lysimachie, eam suo nomine insigniuit. Sic à Teucro Teucrium, ab Eupatore Eupatorium, à Telepho Mysie Rege Telephium, à Chirone Centauro Centaurium, & alia ab alijs, plurima dicta fuerunt. Artemisia Halicarnassi Regina, Mausoli Regis Carie vxor, alioquin præclari nominis mulier, Artemisiam plantam proprio nomine insignitam posteritati commendauit. Helenium herba, ab Helena, quod plantam primum seuerit, appellationem mutuata est. Circeam à Circe, quam Poeta Solis fingunt filiam, nomen accepisse, autores prodiderant. Mithridates Ponti Rex, ut tanta & animi & corporis, ut sex iugis equos regeret, duarum & viginti gentium ore loqueretur, propter eximiam herbarum notitiam & singulare Antidotum contra venena morbosq; omnes contagiosos præsentaneum, illius nomine Mithridaticum dictum, immortale nomen est consecutus, à quo & Scordium Mithridatica herba dicta fuit.

Hos imitati sunt inter Græcos pleriq; sapientes, cum
facul.

EPISTOLA

facultatis præstantiam, dignitatem & usum intelligerent, in dignoscendis ac cognoscendis simplicibus multum insudârunt, ac ut eorum veram legitimamq; cognitionem assequerentur, per multas remotas regiones perlustrârunt, varijsq; sese vite periculis commiserunt. Unde stirpium & animantium historiam earumq; vires longo ac multo usu perceptas, ut posteritati inseruirent, literis memoriaq; mandârunt. Super sunt hodie utiles Aristotelis, quos de plantis conscripsit, libri duo; de animalibus vero complures, in quibus animantium naturas, partes, ortus, ratione & via est persecutus. Theophrastus Aristotelis discipulus suam de stirpibus sententiam multis libris explicauit. Quorum studium secutus Dioscorides, arborum ac herbarum figuras & vires posteris reliquit. Hippocrates Coss, auditor Democratis, artem medicam in lucem reuocauit, sexaginta libris omnem medicina scientiam complectens. Cuius doctrinam omnis solidioris medendi artis fundamentum & vniuersam veterem medicinam Galenus Pergamenus Medicorum post Hippocratem facile princeps, ordine, methodo præceptisq; multifariam excoluit illustrauitq; & argumentis disertissimè confirmauit, oratione verò diserta ac eleganti uberrimè exposuit, & remediorum simplicium compositorumq; descriptionibus locupletauit copiosissimè.

Græcorum sectatores fuerunt Arabes, qui parum ad artis constitutionem contulerunt, & quicquid aut lectione aut imitatione dignū habent, ex illorum libris hauserunt.

Auicennam, è stirpe regia natum & Bitynia regem, eminentissimi ingenij virum, de arte medica benè mereri voluisse, monumenta ingenij, voluntatis speculum sunt. Auerroys Arabs, Auicenna amulus libro Colliget dicto, in quo totam fermè medicinam complectitur, de alimentorum & medicamentorum facultatibus quoq; agit, & insignio-

DEDICATORIA.

signiorum stirpium vires ex Galeni libris alphabetico ordine recenset. Iohannes Damascenus, filius Mesue librum edidit de simplicibus pharmacis. Rhazis volumen de Re Medica in nouem libros digestum condidit, quorum tertius Alimentorū & Simpliciorū medicamentorum facultates edocet.

Cū verò Ars medica nullis olim non seculis celebris tractata & exulta, Regnorum mutationibus, euerſionib. & bellis tam ciuilibus quàm externis, veletiam Medicorum incuria, superiori nostro seculo splendorem suum dignitatēq. amisit, & multū deformata ac neglecta iacuerit; complures atatis nostræ clarissimi viri & Rei Medicæ diligentissimi indagatores (re animaduersa) strenuam nauarunt operam, ut tam præclaram diuinamq. facultatē, deprauatam, incultam, discusſā superioris seculi caligine, è tenebris eriperent, sua luce & pristina dignitati restituerent: Ea propter in materia medica, maximè in studio rei herbariæ iam ferè neglecto plurimū laborarunt, & veterum scripta quasi sopita ac non tantū extincta rursus accenderunt, excitarunt, auxerunt & illustriora reddiderunt. Inter quos excelluere Hermolaus Barbarus patritius Venetus, vir eruditus & omni laude dignus, Dioscoridem nobis primus latinum reddidit elegantissima & Pliniana oratione. Antonius Musa Brassauolus: Iohannes Ruellius Gallus de natura stirpium libros tres elegantes, doctè & copiosè conscripsit: Amatus Lusitanus: Petrus Andreas Matthiolus: Nicolaus Monardus: Iohannes Fernelius: Otho Brunfelsius: Gualterus Ryfius: Euricius Cordus: Hieronymus Tragus: Leonhardus Fuchs: Conradus Gesnerus: Adamus Lonicerus & alij plurimi.

Nec recentiores deterruit maiorum diligentia, quò minus suam de Plantis ac Stirpibus, Animalib. ac Mineralib. sententiam scripto explicarent. Præ alijs nostra atate clari
b sunt:

EPISTOLA

sunt: Rembertus Dodonaus Mechliniensis Medicus Casareus historiam plantarū elegantissimam triginta libris distinctam restaurauit. Iacobus Dalechampius precipuus autor fertur vniuersalis historia plantarum Lugdunensis. Iohannes Costaeus vniuersalem stirpium naturam libris duobus comprehendit: item rariorum stirpium historiam conscripsit. Iacobus Theodorus Tabernemontanus herbarium duplici volumine & Thesaurum aquarum medicatarum teutonicè exarauit. Carolus Clusius Atrebas plantas Hispania & Pannonia publico scripto edidit: quas verò alat Aegyptus Prosser Alpinus edocuit. Matthias Lobelius aduersariam nouam & herbarium elegantissimè scripsit. Extant, Hortus medicus Ioachimi Camerarij medici Noribergensis, & Harcynia sylua Iohannis Thalij physici Northusani. Felix Platerus poliatros Basiliensis fabricam corporis humani, adiunctis aeneis typis perspicuè euulgauit. Lucubrationes de plantis, animalibus, & morbis medendis eruditas sub manibus habet. Iohannis Bauhini Ducis Wirtembergensis Archiatri, de thermis Bolenfibus Ducatus Wirtembergici scriptum prostat publicè: opus de consensu & dissensu stirpium iam dudum expectamus. Eius frater Gaspar Bauhinus medicus & professor in Basiliensi Rauracorum Academia, vir pietatis, eruditionis, humanitatis nomine nunquam satis laudatus, cui plurimum debent alumni Asclepiadei, ob insignem in arte medendi scientiam, rei anatomica & herbaria peritiam celebris, & in primis Itali, Gallis & Germanis notus, publici iuris fecit cum anatomica tum Botanica opera. Plura prepediem dabit.

Quandoquidem autem non omnis fert omnia tellus, & quauis prouincia, quauis regio sua peculiaria & singularia profert vel animalia, vel mineralia & simplicia: quæ ex varijs & remotissimis locis etiam colligere ac repetere

Deus

DEDICATORIA.

Deus voluit, ut inde creatoris mira erga genus humanum bonitas & clementia magis illucesceret, & qualibet gens seu natio haberet unde se suosq; aleret, ac Deum iugiter celebraret. Sic India orientalis aromatum & gemmarum præceteris orbis regionibus ditissima est, adeò ut is uniuersum orbem explere videatur. Gignunt Bengala Cardamomum, costum, nardispicam: Malauar Zingiber, Zedoariam, crocum, piper rotundum; longum vero in Bengala nascitur. Proueniunt in Guzarate Tamarindi, Cassia solutiua, Calamus aromaticus verus, costus cum Turpetho: in Iaua, Galanga: in Cambyia Myrobalanorū quatuor genera, Cassia solutiua, Anacardium, Lycium & Hyacinthi: in Cunda & Iaoa Cubeba: in Banda nuces myristica: in Pegu Lacca & Sapphyri præstantissimi: in Calambar Agallochum, & in Sian Benzoinum. Chinorum regio Rhabarbarum, Chinam radicem, Rheum ponticum, Galangam, Zedoariam, Moschū, Camphoram, Margaritas, Sericum, Oryzam, vasa Murrhina, &c. abundè fert. Moluccæ insula hodie ob aromatum copiam celebres, piper, macis, nucem moschatam, caryophyllos, santalum, ambram, camphoram & alia mittunt. Aloe nascitur præstantissima in insula, quæ eam gignit Zacotora, unde Socotorina dicta fuit. Taprobana seu Zeilan laudatissima totius orbis insula nucem moschatam, caryophyllos. Piper, ambarum, elephantes maximos, omnis generis præter Adamantem gemmas, rubinos, oculos catti, sapphyros, margaritas, auri, argenti magnam copiam gignit. Ex Corasone & Persia preciosissimus affertur lapis Bezoar dictus, aduersus omnia venena Mauritanorum testimonio antidotum omnium præstantissimum. Myrrham & thus, iuncumq; odoratum largitur Arabia. Sola Iudæa & Aegyptus Balsamiferaces. Tutia Alexandrina non Alexandria fit, sed ex Quirmon Ormuz defertur, dein Alexandriam deportatur,

E P I S T O L A

27 28

DEDICATORIA.

XII

mas Martarorum, Zibellinas, Luporum Ceruvariorum, vul-
pium albarum, nigrarum in uniuersam Europam transmit-
tit. Boemia Tritici, Lupuli, Argenti, Gemmarum, Alumi-
nis ferax. Hungaria nulli terrarum fecunditate, soli uber-
tate, Metallorum copia cedit. Germania olim barbara, in-
exculta; hodie multis prouincijs praeferitur. Præter omnes
enim res ad uitæ conseruationem necessarias, Metalla etiam
& lapillos preciosos, plurima simplicia, ut Daucum Creti-
cum, Siler montanum, Meum, Phu Ponticum, Absinthium
Romanum, Scordium verum, Gentianam & multa alia,
quæ ad vsus Medicos ex peregrinis locis acquirere oport-
tebat, hodie copiosè suggerit. Quid igitur de Ellysiorum
regione? Num hæc prorsus sterilis, nihil horum obtinuit?
Silesia prouincia quamuis exigua & Septentrionalior,
cùm partim sit montosa Suditorum montibus & Carpathi
iugis annexa, omnis certè Metalligignendi commoda & fe-
rax: partim plana & campestris, etiam segetibus ferendis
benigna & fecunda mater. Reticeo summam commodita-
tem & quæstum quem habet ex Lino, quod præ cæteris na-
tionibus satum adedò feliciter & ubertim fundit ager Silesio-
rum, ut vix locum seu ades reperiatis, siue arces Magnatum
conscendas, siue oppida perlustres, siue agricolarum villas
visites, siue deniq; Rusticolarum casas subeas, in quo linificia
tractari non animaduertas.

Hæc cùm attentius apud me meditarer, summi opificis
ineffabilem potentiam & inscrutabilem sapientiam in tot
tamq; varijs Animantibus, Plantis, Metallis, Lapidibus con-
siderans; ante annos amplius duodecim, cùm Basileâ Rau-
racorum, ubi per aliquot tempus Medicis & Philosophicis
operam dedi, in patriam Gryphibergam rediissem, Terræ
nascencia, Animalia, Fossilia Silesia, natura quadam incli-
natione ductus indagare cepi; Eaq; post elapso triennio,

b 3

Hirsch.

E P I S T O L A

*Hirschbergam regale & ob thermas vicinas nobile ad Bo-
berum fl. situm oppidum, ab Amplissimo Senatu in Physicum
ordinarium vocatus, commodiorem ob vicinos Sudetes &
Riphaeos naetus occasionem, diligentius scrutari perrexi:
ac totum id tempus mihi à curandis agris vacuum, in consi-
derandis Animalibus, inquirendis & legendis Plantis ac Me-
tallicis nulli labori parcens consumpsi. Quod sanè studium
cùm pleriq; Medici & alij insigni doctrina & Rerum usu
præstantes Viri perspicerent, sapius à me & verbis & literis
efflagitârunt, ut in communem utilitatem & patriæ lau-
dem, meas de Stirpibus ac Fossilibus observationes conscribe-
rem & publici iuris facerem. Hoc, ingenij mei tenuitatem
considerans cùm sæpe renuerem, tandem multoties admoni-
tus, ipsorum petitionibus & desiderijs, ut saltem aliquo mo-
do satisfacerem (illud Platonium: Non solum nobis natos
esse in memoriam reuocans) Earum Rerum, quæ vel in ipsis
Terræ visceribus nata effodiuntur seu effluunt; vel super
Terram & radicibus infixæ germinant; vel in Aëre Aquisue
liberè vagantur, non Historiam, sed solummodo Enume-
rationem, successivis horis conscripsi, eo animo, ut inde
mira bonitas & clementia Creatoris nostri manifesta fieret,
quæ (præter lucem verbi sui, discussis inscitie & ignorantie
tenebris accensam) patriam nostram benignè respexit, se-
cundum illud Tobie, c. 12. v. 8. Opera Dei reuolare gloriosum
esse: Dein ut doctioribus me ulterius progrediendi, ac dili-
gentius de his & alijs Natura arcanae arcana cogitandi oc-
casionem & ansam præberem.*

*Hoc meum de Plantis Opusculum, Vir Nobilissime, pro
more recepto, sub tuo nomine in lucem emittere volui, quod
animaduertim, Te Philosophicis & Medicis, imprimis Rei
herbarie studio summè delectari. Simul etiam ut aliquod
meæ gratitudinis testimonium redderem erga Te, propter sin-
gula-*

DEDICATORIA.

gularē beneuolentiā, quā me hactenus prosequuti estis, non solum Tu, Vir Nobiliss. & doctiss. sed nobiliss. & pientiss. pie memoria Mater tua; nobiliss. & doctiss. Fratres Tui Abrahamus & Iohannes à VVarnsdorff eruditione & virtute prestantes, mihi amantissimi. Qui cū in cœlestem patriam translati sint, æquum esse duxi, T. N. hoc, qualecunq; est, offerre, dedicare, consecrare. Quod paruum & exiguum munusculum ex animo N. T. obseruantiss. profectum, sereno vultu & placido beneuolentiss. animo accipere, & aduersus malignos Quorundam morsus patrocinio suo fideliter tueri atq; defendere velit, demissè humiliterq; rogo. Vale & me meosq; ut hactenus fecisti, Tibi cōmendatos habeas. DEVS Optimus Max. T. N. cum tota familia in multos annos sospitem atq; incolumem seruet. Dabantur Ceruimontij, ex Museo nostro, Anno 1600. Δεκαβέριος; eo die, quo ante annos 974. Mieslaus Polonorum Princeps primus Christianus, Gnesna, Christianismo per Baptismum und cum sua gente initiatus est, & idola ac simulacra Ethnicorum numinum confracta ubiq; & ex templis, mandato Regis eiecta sunt.

N. V.

A.

Caspar Schvvenckfelt Med. D.

Auto-



Autorum, quorum in hoc opusculo
fit mentio, catalogus.

Aduersaria	Hollerius
Aëtius	Iacobus Dalechampius
Amatus Lusitanus	Iacobus Syluius
Ambrosius Paracelsus	Iacobus Theodor. Tabernaemontan.
Andreas Cæsalpinus	Iohannes Aicholtzius
Andreas Cortusius	Iohannes Bauhinus
Andreas de Lacuna	Iohannes Costæus
Anguillara	Iohannes Fernelius
Apuleius	Iohannes Francus Phys. Camicensis
Archigenes	Iohannes Iacobus VVeckerus
Auicenna	Iohannes Kentmannus
C. Plinius	Iohannes Mesue
Carolus Clusius	Iohannes Ruellius
Caspar Bauhinus	Iohannes Thalius
Caspar Peucerus	Iulius Cæsar Scaliger
Christophorus Rumbaum Med.	Laurentius Scholtzius
Cicero	Leonhardus Fuch.
Columella	Lugdunensium historia de stirpibus
Conradus Gesnerus	Matthias Lobelius
Cornelius Celsus	Marantha
Cornelius Gemma	Melchior Guilandinus
Crateua	Otho Brunfelsius
Democritus	Palladius
Dioscorides	Petrus Andreas Matthiolus
Dominicus Heintz Pharmac. Suidn.	Petrus Crescæntius
Encelius	Petrus Bellonius
Euricius Cordus	Rembertus Dodonæus
Gabriel Fallopius	Rondeletius
Galenus	Scribonius Largus
Georgius Agricola	Sebaldus Laurea pharmac. Vratiss.
Guilielmus Salicetus	Serapio
Hermolaus Barbarus	Seruius
Hieremias Gesnerus	Theodorus Gaza
Hieronymus Cardanus	Theophrastus Græcus
Hieronymus Fracastorius	Theophrastus Paracelsus
Hieronymus Mercurialis	Tobias Fischerus Med. Suidnicensis
Hieronymus Tragus	Turnerus.
Hippocrates	

Dn. C A -

Dn.

CASPARO SCHVVENCK-
FELDIO PHIL. ET MEDIC. DO-
CTORI, REIPVBL. HIRSBERGENSIS
Medico, amico suo S.

NEc verò terra ferre omnes omnia possunt,
Diuersa arboribus patria.
Vt rectè & sapienter Maro noster ait, Vir clariss. ob idque
Agriculatoribus inprimis considerandos esse monet:

— *patrios cultusq, habitusq, locorum.*
Et quid quaq, ferat regio, quid quaq, recuset.
Hic segetes, illic veniunt felicius vna.
Arbori foetus alibi, atq, iniussa virescunt
Gramina: nonne vides, croceos vt Tmolus odores,
India mittit Ebur, molles sua thura Sabai?
At Chalybes nudi ferrum, virosq, Pontus
Castoria:

Cum enim cœlum terramq; I E H O V A condidisset,

Continuò has leges, æternaq, fœdera certis

Imposuit Natura locis.

Vt poetæ eiusdem verbis vtar.

Hinc tam vario & munifico luxu vnaquæq; Orbis pars plan-
tas peculiare, stirpes, arbores, animantia, metalla produxit.
Hinc Syriæ Iudæa Balsamum, Aromaticum copiam Libya, a-
spalathum Rhodus, palmam Babylonia, Cedrum Libanus,
Oleastrum Olympio, Cupressum & Dictamnium Creta, Pe-
trofelinum Macedonia, Lotum Euphrates, Papyrus Nilus,
Colocassiam Aegyptus, aliæ partes alia. Aurum optimum &
preciosos gemmarum thesauros, regiones suggerunt ad Meri-
diem orientemq; solem: cætera metalla illa quæ ad ortum &
occidentem respectant, vt vniuscuiusq; illarum Incolæ no-
tum faciunt, & rationibus confirmat Cardanus, quem à Sca-
ligero ob id iniquius reprehensum antecessor illius & artis
metallicæ magister optimus, Georgius Agricola tueri po-
test. In Hispania Bætica & Aethiopia laudatissimum aurum,
apud Suecos & Ostrogothos ferrum, ad Islandiam sulphur,
c alijs-

alijsq; in locis alia inueniri atq; è terræ visceribus erui scribens. Verum vt hæc nonnullis peculiaria sunt, & proprio q. munere attributa: ita etiam contrā, certis quibusdam destitui ea cernimus. Sic Orienti Minium cum Argento viuo, Aeolis æs & Plumbum, Africæ apros, ceruos, capreas, vrsos denegatos esse constat. Arcades thymo, Ægyptum Cerasis, Cretenses lupis, herinaceis, attagenibus, Scythas & Pontum asinis carere & peregrinationibus & literarum monumentis proditum est. Ac quamuis interdum hominum industriā quædam aliò translata sunt: tamen tanquam à nouerca tellure, minus clementer excepta, elanguerunt, vel contabuerunt, semper eo, quod ex natali solo assumptum fuerat, nomine retento. Sic ex Syria Vitellius attulit pistacia & zizypha, quæ Galenus *σνευὰ* nominat. Sextus Papinius. Sic à Damasco illius vrbe Damascena, à Thaso Thraciæ, nuces Thasiæ seu amygdala, à Castana Magnesiæ, Castaniæ, à Cretica Cydone Cydonia, à Carthagine Pœnorum, Punica mala, à Cerasunte Ponti Cerasia, nomen suum deduxerunt. Nec minus autores illi, hoc pacto, decus & memoriā sui consecraverunt immortalitati. Ab Alexandro rege, quæ prius Iouis dicebatur, nux regia appellari cœpit, ab Helena Helenium, à Mausoli vxore Arthemisia, à Gentio Illyriorum rege Gentiana, à Lyfimacho Macedoniæ Lyfimachia, à Telephio Milesiæ Telephium, ab Euphorbio Mauritanix Euphorbium, ab alijs alia suas nactæ sunt nomenclaturas. Neq; verò sine conditoris nostri consilio & prouidentia singulari, id accidisse putandum est, vt nempe arctior esset inter homines societas, & altera orbis pars, alterius ope atq; auxilio foueretur conseruareturq;. Galenū artis nostræ Principem (Hippocratem excipio) non puduit, Palæstinam ipsam & Syriam atq; Cyprum adire, vt Lemnium sigillum, Bitumen Iudaicum, omnisq; generis metalla rectius perfectiusq; cognosceret, vt ipse fatetur libro 1. de Antidotis & 3. de comp. med. per genera, ob idq; Medico exactam medicamentorū noticiā comparare volenti, necessariò peregrinandum, variasq; Orbis partes atq; regiones perlustrandas esse censet. Quin & pari studio strenuissimus miles Dioscorides, remotissi-

X
tissimās quāq; terras visere voluit, vt earum plantas, lapides, metalla, arbores, animalia, venena, & quæ medica ars requirit, indagaret & laboribus atq; scriptis suis posteritati, maiore commodo atq; fructu prodesse posset. At quid tu ista ad me? inquires. Ignosce obsecro, Vir clarissime, audacia in scribendo, pro ea quæ in te est humanitate, Ignosce inquam & si pecco da veniam. Et literis & sermone quorundam nunciarum mihi est (immò ex Teipso, cum aliquando in cura nobilis Dn. Balthazari à Gutsch in pago Langenau vnâ essemus, nec non cùm ad visitandæ vestræ officinæ Pharmaceuticæ munus ab amplissimo Reipubl. vestræ Senatu vocatus essem, coràm intellexi) Te hætenus magno labore, summo studio & industria singulari, plantas, radices, stirpes, metalla inquisuisse omnis generis, quæ vel alibi non habentur, & quorum parens videtur nostra Silesia, vel de quibus veluti proprijs gloriantur alij, & tamen hisce nostris in locis extant, & certo volumine consignata prope diem ea publicæ luci atq; vtilitati communicaturum. O facinus egregium, ô animum arti nostræ iuuandæ propensum. Crede mihi (nouî enim ingenium tuum eruditionem studium & labores) rem præstiteris magnam, & patriæ decoram, Medicinæ deditis vtilem, & quæ Tibi nomen & decus perenne paritura est. Perge modo atq; opus hoc matura, atq; foetu isto, Musis & Apolline propitio, quam primum nos bea. Neq; verere Momos, immò nec ipsam quæ summa petit & optima quæq; arrodit, Inuidiam. Perge & Dn. M. Pancratium Sussenbachium, M Kretzmerum, viros Reipublicæ vestræ clarissimos & mihi carissimos, Dn. etiam pharmacopœum & Balthazarum Schwabsdorff Chirurgum, ac si quos mei amantes esse nosti, meis verbis saluta. Vale. Dab. Svidnicij, ex Museo nostro XII. die Decembr. Anno M. D. XCIIIX. æræ Christianæ.

*Tobias Fischerus Philosophie
& Medicina Doctor.*

In Catalogum
DE STIRPIBUS ET FOSSI-
LIBVS SILESIAE

Clarissimi Viri
Dn. CASPARIS SCHVVENCK-
FELD PHIL. ET MEDIC. DOCTORIS
ac Reipub. Hirsberg. Physici Ordinarij.

*I*Tale quid iactas dotes, quid Galle, paternas,
Quæ quoque cum parili SILESIA laude tenet?
Hæc dubitas? Mibi testis adest SCHVVENCKFEL-
TIVS, ingens

Et Sophus, & medici Mystes honorus agri.

Hic etenim studio solerte, graviq; labore

Contulit, Elysus quas habet Orbis, opes.

En tibi cum varijs mineralia plurima plantis;

En Thermas: fontes en medicantis aque:

Ac quæ præterea terrâ effodiuntur operta,

Et gemmæ, & lapides, & vario æra sono.

Hoc paruo Promus felix hæc omnia libro

Explicat: hunc alacri volue, reuolue manu.

Dispeream, si non mecum mirabere dona,

Quæ Silesiaci continet ora soli.

Ergo quid, ante pedes quæ sunt, medicamina grata?

Spernimus, atq; alio quærimus illa loco

Non meliora: situ sed fors peiora vetusto,

Ægrotum fallunt quæ Medi:umq; simul.

Omnia

XI
Omnia non omnis fert terra. fatemur: at omni
Num terræ proſit, quod locus vnus alit,
Ambigo. Nam Natura ſuo ſic prouida nutu,
Cuiq; queat proprijs quò ſatis eſſe loco.
Dum modò Naturæ quæ ſint myſteria, cautâ
Ingeniti Genij diſcutiamus ope.
Illud idem mecum ſentis, medicaminis Augur
Eximie, & melici flos ſpecioſe chori.
Primus enim, primus Tu Slefidos abdita noſtræ
Non ſine difficili lecta labore canis.
At labor haud facilis veluti: ſic gloria perpes,
Quæ Tibi, quæ patrio prouenit inde ſolo.
O bene! nunc Gallis, Latijs nunc SLESIA certat,
Atq; triumphales geſtat opima comas.
O bene! ceu ceptum, ſic fauſtiter ito: iuuabunt
Conamen celebres artis honore viri.
SLESIA ſic per Te clarabitur: artibus hanc per
Præſtantes Clarijs: Tu per vtroſq; ſimul.

M. Caſpar Conradus
Vratiſl. Med. Cand.

IN CATALOGVM
Plantarum Silesiæ viri clariss. Dn.
CASPARIS SCHVVENCK-
FELDII, PHILOS. ET MEDIC. D.
& Hirsberg. Physici Ordinarij.

Non equidem dixim, nasci Tibi, Slesia flores,
Plantasq; nasci tot Tibi.
Nam Tibi flant raro Zephyri: Tibi sepius Ausler
Caurusq; perdit flosculos.
Nunc video: Medica suboles Schuuenckfeldius illas
Dum monstrat hoc libellulo.
O felix Mea Slesia. vix certare videtur
Tecum Italis, vix India.
Vix tanto numero profert Hispania flores,
Vix Gallia & vix Belgium.
Hoc nemo nouit: solus Schuuenckfeldius illos
Inuenit vnus flosculos.
Ecce tibi dicit loca, dicit nomina, quisq;
Nunc inuenire illas potest.
Tàm laudem Tibi conciliat Schuuenckfeldius amplam,
Nomenq; querit splendidum,
Vt quæ culta minus dicta es, cultissima dici
Iam terra possis, Slesia.
Ergo debbis Medico plus, Slesia tanto,
Quàm debet hic vel debuit?
Tempus ad exiguum, Tu Slesia sorte dedisti,
Vitam Tuo Schuuenckfeldio.
Sed Tibi perpetua dat viuere secula vite,
Debet quis ergò plura? quis?

Balthasar Exnerus Hirsbergius
Poëta Cæsar. & Philos. M.
SILE.

SILESIAE GEO-

GRAPHICA BREVIS

DELINEATIO.

Origo.

SILESIA QVASI ELYSIA MYTATA voce in sonum elegantiore, ab Elysa Iauan seu Iouis filio Nonnullis dicta fuit. Alij à confluxu Populorum nomen accepisse Silesios, suspicantur. Huius veteres Incolae, Quados, dein Lygios, præcipue verò Elysios & fortasse aliqua ex parte ad ripam Viadi, Manimos fuisse, Historici referunt. Qui, cum perpetuis migrationibus Populorum, creberrimis bellis & Attilæ tyrannide penè exhausti essent: Post eius interitum, desertis sedibus veterum Lygiorum & vicinorum Germanorum, Gens Sarmatica Henetica originis, ex amplissimis illis Regionibus, quæ nunc Rûssia vel Moscouia nomen habent, ab ipso Mari glaciali vsq; ad paludem Mæoridem se commouit, & duce Lecho, has terras occupauit, reliqujs incolarum, vt ipsorum acciperent Imperium, coactis.

Poloniæ Regno subiecta fuit, annis penè 860. Ante annos verò 250. circiter, propter discordiam Principum & ruinas Regni Poloniæ, auulsa à Poloniis Silesia, facta est sociæ Regni Boemici: quod olim ab eadem Gente Sarmatica, duce Zecho fuit constitutum, artibus ac consilio Iohannis Lucelburgensis Regis Boemici, qui fuit filius Henrici VII. Imperatoris, & Caroli IV. pater.

Situs seu Positus.

Ab ortu & septentrione Poloniam habet; à Meridie Morauiam & Boemiam tangit; ab occasu Luzatia terminatur.

Figuram obtinet ferè tetragoni, sed laterum inequalium. Longitudo eius, quæ est circiter miliarium 40. Germanic. valde superat latitudinem, quæ vix est miliarium viginti. Initium longitudinis est à gradu 32. ferè vsq; ad 36. & aliquot scrupula. Maxima latitudo est graduum ferè 52. Minima paulò minor quàm graduum 50.

Latus Orientale est à fontibus Vistula, qui sunt ad radices Carpathi montis, non procul ab oppido Teschenæ vsq; ad fontes alterius fluij non magni Brednicij, non procul ab oppido Benicno. Hoc latus ferè est miliarium 20.

Occidentale latus statuitur à Lusa, Quissoq; fluijs, vsq; ad confluentem Boberæ & Viadi, quæ est ad oppidum Crosnam. & est limes Silesiæ versus Luzatiam & Marchiam Brandeburgensem, etiam miliarium ferè 20. & amplius.

Meridio-

Meridionalis pars est à fontibus Vistula vsq. ad Montem Fagorum, Mumelam Iseramq. fluvios. Excurret hoc latus in occasum ad iuga Montium Suditorum, qui diuidunt Boemiam à Silesia. Horum ferme milliaris 40. videlicet ab oppido Teschena ad fines Luzatia.

Latus septentrionale, à fontibus Brednici & radicibus Carpathi vsq. ad confluentem, qui est Crosna & ferme est milliarum 40.

Exposita est ventis præcipue Aquilonaribus & occidentalibus. Nam ad Austrum cingitur montibus Boemicis, ab ortu iugis Carpathi. Aquilones vero liberè ex Polonia in eam excurrunt & ex Marchia ac Luzatia occidentales.

Partitio.

Silesia vel est Superior, quæ ad Meridiem Sudetes montes, & Carpathum attingit, & habet Ducatum Teschinentsem, Troppauensem, Ratiboriensem, Opeliensem.

Inferior vicina est Polonia Maiori & Marchia, ut sunt Ducatus Bregensis, Vratislaviensis, Nissensis, Suidnicensis, Iauensis, Legnicensis, Glogouiensis, Saganensis, Olsnicensis, Münsterbergensis, Crosnensis.

Hodie in Ducatus, ut nominant, distribuitur quindecim, ex quibus singuli sua nomina acceperant a sua metropoli.

Vratislaviensis,	Nissensis,	Bregensis,
Legnicensis,	Teschinentis,	Olsnicensis.
Suidnicensis,	Iauensis,	Münsterbergensis,
Opeliensis,	Ratiboriensis,	Troppauensis,
Saganensis,	Glogouiensis,	Crosnensis.

His addunt Alij Ducatum Iegendorffensem, Lubissensem, & Comitatum Glocensem.

Quilibet Ducatus rursus suas peculiare obtinet Dioceses, seu Districtus, qui vulgò Weichbilder vocantur.

BARONATUS LIBERI quatuor, Freyherrschafften/Sciende.

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. VVartebergensis, | 2. Milesius, |
| 3. Plessensis, | 4. Trachebergensis. |

Abbatia.

Leubusienfis, in arena Vratisl.

Abb. ad S. Vincentium Vratisl. Heinrichouienfis.

Camencensis, Grissouienfis, Raudensis,

Grimmelvitzensis, Beraunienfis.

Collegia Canonicorum.

Canonicatus Vratislaviensis ad D. Iohannem.
Glogouienfis, Nissensis.

Ratibo-

Ratiboriensis,
Glocensis.

Opeliensis,

Cœnobia.

Trebnicense, Sprottauense, Naumburgense ad Quissum.
Liebethalense, Strigoniense, Legnicense,
Ratiboriense.

Urbes & Oppida numerantur, 120.

Omnia ferme populosa valde, Mercatoribus & artibus Opificum referta. Primaria sunt:

VRATISLAVIA, Breslaw/metropolis & umbilicus fere Silesie in leta fertilis planitie ad confluentem Viadi & Olava fl. sita, mercaturâ celebris & cerevisiâ succulentâ, quam vulgò Schôps vocant.

Namslavia, Namstaw / oppidum dioceseos Vratislau. Cives habet ex mercatura opulentos.

Neoforum, Newmarct / oppidulum cum burgo.

Smogra, prima Silesiorum hic erecta schola, Anno 966. ab Urbano I.

NISSA, die Neisse / vrbs primaria ad Nissam fluu. sita. Sede Episcopali fulget.

Grotka, opp. mœnitum agro fertili non procul à Nissa fl. situm.

Ottmochonium, Ottmachaw / oppidulum apertum.

Zuckmantela, Zuckmantel / oppidum metallicum sub radicibus montium Morinorum positum, Ferri, Argenti, maximè Auri metallis clarum.

Ziegenhals, opp. officinis ferrarijs nitet.

TESCHENA, Teschen / vrbs sui Ducatus primaria cum arce Principis ad radices Carpathi vulgò Iablunka sita. Emporio nobilis. Alluit hanc Elsa fluvius.

Freistadium, Freystetzel / opp. mœnitum textoribus telarum linearum frequens.

Skotzouia, Rogoff / opp. muris cinctum.

OPELIA, Oppeln / vrbs Ducatus sui præcipua. Canonicatum habet, Arcem antiquam trans Oderam fluuium, qui urbem præterfluit.

Bytonia, Bytom / Beuten / opp. in consinijs Polonia ad Carpathum situm vetustis Argenti fodinis clarum.

Tarnouitium, Tarnowitz / oppidulum metallicum, ad radices Carpathi positum, Metallis Argenti, maximè Plumbi hodie celeberrimum. Hic etiam Lithargyrium & Vitriolum ex scorijs Plumbi conflatur.

RATIBORIA, Ratibor / vrbs lignea cum arce Regia Viado adiacens. Ante biennium fere integra conflagrauit. Cœnobium habet virginum & virorum.

Kosla, Kosel / oppidulum ad Oderam cum arce.

Glogo-

Glogouia Minor, Klein Glogau / oppidum ad Nissam fluvium,
In arce residet praefectus Ducatus.

TROPPAVIA, Treppen / vrbs cum arce ad confluentem Mora &
Oppa fluu. adificata. Ducatus titulo insignis.

Vochstadium, Wochstatt / opp. munitum.

MYNSTERBERGA, Münsterberg / vrbs antiqua ducalis, olim
Ducibus Olsnensibus parebat : hodie Regi Boemia subiecta.

Francosteina, Franckstein / oppidum ad Steinam fl. cum arce.

Reichensteina, Reichstein / ob metalla Auri & Argenti clarum &
celebre oppidulum.

Silberbergum, Silberberg / opp. metallicum à venis Argenti nomen
accepit.

SVIDNICIVM, Schweidnitz / vrbs primaria, ampla & elegans
cum Burgo & Monasterio Monachorum, incolis frequens, Beram coquit
duplicem : vnam ex Triticis, qua vulgo Stier vocatur ; alteram hordea-
ceam Bitterbier / haud improbi succi. Molanitei papyracea.

Strigonium, Stregomum, Striege / vrbs satis ampla loco fertili sita,
ob Margam, qua vulgo Sigillata Slesiaci seu Strigomienfis, ad mon-
tem acutum D. Georgij eruitur, celeberrima. Celebritatem auxit Ce-
renisia qua illic paratur Triticæa.

Reichenbachium, Reichebach / oppidulum textorū officinis frequens.

Landeshuttum, Landeshutte / id est, spicula Regionis oppidulum
montanum à Mercatoribus Grusijs notissimum.

Fanum Bulconis, Bolckenhan / paruum oppidum. Castrum habet
munitum alto monti insidens à Bulcone Duce extructum.

IAVRAVIVM, der Jauer / caput Ducatus sui, vrbs agro fertili
sita, Monasterio & Arce, in qua residet Praefectus seu Capitaneus vtriusq;
Ducatus Suidnicensis & laurenfis, excellit.

Boleslauiæ, Bunzlau / vrbs fontium perennium scaturigine nobilis,
amœnitate situs nimirum ad nemora inter campos & prata, Aërisq; sa-
lubritate nulli alteri cedens.

Leoberga, Lemberg / oppidum ad Boberum fluvium, agro fertili &
commodo extructum. Aedificiorum elegantia & hortorum amœnitate
& fecunditate multis praefertur. Olim Auri fodinis, In der Secht / &
pannisicio celeberrimum. Latonijs nitet.

Gryphimons, Greiffenberg / oppidum non ignorabile editiori loco
ad Quissum fluu. situm, te'is lineis, textoribus ac Mercatorum frequen-
tia sibi celebritatem opesq; conciliauit.

Friedeberg, Friedeberg / oppidulum montana versus Quisso fluu.
sine munijs annexum.

Ceruinontium, Hirschberg / à Cernorum venatu, regale, non qui-
dem

dem spacioſum, verum hominibus & Incolis frequens oppidum, ad confluentem Zaci & Boberi fluv. intra Sudetes loco ameno poſitum. Procul innotefcit ob thermas vicinas, quotannis ab Aegris frequentatas. Hic tela lineæ tenuiſſima candidiſſima, vulgo Schleier/ magno numero conficiuntur, quæ in varias & remotas terras diſtrahuntur: in quibus texendū mirabilis ſeminarum induſtria ſolertiæq; perſpicitur. Ingentes calamitates pertulit, Anno 1549. 18. die Maij, cum ex improviſo ſubortis flammis præter templum & ſuburbia, tota conflagraſſet: Inſtaurata tamen, elegantiam potiùs quam ſingularem magnificentiā in ædificando præ ſe ferre videtur.

Vt LVſtrat la Fri ſſe Lgentia Cornva phæbvs,

Vrbs à Cervino Monte Vocata Iacet.

BREGA, der Brieg / vrbs pulchra & amœna ad Viadum extructa, cum arce, Principis ſede & gymnaſio ſpectabilis.

Strelinum, Strelen/ opp. agro fertiliſſimo & commodo ſitum. Hoc alluit Viadus. Meditullium regionis fere obtinet.

Olauia, die Olaw/ oppidum pulcrum & elegans cum arce ducali.

VVolauia, Wolaw/ opp. loco vdo inter piſcinas ſitum. Vitrſolum hic excoquitur ex Melanteria cœruleum. Arcem habet.

Nimitium, Nympeſch/ immœnitum oppidulum. Arx in monticulo ei adiacet pulchra.

OLSNA, der Oeſſe/ vrbs ducalis primaria, ad Oderam fluvium ſita. Arcem habet, in qua Princeps reſidet.

Trebnitium, Trebnitz/ oppidulum Cœnobio Virginum fulgens.

Streppauia, Stroppen/ oppidulum immœnitum.

Bernſtadium, Bernſtadt/ oppidulum ad VVeidam fl. cum arce.

LEGNICIUM, Liegnitz/ vrbs plano loco poſita, ducalis, elegans & probè munita. Cui anneſcitur arx & palatium Ducis. Non procul ab vrbe fluit Cattus fl.

Aurimontium, der Goldberg/ ad Cattum fl. oppidum, olim ob Aurimetalla celeberrimum. Præ cæteris ſcholis maxime floruit, ac principem inter Sileſiacas locum tenuit: ex qua ceu ex equo Troiano plurimi viri, doctrina & pietate præſantiſſimi Reipublica & Eccleſia utiliſſimi prodire. Ob cladem quam ex duplici incendio ſenſit maximam, multum de priſtina dignitate amiſit.

Parchvritium, Parchwitz/ oppidulum ſine mœnijs ad Oderam, arce nitet.

Hanouia, Hauaw/ oppidum mœnitum ad Cattum fl. cum arce. Ante annos 20. ingentes calamitates pertulit, cum ſuppoſitis clanculum flammis magna ex parte deſlagraſſet: ſed à ciuibz iam reædificatum eſt.

d 2

Lube-

Lubena, Luben/ oppidum mœnitum.

SEGANVM, der Sagan/ vrbs ducatus titulo donata, eo loco vbi Boberus & Quissus conflunt ad vastas sylvas extructa. Abbatiam habet, & officina, in quibus ferrum cuditur durius, excellit.

Naumburgum, Naumburg am Bober/ oppidulum exiguum.

GLOGOVIA, Gros Elgaw vrbs Ducatus sui princeps & collegio Canonorum spectabilis, ampla, commodissimo loco sita. Agrorum circa urbem magna fertilitas & Rei pecuaria insignia studia.

Freistadium, *ἡ ἀσκήματος*, opp. est ligneum, positum quasi in valle. Cingitur undiq. montibus & locis aditioribus ad omnes plagas cœli, præterquam ad Aquilonem proximum ortui solstitiali. Hic lineas telas magno numero conficiunt.

Gura, der Gur / opp. non valde inaequale Freistadio, situm in limite Polonico, loco edito exposito omnibus ventis, præsertim Aquilonibus. Forum frumentarium habet locuples propter situs opportunitatem ad Poloniam.

Sprotta, Sprotte/ opp. Freistadio paulo minus, antiquissimum post Glogouiam & Beutenam, loco amœno & commodo extructum. Ad Meridiem Bobera fl. alluitur: ad alteram partem fluuius minor Sprotta dictus alluit. Arx versus ortum situatur loco, qui circumdatur à fluuijs & paludibus. Cœnobium hic virginum.

Grünberga, Prassia Elysiorum, Grünberg/ opp. est recentissimum in valle longè amœnissima situm, quæ egregijs ornata est commoditatibus.

Suibasium, Schwibosiu/ opp. ultra Viadum versus Aquilonem & Poloniam, loco opportuno positum, vbi magna omnium rerum necessariorum copia.

CROSNA, Crossen / vrbs Silesiæ extrema Marchiam versus, vbi conflunt Bobera & Viadus, Ducatus nomine memorabilis. Olim ditionis fuit Glogouienfis; ante annos centum ex transactione in possessionem acceperunt Marchiones Brandeburgenses. Ager vicinus vini feracissimus.

Zulichia, Züllich/ oppidulum ad Oberum fl. trans Oderam fl.

LEGENDORFF vrbs in valle sita cum arce pulchra. Comitatus, vel vt alijs placet, Ducatus titulo memorabilis. Montes vicini Laricis feracissimi sunt. Marchioni parer Anspacensi.

LVBISCHIVM, Lubschütz / vrbs pulchra in opimo fertilisq. territorio sita, & foro frumentario nota.

VVARTEBERGA, Warteberg/ oppidum Baronatus sui primarium, non longè à fontibus VVeida fluuij distans. Anno 1441. totum conflagrauit.

MILESIVM, Mielitz/ opp. Baronatus gaudet titulo, ad extremos Polonia limites.

PLESSA, Pleßau/ pulcrum oppidulum cum arce magna ad Vistulam fluuium

fluvium, Baronatus titulo insigne, ad limites Polonia minoris in Ducatu Tesinensi.

TRACHEBERGA, Trachenberg/ oppidulum Baron. vliginoso loco ad Bartham fluvium situm. Piscibus abundat, maximè Lucys.

GLOCIVM, Glog/ vrbs ampla & mœnita, arce speciosa donata, situm obtinet amœnissimum & commodissimum ad Seinam fluvium. Omnium rerum ad vita vsus necessariorum affluentia exuperat. Caput totius Comitatus.

Landecium, Landeck / opp. ad Bielam fl. aquis medicatis clarum.

Neurode, oppidulum limificio commendatur.

Reinharts, opp. mola papyracea excellit.

VVundschelburg, oppidum.

ARCES Principum, Baronum, Equitum, Nobilium plurimæ,

PAGI circiter sunt 19000. & plures.

Montes

PROPRII seu Regionis, vt Zabothus, Acutus, Grezus mons.

LATERALES, vt Carpathi iuga, & Sudetes dicti.

A Meridie Silesiam claudunt montes SVDETES, qui pars Hærcyniæ fluv. ab Hermunduris progressi, ab occasu in ortum ad Carpathi iuga excurrunt. Varia sortiuntur nomina. Tractus illi ab Isera fluvio seu sinibus Silesiæ, ad Marcomannos vsq., quod Boemiam respiciant, Boiemici, Alijs Riphæi, à Riphæis Sarmatiæ populis, qui secuti Zechum in Boemiam, vt opinantur eruditi, suam appellationem istis montibus impresserunt: etiam Gigantæi montes, Boiemis Horkonols, vulgò das Bömische/ Riesen/ oder Schneegebürge: ob niues quibus ferè perpetuò obteguntur, dicti sunt. Loca horum præcipua sunt:

GIGANTÆVS mons propriè, Accolis der Riesenberg/ in immensum altus, sic appellatur, quòd præ alijs gigantis instar emineat: ob Virunculum seu Dæmonem montanum plurimis notus: propter Metalla & lapillos clarus, etiam ab Italis scripto celebratus; hæcenus Auri, Argenti, Aeris, Gemmarum indicia ostendit, magnum vtilitatis fructum nondum præbuit. Memini ex remotis terris Metallicos, venas eius Metalli feraces corio nudasse actisq., tuniculis magnis impensis aperuisse: sed frustrata spe eandem desertis cuniculis abijisse. Mineræ eius, licet Aeris, Argenti, Auri sint feraces; attamen cum sint durissima & Cadmiæ metallica sine Cobalto referta, in excoctione Metalla vtilia igni depereunt. In eius conualle, im Riesengrund/ Teuffelsgrund/ Goldgrund/ Auri ramenta lauantur. Ibidem ante paucos annos Viriolum ex Pyrite atramentofo conflatum fuit. Vulgus ex hoc signa tempestatum & serenitatis petiit: ea propter ventorum tempestatumq., quasi Index ac monstrator der Schlesier Wetterzeiger vocatur.

De Spectro seu montano Dæmone, passim Niesenzal/ qui frequenter ad gigantem montem oberrare solet, multi multa fabulantur. Georgius Agricola Medicus diligentissimus Metallorum scrutator, libro de Subterraneis duplex Dæmonum, qui in quibusdam Metallorum versantur fodinis, constituit genus. Alios facit iraculentos & terribiles aspectu, qui plerumq; Metallicus infestis atq; inimici sunt; qualis fuit Annabergius ille, qui operarios duodecim amplius statu interfecit in specu, quæ Corona Rosacea appellatur. Equi enim specie habentis procerum collum & truces oculos dicitur visus. Philosophi hos & similes Dæmones, qui nocentes sunt & natura improbi, nominant Brutos & Rationis expertes. Sunt dein Mites, quos Germanorum alij ut & Græci vocant Cobalos, quod hominum sint imitatores. Nam quasi latitantes rident & multa videntur facere, cum prorsus nihil faciant. Quidam hos nominant Virunculos montanos, Bergmännlein. Damnum hi dare non solent excisoribus Metallorum: sed vagantur in puteis & cuniculis, & cum nihil agant, in omni laborum genere videntur se exercere. Non ledunt unquam nisi prius ipsi cachinno fuerint aut maledicto lacessti. Ad hoc Dæmonum genus referri posse Gigantum spectrum ex præcatis liquidò constat: quod, quamvis varia forma & specie, modò Monachi cucullati, modò Senecionis metallicorum more vestiti; iam Equi generosi; iterum Galli, Corui, Vlula, aut Bufonis maximi &c. se conspicendum offerat, mirisq; gestibus sæpe Hominihus ea loca perbustantibus illudere soleat; tamen nulli unquam noxam aut damnum intulisse, nisi prius cachinno aut maledicto provocatus fuerit, certò constat. Tunc enim cælo iam prorsus sereno & aura silenti, in momento ingentia & horribilia tonitrua ac fulgura cum imbris largu suborta esse, plerumq; experti sunt.

FLINZBERG, die Abendburg / Mons inter Quissi & Zaci fontes situs olim ob ingentem thesaurum illic reconditum famosus. Quem cum Impostor quidam Hieremias Waldner à Greuss. Istein Pannonius magicis suis, ut ipse narrabat, virgulis, à Dæmone montano obsessum explorasset, multos ciues ex vicinis oppidis, lucris causâ, vanâ spe enutrients, conuocauit: à quibus cum collectum exegisset, thesaurum quem somniabat, characterebus, suffurris, cymbalis & alijs incantamentis aperire iam frustra aggressus, cum magno sui dedecore ac ignominia, maximo verò Dominorum, qui symbolum dederant, incommodo clam se subduxit & re intacta secessit, secundum illud: Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.

ISERÆ PRATVM, die Herwiese/ locus ad fines Silesiæ in angulo occidentali supra Quissum & Luzam fl. instar prati planus ac herbidus, ab Isera fluuio, qui per medium eius leuio gradu fluit, denominatus, ob metalla, Gemmas, lapillos nigros vulgò Schieferle/ &c. per multos annos celebris. Diuiditur in maius & minus.

MAIUS

MAIVS vulgò, die groſſe Iſerwief / eſt ex parte Sileſie, ad Generoſum Dn. Chriſtophorum Guiſchium Dominum in caſtru Kynaſt & Greiſſenſtein pertinet: alterum ex parte Boiemie, paſſim die kleine Iſerwief / Magnifici Dn. Melchioris à Redern, Domini in Friedland & Reichenberg, montanis annexum. In hoc Auri ramenta, grana, Rubini, Granati, Hyacinthi, Turcoſij, Sapphyri pulcerrimi lauantur.

FOVEE NIVALES, die Schneegruben / conualles ſunt & profundiffima vndiq; montibus altiffimis circumſepta. Terna numerantur, ob nives quæ raro integrè liqueſcunt, etiam ardente Syrio, aciem contuentium candore ſuo hebetant. Plantis plurimis fertiles ſunt.

Fluuij ex his montibus oriuntur.

ALBIS, die Elbe / Albe / fluuius Germania maximus, quem Gigantæ mons inter iuga alpium ſeu Suditorũ ad fines Sileſie, gremio ſuo ſundit, nulli annuum claritate inferior, ex fonte vulgò, das weiſſe Waſſer / ob arenam & glaream quam ſuperfluit, candidam, dicto ſcaturit. Hic mox aſſumpto riualo alio den Hirschbrunnen / occaſum verſus tendens, paulò poſt meridiem verſus refleſcitur, & ex iugu ſummi deuolutus in vallem, den Elbengrund / riualis innumeris auctus, priori teutonico amiſſo, Albis nomine dignatur, quod, lapſus per Boiemiam, Miſniam, Saxoniã in Oceanum uſq; germanicum deſert. [Albis quaſi Alba, ſeu Alba aqua ab eius fontis colore qui albidus conſpicitur, quò & teutonicum, Elbe / Albe / Alba / & Boemicum Labez inuerſa litera alludere videtur.]

OUFA, die Aupe / ab Oupadem Sclau. hochfallende ſonat, non procul ab Albis fonte caput tollit, rectã ad orientẽ fluit, vbi ad gigantæum ſerè peruenit, præceps ex iugis montium deuoluitur, per vallem Gigantum & anguſti ſubiacentium montium fauces elapſus Trutenouiam lambit & ſub Iuromirio Albi commiſcetur.

ISERA, die Iſer / Giezera Boiemis q. fluuius ex paludibus collectus, vel quod lento gradu fluat. Hic duplici fonte ſcaturit, & plurimu riualis auctus ad montem Fagorum coniunctus longo itinere in montanis lente procedens, tandem ex montibus decurrit, Tornauium & Zaborum oppidula alluens, ſub Brundafio ab Albi abſorbetur.

BOBERVS, der Bober / Sclauis Lutram ſonat, quod ad eius ripas frequenter capiat. Naſcitur iuxta Scharzlarium oppidulum ligneum ſupra vicum Bober; Landeshutram, Cuſperbergum, Hirsbergam, Lehnem, Leobergam, Boleſlauiam, Spreitã, Seganum oppida alluit & ad Croſnam à Viado recipitur.

ZACVS, der Zacke / à Sclau. Zakakg, id eſt, riualorum conſtillatio, ſupra montem Flinsberg ebulliens multis riualis adauctus Thermas præterfluit & ad Ceruimontium Bobero inſertur. Trutarum optimarum admodum ſecundus.

QVIS.

QVISSVS, der Queis / limes Silesie, cum Lusa Lazariam versus in montanis supra Gieren pagum venis plumbi candidi celebrem enatus, Fridebergam, Gryphimontium, Lissam, Laubanum, Naumburgum oppida attingit, & prope Seganum Bobero inferitur. Margaritas generat, & piscibus optimis abundat.

CATTVS, die Razbach / initium sumit ad pagum Ketschdorff & fluens Schœnouium, Goldbergam, Legnicium, Parchvitiū ad Steinauiam Viado miscetur. Aureas vebit arenas.

LACVS Giganteo monti duo adjacent. Prior, occiduus maximus der grosse Teich / à meridie montibus circumdatur altissimis perpetuis nivibus rigentibus: ex parte septentrionali assurgunt scopuli minus alti. Aqua ipsa nigricat dira & stygia facie, immensa altitudinis fundoq̃ carens. Nullos alii pisces nec aliud quicquam vivens. Alter orientior & depressus magis, der kleine Teich vulgo, in quem multa aqua perpetua ex montibus undiq̃ defluentes ingrediuntur. Trutus abundat maximis nigricantibus prorsus, optimi saporis ac probi succi. Ad septentrionem effundit torrentem seu rivum perennem, qui sub Lomicio Bobero immittitur.

ALTER Suditorum tractus incipit à finibus montiū Glouensium, & desinit in ducatu Teschenensi ad Carpathi iuga: dirimit Morinos à Silesijs, & varia sortitur nomina, Montes Morinorum, Nissenses, das Märtsche gebürge / Neissische gebürge / das Besencke. Et hi Metalli fertiles sunt, ut in Zuckmantela & Ziegenhals. Abundant Phyllitide herba.

CARPATHI IUGA ab orientali plaga Silesiam tangunt eamq̃ ab Hungaria & Polonia prope Teschenam & Bythoniam oppida, separant, die Ungrischen gebürge / Iabeluncka vulgo. Argenti & plumbi nigri feracissimi sunt. Fluvij ex his oriuntur:

VIADVS, etiad̃, Ptol. Viadrus, Guttalus Plin. Odera, die Oder / à rapiendo vel spoliando, quod inundationibus crebris latè vicinos campos vastet. Maximus Silesie fluvius, ex radicibus Carpathi prope vicum Adry post oppidum Ostrow dimanet, irrigans Silesiam, Marchiam & Pomeraniam, tandem apud Caminum in Mare Pomeranicum crumpit. Civitates habet Oderburg, Kosiām, Pyregam, Vratislaviam, Leubusium, Steinauiam, Crosnam, Francosfurtum, Grippenbagen & Stetinum.

VISTVLA Віс́ла, Ptol. Vistulus Plin. Distel oder Weichsel. In Teschenensi Ducatu non procul à Viadi fontibus exoriens versus Boream Primum, mox ad orientem cursu directo Osyencinum, Zatoriam, Cracoviam, Sandomiriam ad Sani & Vistule confluentem, præterlabitur: inde rursus in septentrionem flexus Varsaviam, Plosium, Vladislaviam Episcopi Cuiavienensis & Pomeranie sedem; deinceps in Borussia Toroniam, Culnam, Grudentum, Mariavverder, Mœnam, Mariaburgum, Dersaviam & Dantiscum vrbes alluens partim in Mare Balticum, partim in Bo-

XVII

in Borussia sinum aqua dulcis, tribus vel quatuor ostijs se exonerat.

Montes Regionis proprij.

ZABOTHVS mons, Zottenſis mons, mons Marmore variegato nobilis in planitie duobus miliaribus à Suidnicio vrbe ſitus. In circuitu complectitur Paß. M. CCCC. Olim arcem in eo extitiſſe Zotebergam dictam rudera teſtantur. Subiacet Zaboſum opp. der Zoben.

Mons D. GEORGII, S. Georgenberg / Mons ad Strigam Auri fodini vetuſtus & Terra qua hodie Sigillata appellatur, celebris.

ACVTVS mons, der Spizberg / mons in acutum tendens ad pagum Proßhan, multarum herbarum ferax.

GRADECIVS ſeu GREZVS mons, der Grezberg / Huic inſidet Caſtrum probè munitum in Lygys.

FVRSTENSTEIN, arx vetuſta & nobilis ad radices Suditorum, P. M. CCC. à Stregomio à Bulcone Duce extructa, Hanc poſſidet Magnif. Dn. Cunradus ab Hohberg.

KYNAST, caſtrum intra Sudetes prope Zacum fluuium alto monti inſidens, antiqua & nobili Dominorum Guiſchiorum familia clarum.

GREIFFENSTEIN, arx Generoſ. Dn. Chriſtoph. Guiſchij non longe à Quiſſo fluuii in rupe dura extructa.

KVNSBERG, olim Furſtenberga arx.

BOBERSTEIN, arx vetuſta in rupe ad Boberum extructa.

Fertilitas.

Regio hac quamvis ſeptentrionalior maiorem habeat Cæli inclementiam & terra horriditatem, tamen adeo fertilis & benigna mater, vt larga cum vbertate fundat res, quibus vita noſtra non poteſt carere. Agri meliores, quales ad Strelam & Lubichium, vbi quaſi ſumen Regionis, dein ad Glogouiam, medimnos fert octonos, aut etiam denos: & tanta Deo dante frumentorum eſt copia, vt vicina etiam gentes ſape numero inde alantur.

Iumentorum etiam optimorum copiam ad eſcam & laborem affatim educat & ſuppeditat vicina Polonia.

Lacticia tam ſunt copioſa itaq; proba, vt etiam apud exterarum gentes ea clara ſint multaq; familia nobiles inde diteſcant. Nec deſunt Sylua qua alunt feras ad vſus & delicias hominum crebriores quàm alibi.

Flumina piſcoſa maiora & minora ſunt multa: præterea Stagna ingentis magnitudinis, inſuper Piſcinæ arte manuq; factæ permultæ, quæ præbent Piſces eximie bonitatis & ſalubritatis, ita vt hac in parte non cedat vlli non ex prouincijs Germania. Metalla item Aurea & Argentea Aes, Ferrum & Plumbum, Lapilloſq; & Gemmas gignit. Nec deſunt

e

Ther-

Thermæ multis salutare. Montes & Campi, gramina & herbas in pabulum iumentorum & ad Medicinam salutare largiuntur. Vinum pluribus in locis colitur, præsertim in Silesia inferiori, subausterum quidem, sed non incommodum.

Cerevisia autem tam Hordeacea quam Triticea magna probitatis multique nutrimenti passim coquitur: inter quas præcipuam habet laudem Vratislaviensis. In summa, omnia ad vitam necessaria vilioris sunt præcæ quam in regionibus finitimis.

Religio.

Sub Idolomania Ethnica, integra fuit periodus, anni circiter quingenti. Quâ deletâ sub Othone I. Anno Christi 965. Religionem Christianam profiteri cepit. Nam in plerisque urbibus & pagis, cura Magistratus Ecclesia emendata sunt, & accensa lux doctrinæ purioris, quæ magnâ diligentia inter gravia pericula hæcenus Dei beneficio conservata est.

Scholæ.

In multis urbibus fouentur. In quibus exculta sunt literis & disciplina multa præclara ingenia, quorum in Ecclesia & civili vita usus est. Primariæ sunt:

GOLDBERGENSIS, multis annis fuit magistra nostræ Gentis, quam aluit beneficentia Principum Legnicensium, ibique ingenia multorum felicissimè informavit vir æterna laude dignus Valentinus Trocedorsius, ex cuius ludo tanquæ ex equo Troiano magna examina doctorum prodierunt.

VRATISLAVIENSIS, summis amplissimi Senatus viget.

BREGENSIS, liberalitate Georgij Ducis Bregensis erecta.

SVIDNICENSIS.

FREISTADIENSIS.

Mores.

Incola sububicundi, valde sanis corporibus, humani & civiles, diuturnioris vitæ; sed crebro & facile inebriantur.

Ingenia Hominum multum diuersa sunt, quæ vti plurimum media sunt inter sanguinea & Melancholica. Ideo plerumque, in illis, qui doctrinæ & usu exculti non sunt, cernitur naturalis quadam tristitia, morositas, deventia, vel subagrestis quidam pudor: verum ubi accedit cultura ex liberali institutione & assuefactione, apparet, Ingenia Silesiorum non solum optime esse omnium artium capacia, verum etiam accipere ea elegantem quandam dexteritatem ad res magnas efficiendas, & plurimos adiutos literis cum splendore & vbertate quadam Animi cogitata exponere & proloqui posse.

Idio-

Idioma.

Lingua magna ex parte est Germanica; quamvis in finibus Polonia etiam Polonicè loquantur.

Viri docti Theologi.

Abrahamus Bucholtzerus Freistadiensis Pastor Grunberg.

Abrahamus Scultetus Grunbergensis M. Pastor aulicus Heidelbergensis.

Adamus Curæus Pastor Vratislaviensis.

Amandus Polanus à Polansdorff Oppaviensis D. & Professor Basileæ.

Ambrosius Moibanus D. Vratislaviensis.

Andreas VVencelius Hainensis Pastor in Academia Francofurtensi.

Bartolomæus Pitiscus M. Pastor Heidelbergæ aulicus.

Christophorus Pelargus Suidnicensis Professor Francofurt.

David Paræus Francofeinius D. & Professor Heidelbergensis.

Esaïas Heidenreich Leoberg. D. & Pastor Vratislaviæ.

Franciscus Fierling Nissenfis Vratislaviæ Archidiaconus.

Georgius VVeinrich Hirsbergius D. & Superattendens Lipsen.

Hieronymus Mencilus Suidnic. M. Superattendens Eislebian.

Iohannes Aurifaber Vratislau. D. & Pastor Vratislau.

Iohannes Fleischerus Vratislau. D. & Pastor.

Iohannes Hessus D. Vratislau.

Iohannes Scholtzius Vratisl. præpos. Ecclesiæ ad S. Bernhardū.

Iohannes Scholtzius Fil. M. Pastor Vratisl. ad Mariâ Magdalen.

Laurentius VVidemannus Seganensis.

Lucas Pollio Vratislau. Pastor ad D. Magdalenam.

Petrus VVirth Leoberg. D. Canonicus Vratisl. & Lignicensis.

Collegij B. virg. in Acad. Lipsen. collega.

Petrus Calaminus D. & Professor Heidelbergæ.

Sigismundus Suevus Freistadiensis præpositus Ecclesiæ ad S. Bernhardum.

Zacharias Polus Gryphibergensis M. Superattendens Bernbergensis.

Zacharias Vrsinus Vratislau. D. & Professor Neostadij.

Iure Consulti.

Albertus Kindlerus Hirsbergius Cancell. inferioris Lusatiz.

Andreas Heugel à Polockvvitz Consil. & Cancellarius Ligio-Bregen.

c a

Andre-

S I L E S I Æ

Andreas Sartorius Brigenfis & Profefſor Francofurtendiſ.
 Daniel Printz Leoberg. Orator & Conſil. Cæſar.
 Georgiuſ Kahl Hirsberg. D. & Conſil. Cæſareuſ.
 Georgiuſ Tilenuſ D. & Conſil. Olſnicensiſ.
 Georgiuſ Sebitiuſ D. Vratiſlavienſiſ.
 Henricuſ Stephanuſ Vratiſlavienſiſ D. & Conſil. Cæſareuſ.
 Hieremias Setzeruſ Suidnicenſiſ D. Academiæ Francofurt.
 Hieronymuſ Treutleruſ D. & Orator.
 Iacobuſ Monauiuſ Vratiſlau. Hiſtoricuſ & Conſiliariuſ Li-
 gio-Bregenſiſ.
 Ioachimuſ Spechtiuſ Glogou. D. & Conſil. Ligio-Bregenſiſ.
 Iohanneſ Heſſuſ Vratiſlau. D. & Conſil. Cæſariuſ.
 Iohanneſ Reiman Leobergenſ. D. & Conſil. Ligio-Bregenſiſ.
 Michael VVirth Leoberg. D. Cancell. Coburgenſ. & dein Or-
 dinariuſ Lipſenſiſ.
 Nicolauſ Reuſneruſ Leoberg. D. & Profefſor Ichnenſiſ.
 Sebaſtianuſ Gerſtmannuſ Boleſlau. D. & Profefſor Franco-
 furtenſiſ.
 Valentinuſ Thilo Lignicenſiſ D.

Medici.

Andreas Aurifaber Vratiſlavienſiſ D.
 Abraham Seyleruſ D. Medicuſ Vratiſl.
 Andreas Butneruſ D. Medicuſ Vratiſlau.
 Balthaſar Gutleruſ Leobergenſiſ D. & Collegij Medici in Acad.
 Liſſica Decanuſ & Profefſor P.
 Caſpar Hoffman, Leoberg. D.
 Caſpar Firling Freyſtad. D. Phyſicuſ Grunberg.
 Caſpar Packiſch D. Vratiſlau. Phyſicuſ.
 Chriſtophoruſ Rumbaum laurenſiſ D. Medicuſ Vratiſlau.
 Daniel Rindſleiſch Vratiſlau. vtriuſq; Medic. D. Poliatroſ.
 Daniel Schepſiuſ D. Phyſicuſ Suidnicenſiſ.
 Fridericuſ Sebitiuſ D. Ducis Bregenſiſ Med.
 Georgiuſ VVirth Leobergenſ. D. Ludouici Vngariæ & Bo-
 hemiæ Regiſ Medicuſ, & Decanuſ Budiſinenſiſ.
 Georgiuſ VVirth Laubanuſ D. Caroli V. & Philippi F. Hiſpa-
 niarum Regiſ per annos oſto ferè Medicuſ.
 Georgiuſ VVirth Leoberg. D. Vienneniſ Medicuſ.
 Georgiuſ Rumbaum D. Strelenſiſ Phyſicuſ.
 Iohanneſ Orato à Krafftſheim Vratiſlau. III. Imppp. Cæſſ.
 Augg. Medicuſ intimuſ &c.

Iohan-

Iohannes Hermannus D. Professor Vitebergens. Poliater Vratislauensis.

Iohannes Iessenius à Iessen Vratisl. D. & Professor Vitebergens.

Iohannes Langius Leoberg. V. Palatinorum Electorū Medicus.

Iohannes Mencilus Glogou. D. patriæ Physicus.

Iohannes Montanus Med. Strigon.

Iohannes VVoyfelius Vratislau. D. Medicus Cæsarius.

Laurentius Scholtzius D. Medic. Vratisl.

Melchior Sebizijs D. Physicus Argentinenfis.

Nicolaus Sibenhar D. Nissenfis Phys.

Paulus Fridvvald D. Medic. Vratisl.

Paulus Hestus Vratisl. D. Olsnenfis Physicus.

Petrus Monauis Vratislau. Medicus Cæsarius.

Sigismundus VVoyfelius D. Vratisl. Physicus.

Tobias Fischerus D. Poliater Suidnicenfis.

Historici.

Abrahamus Bucholtzerus Freistadienfis.

Elias Reufnerus Leorinus Historiar. Professor in Academia Ienenfi.

Godefridus Bucholtzerus Grunberg. Notarius Gorlicenfis.

Ioachimus Curæus Medicus.

Mathematici.

Dauid VVolckenstein Vratisl. Professor Argentinenfis.

Martinus Heluigijs Vratislauienfis.

Scholarchæ.

Laurentius Circlerus Goldbergensis Patriæ & Bregenfis gymnasijs Rector.

Laurentius Ludouicus Leoberg. Scholæ Gorlicenfis Rector.

Martinus Heluigijs Rector scholæ Vratisl. ad S. Elisabetham.

Martinus Taburnus M. Goldbergensis scholæ Rector.

Melchior Tilefius M. Hirsberg. Rector scholæ Bregenfis.

Nicolaus Steinberger Vratislauienfis P. L. & Scholæ S. Elisabethæ Rector.

Petrus Vincentius Rector scholæ Vratislauienfis.

Valentinus Friedland Trocedorsius literas artesque bonas in schola Goldbergensi summo studio, diligentia atq; fructu docuit.

Poëtæ.

Andreas Calagijs Vratisl. P. L.

Balthazar Exnerus Hirsberg. M. P. L. & Notar. Pub.
 Caspar Conradus Vratislau. M.
 Elias Reusnerus Leoberg.
 Fridericus Consmannus Sagan. P. L.
 Georgius Martinus Sagan.
 Georgius Helmrucus Goldberg. M.
 Georgius Tilenus Aurimontanus I. D.
 Iohannes Cyaneus Syluanus P. L.
 Martinus Kinnerus M.
 Matthæus Rudinger Fraustadiensis M.
 Melchior Laubanus M. & P. L. Prorektor scholæ Goldberg.
 Nicolaus Reusnerus I. D. Com. Pal. & Professor Iehnenfis.
 Salomon Frentzelius Vratislau. P. L. Rector Rigenfis.
 Samuel Latochius II. Breg. P. L.
 Simon Grunæus P. L. Diac. Legnicenfis.
 Vrsinus Velius Poeta D. Ferdinandi.

Pictores excellentes.

Iohannes Montanus Medici filius.
 Martinus Koberus excellens pictor Sigismundi III. Poloniæ
 Regis.

Artes Mechanicæ.

*Magna est vbiq; Opificum multitudo. Conficiuntur Panni maxima
 in copia cum lancei tum linei. Linum enim plurimum optimumq; legitur,
 ex quo subtilissima & candidissima tela conficiuntur.*

Commercia.

*Mercaturam crebro exercent & in remotissimas terras peregrinan-
 tur. Magna sunt Mercimonia ex Lino quod tractatur à feminis nobilibus
 & alijs: ideo Pecunia in hanc Regionem importatur ex precio Panno-
 rum, Lini, Telarum tenuissimarum, Rubia tinctorum, Ferro, Plumbo, Li-
 thargyrio, &c.*

Oeconomia.

*Antecellit pleriq; alijs sedulitate & cura facienda necessarios labo-
 res, ita ut vix alibi reperiantur Oeconomia, in quibus diligentius opera
 domesticis incumbitur non solum à viris, verum etiam à mulieribus qsq;
 nobilibus & ignobilibus. In hac domestica consuetudine ingens decus est,
 modestia & industria Matronarum, quæ Oeconomias præcipue guber-
 nant, quarum exempla filia figura, forma corporu excellentes intuentur,
 & ab illis ad agnitionem Dei, ad bonos mores, ad scientiam Oeconomi-
 cam à*

cam à prima v³³ atate assueſcunt, colog³ & fuſo, ne per otium torpeant, operam impendunt atq³, ad omnem honeſtatem erudiunt.

Victus.

Victus etiam mundior & elegantior eſt quàm inter alias Gentes: qua quidem mundicies, cùm ſit nutritrix valetudinis & multarum virtutum, laude digna eſt.

Politia.

Summus Magiſtratus Boiemia Rex ſeu Imperator.

Conſtituitur à Rege Praeſes totius Prouincia vir princeps plerumq³, penes quem ſuprema in Regione eſt autoritas. Singulis dein Ducatibus ſui tribuuntur Praefecti ex arbitrio Regis, quem tamen certa leges circumſcribunt.

Vratiſlauriae ſupremum ex Statibus Prouincia conuocatur Tribunal, das Oberrecht/ vbi etiam Rex lege agit in eos, qui quocunq³, modo deliquiſſe viſi ſunt.

Nunc ex autoritate Caſarum noſtrorum in eadem vrbe conſtitutum eſt Conſilium Caſareum, vulgo Camera, ex viris magna dignitatis & ſapientiae, qui ordinis & diſcipline in hac Regione nomine ipſius Caſaris ſunt cuſtodes.

D. IOHANNES SITZCH, Epiſcopus Vratiſlaurienſis & ſimul Caſaris nomine Prouincia praes.

PRINCIPVM ſuperſunt hodie tres familia.

BREGENSIS, qua etiam tenet Ducatum Legnicenſem. Dominatur nunc Ioachimus Fridericus Dux Bregenſis & Lignicenſis.

TESCHINENSIS, VVenceslaus Dux Teſſinenſis.

OLSNICENSIS, Carolus Dux Olſnicenſis & Münſterbergenſis.

Reliqui Ducatus, extinctis veteribus Dominis, peruenerunt ſub poteſtatem Regum Boiemia. Vnum tamen tractum in Ducatu Tropauienſi & alterum in Opeliienſi impetrauit à Ludouico Rege Georgius Marchio Brandeburgenſis, qui Regi adoleſcenti ſuit adiunctus tanquam pater, & optime de toto Regno ſuit meritus.

Croſnam etiam & Zulichiam oppida, qua olim fuerunt ditionis Glogouienſis, ante annos 80. ex tranſactione in poſſeſſionem acceperunt Marchiones Brandeburgenſes. Hodie per Capitaneum adminiſtrantur.

Barones liberi.

Curtzbachij,
Kitlitzij,
Promitzij,

Donauienſes,
Malzanij,
Rederi.

Gutſchij,
Opperdorſienſes.

Nobi-

Nobiles sunt innumeri.

Familiae veteres, quae per multa secula claruerunt :

Bockij,	Crekvvitij,	Czedlitzij,	Debschitzij,
Gierldorfij,	Glaubitij,	Gutshij,	Hockij,
Hohbergij,	Hockij,	Ienckvvitij,	Kalckreuteri,
Kanitzij,	Knoblochij,	Kotvvitij,	Læitij,
Logij,	Mulheimij,	Nostitij,	Nympschij,
Rausendorffij,	Rechenbergeri,	Rederi,	Reibnitzij,
Reichenbachij,	Rotkirchij,	Schellendorffij,	Schindelij,
Schonaichij,	Scoppij,	Schvveidnitzij,	Seidelitzij,
Spillerj,	Stangij,	Tschammeri,	VVarnsdorfij,
Zetteritzij, &c.			

GVBERNATIO Politica iusta est, & vbiq; in vrbibus Senatus honestis legibus & Aristocratica gubernatione vitam Civium regit.

CIVES, Patritij, Mercatores, Opifices, Agriculturam exercent.

RVSTICI, Agricola, Villici extra vrbes in pagis habitant, & vt plurimum Agricultura dant operam.



STIR-

DE PLANTIS IN GENERE.

Stirpium summa genera.


Stirps, φυτόν a crescendo, est corpus vivum facultate vegeta constans. Huius summa genera quatuor sunt.

Arbor, δένδρον est planta, quæ à sua radice stipitem habet ligneam, vnicum, crassum: ex quo rami nascuntur multi, brachiorum instar diffusi. Huius partes vel	Perpetuæ, quæ semper & perpetuò adsunt, ut	Radix Caudex Rami Cortex Lignum Matrix Succus.
(A frutice tantum diuturnitatis & magnitudinis ratione differt.)	Annua, quæ non perpetuò adsunt, sed subinde pereunt ac decidunt	Flores Calyces Iuli Fructus Semina Capitula Siliquæ Valvula Involucra Umbella Pappi.
Frutex, δάμνην, planta est, quæ ab radice, caule multiplici, lignoso, durabili, ramosoq; se attollit, ut Corylus, Rhamnus.	Partes habent, partim cum Arboribus: partim cum Plantis communes.	
Suffrutex, φειζάρον, Creminum nonnullis, mediam inter herbam ac fruticem, naturam & consistentiam habet; quia lignosis cauliculis ad fruticem naturâ accedit, quatenus verò humile, herbas.	Necessariæ omnino	Inter-næ { Medulla Succus. Exter-næ { Radix Caulis Venæ seu Pedunculi (fibræ.
Herba, βόταν, ἄνθος, est planta, quæ sine caudice à radice foliata provenit, seminq; caule fert molli haudquaquam lignoso. Huius partes	Minus necessaria	Folia Flores Semina Fructus.

A


Diffic-

Differentiæ.



Vfus

Vfus.



A 2

Stir-

Stirpium Silesiæ, Aliæ sunt,

*Voluntariæ seu Insatiuæ, quæ sponte vel in montibus,
campis, pratis, palustribus nascuntur. De his LIBER I.*

*In hortis cultura proueniunt, & vocantur Satiuæ.
De quibus LIB. II.*

*Nihil tam vilissimum in Rerum natura, in quo mi-
rabile aliquod non refulgeat.*

Stigelius.

*Aut mihi Planta suis Numen demonstrat in herbis,
Præsentemq; refert vna vel Herba DEVM.
Aut operis series Autorem tota recenset,
Qui facit & leto cuncta vigore fouet.
Emicat ex ipsis Diuina potentia campis,
Et leuis est cespes, qui probet esse DEVM.*



STIR-

STIRPIVM IN
SILESIA SPONTE
NASCENTIVM

Liber primus.

Abies.

ΕΛΑΤΗ *Græcis.*
Dannenbaum
Tanne *Sil.*

Arbor est excelsa montium
& sylvarum incola, perpetua
fronde virescens vulgo nota.
Strobili eius longi deorsum
propendent.

Cortex exiccat Piceæ mo-
do.

Resina ex tuberculis no-
uellarum Abietum colligi-
tur gustu & odore Terebin-
thinæ persimilis.

Amaricans ei sapor Citrij.
Calculosis, Arthriticis, Asth-
maticis, Gonorrhœa laboran-
tibus mirè utilis. Vulnere
glutinat, & à nonnullis in
medicamentis vice Balsami
additur.

Abrotanum campestre
album.

Αβροτάνιον λευκόν. Dioscor.

Abrotanum sylu. inodorū
coliculis ex viridi albicantib.

Artemisia tenuifolia.

Wilder Beyfuß. *Sil.*

Weiß Besenfraut.

In aggeribus & tumulis
secus itinera passim occurrit.

Iulio & Augusto flosculos
promit Artemisiæ, ad quam
sapore & odore, qui tenuis
aut propè nullus, accedit.
Neglecti vsus.

Abrotanum campestre
rubrum.

Abrotanum inodorum co-
liculis purpurascantibus.

Artemisia leptophyllos
altera.

Artemisia tenuifolia ru-
bens.

Roter wilder Beyfuß. *Sil.*

Rot Besenfraut.

Iisdem delectatur natalib.

Absinthium vulga-
riissimum.

A 3

A 4

A. ἄβρινος Diosc.

Abinthium commune, rusticum.

Wermuth.

Grabkraut.

Hoc nihil vulgatus. Olim frequenter ad sepulchra in cœmiterijs plantabant, & feretris imponebant, vt & hodie multis locis.

Iulio, Augusto & Septembri floret & semen fert.

Amaram cum acri & adstringentia vim possidet. Calefac. 2. siccac. 3. ordine. Exterget, roborat, discutit.

Aduersus diuturnas & protractas febres, præsertim Tertianas magno sapendine ro præsidio est. Ventriculum confirmat, Cibi appetentiam excitat, Iecinori robur addit, ac ipsum ab obstructionibus liberat, Vitiosos humores per vrinas expurgat.

Vulgus recentes cymas cū Matricaria & Rutâ aduersus fastidia, lumbricos ventris & aëris contagia ieiuno stomacho deuorare solet.

Cereuisia & vinum ex eo parantur cōtra eoldē affect⁹.

Sal Absinthij sudores mouet, Hydropicis vtile.

Abinthium montanum.

Abinthium vulgare minus.

Bergwermuth.

Vulgari ad omnia simile, nisi quod exilius sit, ad summum duorum dodrantum altitudinem attingens.

In ruderibus arcis Talkenstein, & alijs montosis: sed rarius.

Ob odorem & sapore gratiorem præfertur vulgari in compositionibus.

Abinthium Ponticum.

Abinthium Ponticum tenuifolium incanū, *Cass. Bauh.*

Abinthium Romanū. *Offic.*

A. ἄβρινος ἁβρινος. Galen.

Pontischer Wermuth.

Böhmischer Wermuth.

Albkraut. Albkraute. *Sil.*

Vulgata est notitiæ. Copiosissimè in Boemiæ apricis ad Poidebradū luxuriat. Radix mirè serpit & sese propagat.

Autumno floret.

Medium inter Abinthium & Abrotanum.

Amarum est suauiter.

Ventriculo & Iecinori gratum ex vino haustum: purgat sanguinem ex sero caprillo. Vulgus Infantibus supponit contra Incubum & alia veneficia arcenda.

Conserua ex foliolis tenerimis, in frigidioribus Ventricu-

triculi affectibus, Hepatis ob-
structione, Ictericia, Hydro-
pe & Cachexia magni vsus.
Compositionibus vtiliter
miscetur.

Acer maior.

Σφένδαμνος Theoph. Dod.
Platanus germanica. Trag.
Opulus montanus Gesn.
Acer montanum.
Ahorn.
Ein Orle/Orlenbaum/Sil.
Arbor est alta montibus
propria.

Flores exponit Maio.
Materies ligni candidior
ab Arcularijs ad Mensas &
sedilia eligitur.

Acer crispum.

Acer bruscum, intortius,
crispum.
σφένδαμνος Theoph. Bel-
onio.

Orleener Glader/Sil.
Eius materies crispa ad o-
pera lautiora eligitur.
In montibus cellis nasci-
tur, non adeo frequens.

Acer simplicior.

Acer molluscum simpli-
cius sparsum.
Schlechter Glader.
Plinius lib. 15. cap. 16.

Acer minor.

Κληδοχρον Antiquis.
Opulus campestris Gesn.
Leinbaum/Milchbaum/Sil.
Passim editis & montolis
locis, descendit tamen inter-
dum & ad campestria.
Huius turiones lacte scatu-
riunt instar Ficus.

*Acetosia maior vul-
garis.*

Οξυς Diosc.
Ανδρυσ.
Acetosia pratensis C. B.
Acidus Rumex.
Lapathum oxalida.
Sauerampffer.
Sauerlamp.
Tritæ cognitionis herba,
hortis & pratis latioribus fa-
miliaris.
Refrigerat, siccatur ord. 2.
Digerit, aperit, incidit non-
nihil humores lentos.
Ventriculum astuantē re-
frigerat, appetitum Cibo-
rum excitat, Iecinoris calo-
rem temperat.
Biliofis ac pestilentibus
Febribus aduersatur.
Radix Hepatis ac Mesarai-
carum soluit obstructions, in
febribus vtilis.
Semen medicamenti ad-
ditur Cordialibus.

Aqua.

Aqua destillata & succus in frequenti sunt usu febrientibus contra aestum, sitim & lapsam appetentiam.

Aestiuis Mensibus Acetosa ciborum multorum utile cōdimentum.

Acetosa alpina.

Acetosa maior montana.

Oxalis Montium.

Bergsauerampffer.

Vulgari est similis præter folia, quæ latiora & magis succulenta; nonnihil amaricantia.

Plurima ad riuulos Montium altissimorum locis herbidis.

Acetosa lanceolata maior.

Ὠξυς μικρά.

Acetosa minor nobilior.

Oxalis tenuifolia sinuata veruecina. Lob.

Schaffampffer / Spießampffer.

Klein edler Sauerampffer / Sil.

In hortis & pratis graminosis. Satā longè feliciter & pinguius prouenit.

Palato gratior est quàm vulgaris.

Acetosa minima.

Acetosa lanceolata minor.

Oxalis aruensis.

Feldtampffer.

Ackerfauerampffer.

Agris incultis & collibus squallidis ac macilentis multa.

Semine cum prægnat, tota rubra apparet.

Acetosa triphylla.

Ὠξυς τριφυλλος.

Oxys Piniana. Lobel.

Trifolium acetosum vulgare, C. B.

Buschfauerampffer / Sil.

Buchampffer / Gauchampffer.

Säntlee / Sauerflee.

Sectatur opaca & umbrosa loca sylvarum & Montium, ad radices truncosque Arborum antiquarum frequens.

Flos Aprili & Maio emicat lacteus & purpurascens.

Sitim arcer, Iecur refrigerat, Cor roborat: putridis ac foetidis Oris vlceribus, & eadem quæ Oxalis præstat.

Succus cum saccharo Stomacho dissoluto gratus. & febricitantibus pestilentialibus utilis.

Aconitum luteum maius.

Ἀκόνιτ-

Ἀκόνιτον λυκοστόνον.
Aconitum lycoctonon luteum.

Luparia r. Tragi.

Napellus luteus, Nonn.

Geele Wollfwurtz.

Geele Narrenkappen.

In Montium saltib. quandoq; reperitur. Iunio & Iulio flores ostendit.

Homini & reliquis Animalibus exitiale.

Aconitum caeruleum.

Aconitum lycoctonon caeruleum maius.

Luparia caeruleo flore.

Blau Wollfwurtz.

Ramosum est & ad trium cubitorum altitudinem asurgit.

In pratis ad Boberum agri Hirsbergij.

Aconitum racemosum.

Napellus racemosus, Dod. Lugdunensib.

Christophoriana, Dod.

Helleborus niger, Rhizotomis.

Schwartzwurtz/ Sil.

S. Christoffels frant.

Heidnisch wundfrant/Tonsoribus.

Salientibus montosis fre-

quentissimum, floret Iunio, Augusto: Septembri baccas fert in racemis nigras.

Radix amara Hellebori modo purgat, colore nigra. Exitialis fertur ac non minus noxia quam Aconitum. Ab hoc caueant sibi pharmacopœi.

Aconitum saluterum.

Βυλβύλον.

Aconitum monococcon, Cordi.

Aconitum quadrifolium bacciferum.

Herba paris.

Vua lupina.

Einbeer/ Augenfrant.

Gut blatter frant.

In syluis Montium opacis pingui ac lato solo frequens. Baccæ Iunio maturitatem assequuntur.

Herba tota refrigerat & ficit, facultate Solano proxima.

Baccarum pulvis eos iuuare creditur drachmæ semis pondere viginti diebus potus, qui aut ex Morborum diuturnitate aut veneficijs amentia tenentur.

Antidotis adduntur, quæ contra deleteria pharmaca parantur.

B

Vulga

Vulgato experimento bac-
cæ trita cum folijs, pustulis
nigricantibus, etiam pesti-
lentialibus vtiliter impo-
nuntur.

Acorus palustris
norhus.

Lilium aquaticum lute-
um, *Lob.*

Acorum falsum, *Matthiol.*

Iris lutea palustris.

Πρόδρομος.

Geelwasser Lilgen.

Drachenwurtz.

Tropffwurtz / *Sil.*

Maio & Iunio in palustri-
bus & piscinis floret.

Radix vere & Autumno
legitur, & in umbra, scissa ex-
iccatur.

Exiccat, calefacit partum
dum sicca est, acrimonia ex-
igua pollet. Attenuat, robo-
rat, adstringit, resoluit.

Dysenterias, Alui fluxio-
nes, Menstrua & sanguinis
profluvia sistit.

Adiantum album.

Ἀδαντον, quod folium a-
qua non madescat.

Adiantum candidum
Theoph. Dod.

Capillus Veneris *Offic.*
Belg.

Ruta muralis.

ManerKautte.

SteinKautte.

Locis saxeis & è scissuris
iuncturisque Murorum anti-
quorum lubens profilit; cu-
ius folia non prius, quam
noua emergant, marcescunt.

Adiantho gallico tem-
peramento haud absimile.
Tenuium est partium. Ex-
calefacit & siccatur sine mor-
su. Ciet. vrinas, calculum
pellit: viscerum obstructio-
nes tollit: ad tussim infestam
& hydropem vtile. Venena-
torum Animalium moribus
medetur.

In defectu commodè pro
capillis Veneris Gallicis sub-
stituitur.

*Adiantum album cri-
spum alpinum.*

Braussen Frauenhaar.

Brause Steinfärrlin.

E radice plurib. tenuibus
capillamentis implicata, Co-
liculi plures, graciles, iuncea,
laues, in summo brachiati
nascuntur, foliolis Adiantho
albo similibus, magis viren-
tibus, crassioribus, crispis,
ac veluti punctis Ledi insi-
gnitis, absq; flore & semine,
aspectu iucunda plantula.

Rarif-

Rarissimum inuentu: non
nisi altissimorum Montium
petrosis oritur, Im Rau-
schengrunt.

Eiusdem cum Adiantho
facultatis.

Adianthum nigrum.

Adianthum folio Filicis,
Dryopteris nigra, Dodon.

Schwartz Frauenhaar.

Groß Frauenhaar.

Adnascitur petris & sco-
pulis Montium.

Pares cum prædictis habet
vires.

*Adianthum ru-
brum.*

Polytrichon, Officin.

Saxifragia rubra.

περχομαρὲς Diosc. Lob. *μαγὰ
μαρὰ πέλχα*, à rasis capillis.

καλλιπεριον.

Rote Steinraute.

Schwartz Steinbrech.

Jungfrauenhaar.

Schwartz Wiedertthö/Sil.

Vbiuis in syluis & monti-
bus ad petras & saxa pluri-
mum. Amat opaca.

In caliditate & frigidita-
te symmetrum est. Verum
desiccatur, extenuatur, digerit.

Calculos è corpore mire
pellit frangitque, Ad urinæ
destillationes vnicè facit.

Arthericis commendatur,
& lixiuio additur in deflu-
xionibus.

Aduersus veneficia & in-
cantationes tam hominū quā
inmentorū à vetulis super-
stitiosis passim vsurpatur.

*Adianthum fur-
catum.*

Ἀδανθὸν ἀκροφύσιον, Ioh. Thaly.
Saxifragia montis Salcoæ,

Lob.

Filix saxatilis, Tragi.

Holostium petraum Ta-
bernæmont.

Filicula petraea.

Kleiner Wiedertthön/Sil.

Steinfärrlin.

Stein Schlangenzwang.

Saxosos & incultos steri-

les colles sequitur, in territo-
rio Hirsbergensi frequens.

Gustu exiccat & adstrin-
git; gratum satis, & cuius-
dam lentoris non immune.

Aegopogon pratense.

Μελιότων Theoph. Nonn.

Regina prati, Dodon.

Vlmaria Clus. Dalechampsio.

Potentilla maior, Angul-
lara.

Barbicapra, Muscarium

D. Iohannis.

Schmalkraut

Mälkraut

B 2

} Sil.

S. Joz

S. Johannis wadel/*Sil.*

Mätfraut Borussis.

Copiosissimè marginibus herbidis, pratis umbratis vdis latioribus Montium luxuriat, Iulio & Augusto flores in umbella odoratos ostentans.

Pimpinellam odore refert. Refrigerat, siccatur, coniuncta adstringendi facultate; nec tamen calore destituitur. Resoluit, discutit, anodynū est.

Pota herba Colicis doloribus & Dysentericis utilis. Sanguinem sistit, fistulas ulcerasq; maligna sanat.

Tusa cum floribus addita farinā hordeaceā instar Cataplasmatibus imposita exsiccat, discutit aquosos pedum tumores, furculos extrahit, cuspidēs & tela.

Aqua ex herba & floribus Iulio elicitur odorata, ad calidos Podagricorum tumores, dolores, Erysipelata, aliasq; externarum partium inflammationes. Pota sudores elicit, Hydropicis vsui.

Aegopogon syl-

uaticum.

Δευμοπαζων Tabern.

Regina sylvarum.

Vlmaria maior, Thal.

Medesufium, *Cordi.*

Argentilla maior.

Waldbart.

Wald Geißbart.

Wald S. Johannis Wadel.

Obscuris syluis & conualibus Montium ad Zacum & Quissum fluuios nascitur, non ita frequens ut prius, Iulio fl. & Augusto.

Calefacit & siccatur, saporis amari & adstringentis.

Radix bilem purgat, Aluum soluit Vino & Melle decocta.

Folia tumores resoluunt, extrahunt sagittas & aculeos.

Aqua seu decoctio vlcera curat gallica.

Aegylops I.

Αἰγύλω Galen. Diosc. Tabern.

Aegylops, *Mattiol.*

Festuca graminea, *C. B.*

Festuca 2. *Dod.*

Bromos sterilis 2. *Lob.*

Trespe/*Sil.*

Lüldy/ Gauchhaber.

Proprie Secalis est vitium apud nos.

Cum alijs enim frumentis aut non, aut rarissime reperitur. Succrescit per imbres frequentes & pluuiosam Aestatis constitutionem.

In ci-

In cibum venit cum Secali absq; nocumento. Minus tamen nutrit.

Aegylops II.

Aegylops bromoides Belgarum, *Lob.*

Festuca prior, *Dodon.*

Haber Trwalch.

Taub Haber.

Non modò inter Hordeũ, sed etiã cum Secali enascitur.

Aegylops III.

Bromus herba, *Dios.*

Bromus herba, *Dod.*

Festuca siue Aegylops 2. *Tabern.*

Gramen Aegylops, *Iohan. Bauh.*

Auena sterilis.

Taubhaber / *Sil.*

Habergras / Haberfraut.

In pratis aridiorib. & aggeribus secus vias & agrorum margines neglecti vsus.

Aegylops IV.

Aegylops 3. *Tabern.*

Hordeum spontaneũ spurium Herbariorum.

Hordeum murinum.

Holcus Plinij, *Anguill.*

Gramen Hordeaceum minus, *C. B.*

Taub Gersten / *Sil.*

Mense Gerste.

In aggeribus & ad urbium mœnia passim oritur.

Straminis cineres Oedematis Podagricorum conferunt.

Alchimilla.

Agrostis seu *Agrostis*, *Cordi.*

Pes Leonis, *Fuch.*

Sanicula maior.

Sinnam / Syndam } *Sil.*

Wschütz

Genselgrün.

In pratis aditioribus & riguis Maio floret.

Subamara est, sicca & adstringens. Ad internas exulcerationes Viscerum & Hernias ex vino bibitur. Decoctis vulnerarijs vtiliter additur. Chirurgis nota.

Alliaria.

Alliaria, Alliastrum, *Gesn.*

Thlaspidium cornutum,

Cratera.

Pes Asini Pandectarum.

Bnoblachsfraut / *Sil.*

Leuchel / Salskraut.

Iuxta sepes locis incultis: in hortis etiam vmbrosis locis. Ad ripas etiam Boberi Salicetis & alnetis caduis. Maio flosculi vigent. Aprili folia recentia ad intinctus & fassamenta adhibentur.

Calefacit & sicce. remissiũs

B 3

multo

multo, quam Allium, Aperit, digerit, prouocat.

Decoctum Asthmaticis succurrit.

Succus febribus malignis conuenit.

Allium alpinum.

Allium alpinum, Matthiol.

Allium serpentinum, Lob.

Victorialis longa aut maior, Cl. P.

Mandragora montana falso Quibusdam.

ἰσχυρότερον.

Alpen Knoblauch.

Lange Siegwurtz.

Aller Mann harnisch

Wilder Alraun

Berg Alraun

Sil.

Luxuriat vbertim humidis & herbidis Suditorum recessibus, veluti in Schneegruben/ Riesengrund/ & alijs multis locis, Iulio floret. Duplex est, Mas vnica radice constat.

Alraun Männlin.

Fœmina, binis coniunctis.

Alraun Weiblin.

Excalescit, siccatur perinde ac Allium agreste.

Aquas corruptas emendat: Serpentes abigit odore, Bestiarum omnium ictibus medetur potu, cibo, illitu.

Allium incolæ vescuntur folijs aduersus corrupti Aëris & nebularū exhalationes.

Agrytæ radices syndone rubro inuolutas pro Mandragora credulæ plebeculæ obtrudunt, multa de earum viribus, nescio quæ vana & ridicula, garrientes.

Allium caninum.

Συβοδὲν ἄγριον.

Allium sylvestre vulgare caninum tenuifolium.

Allium iuncum aruense.

Acker knoblauch.

Wilder knoblauch.

Arui oritur macilentis & frumentaceis. Aprili prodit.

Sapore & odore Allium refert, calidum & siccum. Venenis aduersatur.

Vrinam ciet & Menses elicit potenter.

Allium Vrsinum.

Allium sylvestre bifolium *Gesn.*

Ampeloprason, Dod.

Moly Hippocratis, *Aduersaria.*

Allium nemorense.

Μῶλυ παρὰ τὸ μολύβειν τὰς ῥίζας.

Wald knoblauch.

Beer knoblauch.

Ramsfren/ Ramsfricht/ *Sil.*

Sigcu.

Sigeuer knoblauch.

In syluis vmbrosis montium. Ad arcē Grettffenstein/ sub fagis & fraxinis.

Flores Maio lactei stellati complures Ornithogali conspicuntur.

Contra venena efficacius satiuo censetur.

Folia recentia cum piscium falsamento in condimentum veniunt.

Annus.

Kalliga, Theophrasti.

Erle.

Erlenbaum.

Arbor vliginosis ac humectis locis notissima. Iulicrumpunt Vere, semen Autumno excidit.

Folia resoluunt, restringunt, delassatosq; recreant: illita tumores discutiant & inflammationes reslingunt: Plantis pedum supposita fatigatos viatores iuuant, ob id Tabellarij folia calceis imponunt. Pulices necant Rore matutino aspersa & in cubiculis sparsa.

Interioris corticis decoctum Dentes mobiles confirmat cum modico Alumine & dolorem cohibet.

E cortice & fructu color ater conficitur.

Alfne media.

Ἀλσύν, Dioscor.

Melos.

Alfne vulgarissima.

Hippia minor, Lob.

Auricula Muris, Antiquor.

Morsus gallinæ.

Bünerdarm.

Weisser Meyer, Sil.

Alfiosis non modò, sed etiam parietinis & imbricamentis oblectatur. In hortis oleraceis sæpe integras areas cooperit.

Frigidæ & aqueæ est essentia. Cirra adstrictionem refrigerat & humectat.

Herba in iure pingui decocta & deuorata Hæcticis prodest.

Stillaticius liquor infantibus tabe ferè absuntis vtiliter propinatur.

Alfne minima.

Morsus gallinæ minimus.

Passerina, Ruellij.

Kleiner Meyer.

Vogel Meyer.

Locis asperis & ruderatis.

Auiculæ caueis inclusa, cum escam fastidiunt hac recreantur.

Alfne maxima.

Alfne palustris.

Alfne

Alfne maior, Dod.
 Großer weißer Meyer.
 Groß Vogelkraut.
 Riuiorum & torrentium
 marginibus opacis ac hume-
 ctis gaudet. Maio flosculos
 promit lacteos stellatos.

Alfne petrea.

Alfne omnium minima.
 Stein Meyerlin.
 Petrosis Iunio & Iulio re-
 peritur.

Alfne spuria I.

Alfne hederacea Tabern.
Alfne spuria prior Dod.
 Morfus gallinæ folio He-
 derulæ Lob.

Roter Meyer.

Roter Hünerdarm.

Iuxta sepes reptat. Pri-
 mo vere flosculos edit pur-
 purascentes.

Inspida est & odoris ex-
 pers.

Alfne spuria II.

Alfne folijs Triflaginis,
 Lob.

Alfne cœrulea.

Blauer Meyer.

Blau Hünerbisß.

In hortis oleraceis, etiam
 in agris demessa segete.

Plantula est vix vnciam
 alta, cui flosculi cœrulei Cha-

madryos pratensis, Aprili
 Menfe.

*Alfne folijs Ve-
 ronica.*

Hünerdarm mit Ehrens-
 preis blettern.

Iisdem fruitur natalitijs.

*Alfne erecta Ru-
 tafolia.*

Alfne parua recta folio
Alfines hederaceæ, sed Rutæ
 modo, diuiso Lob.

Veronica pratensis, Dod.

Hüner Kautte.

Secus vias locis gramin-
 sis, & in pratis humentibus
 Maio flosculos obsoleti co-
 loris explicat.

Alfne fontana.

Brunnen Meyer.

In riuiulis limpidis pigre
 labentibus, folia pingua,
 crassiora, Portulacæ fere in-
 sipida habet.

Alfne palustris.

Alfne aquatica, Lugdun.

Alga facie Alfines.

Wasser Meyer.

In palustribus & aquis re-
 sidibus.

Alfne fluuiatilis.

Alfne aquis innatans.

Glute

Flutt Meyer.

Fluß Vogelkraut.

Aquis innatat longissimis
coliculis & folijs Alfinis vul-
garis.

Alfine muscosa.

Alfine tenuifolia musco-
sa, C. B.

Moß Meyer.

Vdis Montium inter Mu-
scum nascitur.

Alfine alpina.

Alfinanthemon Ioh. Thal.

Pyrolæ species peculiaris
Nonnullis.

Radix candida multis fi-
bris gracilis colicolum præ-
mit singularem, rectum, te-
retem, gracilem, palmarem,
inferna parte nudum, supe-
rius verò per ambitum, qui-
nis, senis, septenisve oblon-
giusculis, fescuncialibus, læ-
uibus, viridib⁹, fibratis folijs
donatum, è quorum medio
pediculus tenuissimus vni-
cus vt plurimum, nonnun-
quam bini aut terni, qua-
drantali ferè longitudine ex-
urgunt, in cacumine suo sin-
guli sustinentes lacteum Al-
finis floribus æmulum, quem
capitulum sequitur rotundū,
Coriandri semine minus, in-

tus semina nigra tenui can-
didaque membrana inuolu-
ta concludens.

Aprili, Maio, Iunio, Iulio
flosculi conspiciuntur lactei.

Gaudet locis perpetua vi-
ligine irriguis, in iugis Mon-
tium vnterm Knickholtz / in
syluis item herbidis iuxta
truncos arborum occurrit.

Siccandi vi pollet.

Anagallis rubra.

Ἀναγallis, Dioscor.

Anagallis mas Phœnicia,

Lobel.

Corcorus Plin. Nonnull.

Corallia.

Roter Meyer / Sil.

Roter Gauchel / Grundheil.

Tota æstate florem fert in
Autumnū vsque in agris,
hortis oleraceis, solo ac læ-
to cultu.

Calidæ est naturæ & sic-
cæ. Extergit, mundat, expel-
lit, attrahit, mitigat.

Succus Naribus inditus aut
gargarizatus Caput purgat
eliciendo pituitam.

Duros abscessus trita & im-
posita maturat, rumpit Vulgi
experimento.

Aduersus pestem com-
mendatur & rabidis Cani-
bus medetur.

C

Ana-

Anagallis lutea montana.

Anagallis lutea, Lob.
Nummularia syluatica vel
mas, Gesn.

• Gelber Wald Meyer/ Sil.
• Geel Grundheil.

Floribus aureis Iunio &
Iulio nemoribus montosis,
vmbrosis conspicua.

Vulneraria est. Potionibus
vulnerarijs additur.

Anagallis aquatica I.

Σίον, Dioscoridis, Trag.

• Anagallis aquatica.

Anagallis aquatica maior
rotundifolia.

Sion vulgare & mai⁹, Trag.

Berula maior.

Becabungia Germanis.

Wasser Gauchel.

Bachpungen.

Pfunde/ Sil.

Señatur pratenses riuu-
los, in pigris aquis aut sub-
killijs.

Gustu tota acrior Nastur-
rij, facultate tamen & viribus
inferior. Scorbutum sanat,
Calculos rumpit, & vrinam
ciet.

Ad acetaria verno tem-
pore colligitur.

Sæpe reperitur tota insi-
pida.

Anagallis aquatica II.

Anagallis aquatica angu-
stiore folio.

Schmalblättrichte Pfunde.

Gaudet palustribus & ri-
uulis, in quibus tota hyeme
viret.

Omni odore & sapore de-
stituitur.

Anagallis aquatica III.

Anagallis aquatica minor.

Kleine Pfunde.

Locis iisdem: sed rarior.

Angelica alpina I.

Angelica Slesiaca maxima.

Archangelica, Dod.

Grosse Berg Angelica auff
der Iserwiese.

Caulem fert brachij cras-
situdine tricubitalem. Ra-
dix longior crassa, pauciori-
bus fibris donata.

Ad ripam Iseræ fluij ma-
ioris oritur.

Contra venena vsurpatur,
& eadem quæ satiuæ præstat.

Angelica alpina II.

Angelica vera alpina.

Angelica alpina nobilior.

Angelica montana C. Bauh.
Brustwurtzel.

Lufft

*Luffmurtzel/ Rhizotomis
Sil.*

Satiua Angelicæ similis est; at tota minor: Folia ex atro virent: Radix in pauciores, sed crassiusculas fibras diuarricatur.

In præruptis Montium iugis & saxorum fissuris oritur.

Magnæ, in Pectoris affectibus, commendationis. Expurgat, abstergit, attenuat lentos & viscidos pectoris humores: Ob id Asthmaticis, & quibus Pulmones crassa & viscida pituita infarcti sunt, saluberrima. Tussi inueteratæ opitulatur & venenis resistit.

Angelica alpina III.

Angelica montana Slesica vulgarior.

Angelica sylvestris montana, *Camer.*

Angelicæ varietas, *Aduersf.*
Berg Angelick.

Geistwurtzel/ Sil.

Hæc in montibus frequentior, solo pingui inter saxa herbidis locis.

Acerrimi est gustus Radix, luteo & lento turgens succo: ideo cæteris omnibus valentior.

Manfa os, linguam & fauces maximè vrit & inflamat, Calida & sicca ad quartum ferè gradum.

Corrigitur aceto macerata radix, quæ ore manfa, æris maligni arcet contagia.

Angelica aquatica.

an *μαρίδαρις*, Theoph?

Angelica sylvestris, *Thal.*

Angelica minor aquatica, *Tabern.*

Wild Angelick/ Sil.

Wasser Angelica.

Wild Geistwurtzel.

Passim in pratis, secus fluenta occurrit.

Ob acrimoniam minorem cibus condiendis aptior. Corrigit prouentum saburramq; crassorum & viscidorum humorum, atque foetidum halitum emendat tetri spiritus ex praua concoctione manantis.

Angelica erratica.

Αιγανόδιον, *Tabern.*

Angelicæ vitium, *Trag.*

Herba D. Gerardi, *Dodon.*

Podagraria Germanis, *Aduersf.*

Giersig/ Gierisch/ Sil.

Zipperlinfraut.

Adeo restibili & importuno pro-

no prouentu iuxta sepes hor-
torum & parietes vdis vm-
brofisq; locis pinguibus lu-
xuriat, vt vix inde possit ra-
dicitus deleri.

Odor ei satis fortis, mul-
tò tamen imbecillior An-
gelica.

Adduntur folia recentia
tenera oleribus, Radix ali-
quot diebus ex vino pota fe-
bres putridas sanat.

Vulneraria est: Podagri-
cis optimè facit.

Anthyllis leguminosa.

Ανθυλλίσις, Tabern.

Anthyllis vulneraria, *Gesn.*

Artherica Saxonum, *Thalij.*

Beruffkraut, *2 sil.*

Sendelweis, *5*

Geel Hasenflee.

In collibus apricis & pra-
tensibus locis nascitur. Flos
ei Iulio & Augusto albus &
luteus. Vulneraria est. Ma-
nus dealbat vi abstersoria.
Contra effascinationes cunis
Infantium imponitur anili
superstitione.

*Antirrhinum me-
dium.*

Ἀντίρρινον, Diosc. Dodon.

Antirrhinum syl. maius.

Antirrhinum, *Plinij.*

Orontium, *Archigenis.*

Wilder Orant.

Wilder Hundskopff.

Brackenheubt.

Locis cultis circa margi-
nes, & in ipsis agris. Iulio &
Augusto floret: hyeme perit.

Auriginem morbum seu
Icterus potu discutit.

Antirrhinum minimum.

Antirrhinum minimum
repens, *Lob.*

Klein Beruffkraut.

Hundschädel.

In aruis & incultis proue-
nit agris.

Ad philtra accommodatur.

Aphaca.

Ἀφάκη, Diosc. Aduers.

Pitina Theoph. *Anguillaria.*

Orobanche, *Lugdunensib.*

Feldwicken.

Wildewicken.

Vogelwicken.

Herba tenera capreolis se-
sultinens.

In campis inter Legumi-
na, Triticum, Secale & alias
fruges enascitur.

Semē adstringendi vi pol-
let: torrefactum Stomachi a-
liasque fluxiones sistit.

Apium montanum.

Ὠρεο-

ὄρεοσέλινον Diosc. *Clus. P.*
ὄρεοσέλινον ἐρχυλον seu ἐνοπον,
Gesn.

Polychrestum *Cordi.*

Polytmetum *Gesn.*

Montapium.

Vielgutt/ } *Sil.*

Augenwurtzel/ }

Berg Peterlin.

Amat montosos arenosos-
que tractus. Abundè propè
Gryphibergum in pratis ad
Quisium fl.

Iulio & Augusto flores in
vmbella, cum semine Ane-
thi nigricante, ostendit:

Radix longissima calida
& sicca tertio recessu. Exte-
nuat, aperit, incidit, vrinas
mouet. Calculos dissoluit,
Menses prouocat, Iecinoris
& Lienis obstructions soluit,
Regio morbo auxiliatur.
Manducata Dentium dolo-
res mitigat ac saluam ciet,
Torminibus ventris succur-
rit, Visum exacuit, & alios
multos vsus præstat.

Apium Cicutarium.

Petroselinum caninum,
Tabern.

Cicuta minor, *Dodon.*

Apij vitium, *Gesner.*

Hunds Peterlin.

Stinckender Peterlin.

Gleisse *Sil.* à splendore.

Abundè luxuriat in hortis
oleraceis, maximè cum Pe-
troselino, cuius est vitium.

Venenosa & perniciofa est
planta.

Aquilina.

πῆθος, *Theoph. Costao &*
Tabern.

Λιοντοσβιον.

Aquilegia, *Matthiol.*

Aquileia, *Dodon.*

Acfeley/ Agley.

Glockenblumen/ *Sil.*

In montibus, collibus a-
pricis & pinguibus pratis.
Maio floret & Iunio.

Temperata ex calore sic-
citat, gustu dulci, tantillum
adstringète. Corroborat He-
par, aperit, conducit pecto-
ri, Pulmoni, eosq; purgat.

Decoctum ex vino & a-
qua addito Diacaryo instar
gargarismatis, ad Fancium
Laryngis & Tracheæ incen-
dium & vlcuscula valet.

Flores Cordiales sunt. O-
mnibus medicamentis cum
vsu misceri possunt.

Radix cum semine ex vi-
no pota ἀδυναμία veneream
corrigit.

Semen Ictericis, Lienis ob-
structionib. Vertiginosis cō-

C 3

petit.

petit. Venenis resistit, pro-
uocat variolas & Morbillos.

Succus instillatus, vulnera
mundat & commodè sanat,
Naribus inditur aduersus fi-
stulas & vlcera Narium Fau-
ciumq; putredines.

Artemisia candida.

Ἀρτεμισία πλεόφυλλος ab Ar-
temisia Mausoli Cariae Re-
gis vxore, quæ sibi hanc her-
bam adoptauit, ἀπὸ τῆς ἀρτεμί-
δος, id est, Diana; quoniã me-
detur Mulierum malis, qui-
bus Diana præest.

Ἀρτεμισία πολύφυλλος Diosc.

Παρθένιον, Apulei.

Artemisia latioris folij,
Dod.

Artemisia foemina.

Weisser Beyfuß.

Weisse Buck.

S. Johannis Gürtel/ sil.

Passim circa vrbes, ad pa-
gos, arces, muros, in conual-
libus & montibus.

Caulis ex viridi albicat;
flore Augulto.

Excalefacit 3. siccatur 2. gra-
du, modicè tenuium partiũ.
Attenuat, penetrat, aperit,
prouocat.

Pectus expurgat à crassis
& tenacibus humoribus, tus-
sim lenit, difficultati anbeli-

tus succurrit. Locos mulie-
bres calefacit, Menses sup-
pressos ciet, secundas, partus
detrahit, Puerperas purgat.

Venenis resistit, medetur
morsui Animalium venena-
torum & canis rabidi. Aë-
rem pestilentem emendat.

Infessibus pro Calculosis
& Hystericis commodè mi-
scetur.

Artemisia rubra.

Artemisia vulgaris rubra.

Artemisia mas.

Roter Beyfuß.

Roter Buck.

Iisdem prouenit locis.

Summitates ex vino rubro
decoctæ Dysentericis vtili-
ter imponuntur & bibuntur.

Per se, vel cum verbasco vi-
no rubro aut aqua chalybea-
ta incocta Tenesmus sanat.

sal Artemisiae sudores &
Menses retentos elicit, ad-
uersus pestem efficacissimũ
remedium multo facto ex-
perimento.

Arundo palustris.

κάλαμος φραγμίτης, Diosc.

Χαρακίαι, Theophr.

Arundo vallatoria seu
phragmitis Dioscoridis Lobel.

Harundo vulgaris Dod.

Cala-

Calamus, Canna palustris.
Rohr/ Teichrohr.
Weiber Ried.

Piscinis, lacubus & ceteris stagnantibus familiaris.

Iulio profert iubam seu paniculas aliquantum purpureas, quæ maturæ in pappos auolant.

Folia recentia Cubiculis insperguntur, ad æstum februm mitigandum.

Radix per se, aut cum bulbis suis illita spicula aculeosque extrahit. Luxata Lumborumque dolores cum aceto mulcet.

Ἀνθὺν paniculæ lanugo, si aures intrauerit, exurdat. Adeo enim tenaciter adherens affigitur, ut auelli non possit.

Afarum.

Ἀπύρον, Dioscor.

Νάρδος ἀγρία.

Afarum Baccharis seu Baccharus, *Aduers.*

Nardus montana, *Cordi.*

Auricula leporis.

Baselwurtz.

Basendhrlein/ *Sil.*

Delectatur Montium conuallibus ijsq; humentibus & umbrosis, solo limoso.

Maior & Autumno floret perpetuò virens.

Acris est radix, subamara & valde odora non vacans adstrictione. Aperit, attenuat, resoluit, prouocat, incidit, calefacit & siccatur 3. gradu. Aluum & vomitiones ciet, urinam elicit, Menses mouet. Crassos pituitosos biliososq; humores educit, scicioris, Fellis ac Lienis infarctus scirrhusosque tumores soluit.

Confert Febribus diuturnis & inueteratis, Asthmaticis, tussientibus, Hydropicis, Ischiadicis. Secundas & foetus pellit.

Lixiuio inditur ad roborandum Cerebrum & Memoriam.

Asclepias.

Ἀσκληπίας, Dioscoridis *Aduers.*

Νικητοξικόν, quasi νίκη τοξάν.

Vincetoxicum, *Dod.*

Hirundinaria, *Tragi.*

Asclepias vulgaris flore albo.

Schwalbenwurtz.

Schwalbenfrant / quoniã cum semen maturescit in siliquis, siliquæ dehiscunt & Hirundinibus volantibus similes sunt.

Colles & saxosos sectatur tractus, velut ad Goldbergam.

gam & montem Acutum, Zabothum & alia loca. Iulio floret.

Radix excalefacit, siccatur primo ordine, digerit, aperit, resoluit. Venenis aduersatur totius substantiæ similitudine; Hydropicos iuuat, Tormina mulcet, Tussi, pectoris vitij auxiliatur. Aduersus Pestis sæuitiam venenosorumq; Animalium ictus ex vino bibitur.

Herba cum floribus tusa Mammis à partu turgentibus cataplasmate imponitur.

Vulneraria est. Sordida & putrida vlcera purgat, & ad cicatricem perducit. Genitalium vitij & Rupturis egregiè medetur.

Asperula I.

Asperula flore albo odorata.

Asperula flore odorato, Clus. P.

Matrisylua, Trag.

Hepatica stellata, Tab.

Gliedegenge/Gliedefraut/Sil.

Waldmeister/WeißStein-leberfraut.

Maio, Iunio & Iulio in syluis altis Montium frequens.

Tota planta odorem sua-

uem Lilij Conuallij spirat.

Calidæ est & sicca natura. Cor exhilarat: vitij Hepatis succurrit. Duros abscessus tusa ac extrinsecus imposita emollit ac discutit. Eius decoctum fotu Articulos firmat. vulg. experimèto.

Vulneraria est cephalica, ad capitis vulnera efficacissima.

Asperula II.

Ἀσπρίνη Dioscor. ὑπὸ τῷ ἁμαπυρὶ ἵνα ἂν simul prætereundo.

Φιλάνθεπος, Plin.

ἰμφαλόκαπος.

Asperula Plin. Dod.

Aparine, Lob.

Bleber.

Blebfraut.

Aestiuis mensibus viget. Vbiuis ferè obuam prope sepes, scrobes, inter sentes, in agris maximè Lini & hortis oleraceis, inuitis Hortulanis.

Abstergit & siccatur modicè, nonnihil habens subtilium partium.

Sanguinis abundantia ex vulnere imposita, folia reprimunt. Cum axungia trita strumas discutunt.

Succus Aurium doloribus medetur, vulnera recentia glut-

glutinat & papularum rimas.

Aqua stillaticia Calculos
frangit & Renes à saburra li-
berat.

Aster Atticus.

**Asne à fleurs*, Dioscor.

Baccharis, quod inguinum
tumoribus medeatur.

Aster Atticus flore cœruleo.

Inguinaria seu Inguinalis.

Blaw Scharten fraut.

Stern fraut/Bruch fraut.

Nascitur circa Opeliâ aspe-
ris & incultis, Augusto floret.

Sapor foliorum asper ac
subamarus. Mistæ facultates
vti Rosa. Modicè calefacit,
digerit & resiccatur.

Herba tusa rabiosi canis
morsib. auxiliatur. Turgen-
tia guttura discutit & Ingui-
nibus illinitur.

Aster Conyzoides.

Aster Atticus purpureus
minor.

Conyza cœrulea.

Conyzoides cœrulea Gesn.

Blaw Dürrewurtz.

Beruff fraut/Sil.

Flosculi Iunio, Iulio & Au-
tumno emicant purpureo cœ-
rulei, asperis siccis & apricis
locis secus itinera, montosis
locis.

Calefacit, siccatur, digerit,
discutit.

Contra effascinationes à
vetulis superstitiosè usurpa-
tur.

Aster luteus montanus.

Aster flore luteo, Mattioli.

Aster Italicus, Lob. & Clus. P.

Aster Atticus, Dod.

Bubonium luteum, Tabern.

Geel Stern fraut.

Geel Bruch fraut.

In dumetis & collibus sa-
xosis.

Radix odorata subadstrin-
gens & siccans amarore aro-
matico modicè ad Cinnamo-
mi saporem accedit, subacri.

Hernijs & Inguinum tu-
moribus utilis.

Astragalus aruensis.

**Asphragos* à radicem cum
talis conuenientia.

Pseudapios Matt. Cam.

Terræ glandes, Dod.

Chamaebalanus, quod in
glandis effigiem radicis ex-
tremum turbinetur.

Erdnüsse/ Acker nüsse.

Schwbrod/ Schweinsbrod
Sil.

Acker / Grund Eichel /
Knollenwurtz.

In agris frumentaceis sub
Zabotho monte, Sapor illi

D

subdul-

subdulcis, glandis aut Castaneæ adstringens.

Ad fluxus Mulierum immodicos, & sanguinis profluuium ex Vesica efficax.

Post messem eruuntur ac colliguntur.

Atriplex caninus.

Χρυσοδάκρυον, Nonn.

Bonus Henricus, Tabern.

Tora bona Spinaciæ facie,

Aduers.

Rumex vnctuosus.

Bachenschar / *Sil.*

Lungwurtz / *S.*

Schmerbel.

Guter Heinrich.

Incultis & ruderatis secus vias, veteres muros & agrorum sepimenta luxuriat. Viget tota ætate.

Excalefacit, siccatur, aperit; detergit magis quam Mercurialis, resoluit, digerit.

Quam proximè ad Spinaciæ naturam accedere videtur, in cibo Mercuriali gratior.

Costa cum oleribus esitata lubricam Aluum reddit.

Bibitur tabidis & phthysicis plebecula experimento.

Vulneraria est & ad Animalium venenosorum ictus commendatur. Vlcera recentia, fordida & vetera expurgat & vermes in ipsis interimit.

Fabris ad Equorum apostemata in usu.

Atriplex sylvestris I.

Ἀνὰ φάξιν ἀγρία, Diosc.

Atriplex agrestis, Trag.

Atriplex syl. sinuata, Lob.

Wilde Mölten.

Scheiß / Schißmölten / *Sil.*

In hortis oleraceis & circum mœnia vrbiū plurima.

Minus refrigerat & humectat satiuam, aliquanto plus digerens.

In cibum venit vt satiuam.

Folia recentia tusa Podagricos dolores leniunt.

Atriplex sylv. II.

Χλωπύρις, Plin.

Atriplex sylv. latifolia lacinis lacinijs, Lob.

Atriplex fimetaria maior, Thal.

Atriplex syl. I. Mattioli.

Chenopodium, Tabern.

Mist mölten / *Sil.*

Sewrod / Gensefuß.

Circa urbium, pagorum, hortorum fimetaria nascitur.

Hanc Tragus lethalem asserit & pestiferam. Sues interimere creditur.

Atriplex sylv. III.

Atriplex fimetaria minor, Thal.

Atri-

Atriplex fyl. 3. *Mattiol.*
 Atriplex olida, pusilla,
 hircina & Vuluaria garum
 elens, *Aduersf.*

Garosmos *Cord. & Dodon.*

Kleine Nistmölten/ *Sil.*

Bocksmölten.

Schamkraut.

Loca amat habitata, vt
 plurimum vbi lotium effun-
 ditur.

Tota vehementer foetet in-
 star putridi Halecum gari.

Atriplex fyl. IV.

Atriplex fylu. Polygoni aut
 Helxines folijs, *Lob.*

Atriplex fylu. 2. *Dod.*

Kleine wilde Mölten.

Atriplex fylu. V.

Atriplex palustris poly-
 caulis.

Wasser Mölten.

In fossis ad oppida Iulio
 & Augusto conspicua.

Auricula Vrsi.

Vide Sanicula.

Balsamina spuria.

Mercurialis fylu. 2. &

Esula fylu. *Tragi.*

Perficaria filiquosa, *Lob.*

Delphinium, *Craton.*

Noli me tangere, *Vulgo.*

Scorpioides, Saltarella.

an Aeschinomene, *Plin?*

Wild Balsamkraut.

Hirschmölten/ *Sil.*
 Springkraut/ *Sil.*

Tota facies & virgulta Bal-
 saminam alterā exprimunt.
 Flores lutei penduli, quos
 sequuntur filiquæ teretes,
 graciles longæ, pendulæ Ga-
 legæ: semina parua subro-
 tunda Balsaminæ claudentes,
 quibus turget simul: ac tan-
 tillum tangitur in vultum
 proximi cuiusq; quasi impe-
 tu vindicabunda & se tangi
 queribunda excluditur.

Oritur frigidis, humidis,
 vmbrosis Montium locis. Ad
 riuulos ex montibus decur-
 rentes multa.

Vulneraria est. Vomitio-
 nes prouocat, vrinas ciet &
 calculum pellit.

Artus luxatos cum Agri-
 monia Agricolarum vsu re-
 stituit.

Liquor stillaticius Podagri-
 cis & pedibus tumentibus
 competit.

Bardana maior.

Agelion, Dios.

Περσώνιον ἢ περσώνις.

Personata *Aduersf. & Mattioli.*

Lappa maior vulgaris.

D 2

Grosz

Grosse Kletten/2 Sil.

Ohmbletter/5

Butzen Kletten.

Rosß Kletten.

Nimis quàm frequens & vulgaris, secus vias & urbium pomeria.

Iulio Mense caulis assurgit altero ex quo nata est anno: flores purpurei Iulio conspiciuntur cum lappulis.

Folia moderatè resiccant, discutiunt, nonnihil adstringunt.

Radix nonnullæ caliditatis particeps; pota ad Calculum & dysenteriam utilissima, purulenta & cruenta extussientibus auxiliatur. trita cum modico salis, morsui canis rabidi medetur.

Folia inueteratis vlceribus utiliter imponuntur. Luxatis & contractis membris profunt.

Bardana montana.

Arctium montanum, Aduers.

Lappa maior, Dod.

Bergkletten/Waldkletten.

Celsis & syluosis Montium opacis familiaris.

Eiusdem cum priori naturæ.

Bardana minor.

κάρδιον Diosc. καρὰ τὸ καρδιον

du, quòd flavos reddat Capillos.

κάρδιον, Galen.

Xanthium Fuchf. Mattiol.

Lappa minor, Offic.

Lappa inueria.

Strumaria.

Kleine Kletten.

Igel Kletten.

Bettlers Leuse.

Iuxta loca habitata secus vrbes, mœnia & scrobes arefactas solo lato & pingui gignitur.

Iulio & Augusto lappæ vigent.

Gustu est amaro & subacri. Calefac. siccant, digerit.

Radix uti & semen tumorum strumarumque pertinaciæ frequenti admotu delet.

Fructus Capillos luteos efficit ex aqua tepida madefactus & illitus.

Herba Cancrorum ardori extinguendo efficax.

Bellis maior.

Bellis maior candida.

Primula veris maior.

Consolida media Herbarior. Lob.

Weisse S. Johannis blum.

Gense blumen.

Grosse Nagelieben.

Vbiuis obuiam, pratis aridioribus.

dioribus, pascuis, agris incultis, collibus, cognitu facilis. Vulneraria est. Folia comansa sanant cum Oristum linguæ exulcerationes pustulasque exulceratas.

Flores præstant ad strumas & Caluariæ fracturas: item ad Thoracis vlcera quæ in eius canitatem penetrant. In quem vsum portionibus additur.

Bellis maxima.

Bellis montana maxima.
Grosse S. Johannis blum.
Hæc duplo maior: sed inuentu rarior.

Bellis minor.

Bellis media, Cl. P.
Bellis sylu. Dod.
Consolida minor, Offic.
Primula Veris, Trag.
Angerblümlein.
Sommerthierlein.
Weisse Früebblümlein.
Kleine Maßlieben.
In pascuis pratis & hortis graminosis max. primo vere conspicitur flore albo, rubro, variegato.
Herba adhuc tenera Veris initio cum sale, oleo & aceto aluum strictam lubricam reddit.

Decoctum collutu faucium ardorem in febribus ardentibus temperat.

Cum symphyto pota sanguine excreantibus prodest.

Inditur Clysterib. non sine fructu in calida intemperie.

Betonica purpurea.

Κέτρον, Diosc.

Βετονικη.

Ψυχρόφορον παρὰ τὸ πρὸς τὸν ψυχρὸν τόπον, quod in frigidis locis nascatur.

Betonica nemoralis.

Vetonica.

Braun Betonien.

Battenien / } Sil.

Zebrkraut / }

Vulgarissima in pratis & alijs herbidis Montium, Maio folia leguntur & Iunio.

Iulio præcipue floret.

Amariuscula est, subacris & odorata. Incidit, aperit, Calefacit & sicc. 2. ordine.

Multi vsus. Pulmonem, Thoracem, Hepar expurgat, abstergit, à putridis & vitiosis humoribus liberat; vnde Tabidis & Hæmoptoicis conueniens remedium. Ictericum sanat: fastidia abstergit & Stomachicos recreat. Vrinasciet, Calculos Renum frangit. Vteri strangulatui medetur.

D 3.

detur.

detur. Ex vino veteri ruptis
& ab alto deuolutis succurrit.
Alui & Intestinorum tormi-
na remouet.

Acidum ruſtantibus, Iſ-
chiadicis, Epilepticis & cæ-
teris Capitis affectibus frigi-
dis vtiliſſima. Vulneraria eſt.

Viatoribus longo itinere
defatigatis vires mirificè re-
ſcit.

Aduerſatur venenis, ve-
nenoforum rabidorumq; A-
nimaliũ quorumcunq; mor-
ſibus ſumta & impoſita.

Lixiuio induntur folia ad
Cerebrum roborandum.

Betonica alba.

Betonica candido flore.

Weiffe Battenic.

Pari pollet facultate.

Betula.

Συμδος ὡδαντος, Theoph.

Betulla.

Bircke/ Birkbaum.

In montib. frequens, Puc-
ris nota.

Semen paleaceum in iulis,
Iulio à vento diſpergitur, ſic-
cantis naturæ.

Folia amara ſunt, Excale-
faciunt, ſiccant, reſoluunt, at-
tenuant, abſtergunt, aperiũt.
Adduntur lotionibus contra
ſcabiem. Cum alumine & a-

qua decocta colorem luteum
dant Piſtoribus.

Succus coagulo admixtus
Caſeum à tereſine & vermi-
bus præſeruat.

Liquor verno tempore e-
licitur vulnerato cortice lim-
pidiſſimus. Potus Renum &
Veſicæ Calculos eiſcit, & Re-
gium curat: illitus faciei ni-
torem conciliat & maculas
delet ſcabiemq; ſanat. Gar-
garizatu Oris, faucium vlce-
ribus medetur.

Ex trunci medijs ſubſtan-
tia aliquando naſcuntur Fun-
gi ſilui, Rhabarbaro ſimiles.

Adſtrictoria vi pollent, ad
ſanguinis fluxus compeſcen-
dos vtilis.

Cremati ligni emanans
liquor oculorum albugines
& cicatrices delet.

Bifolium maius.

Ophris, Plin.

Ophris bifolia maior.

Pſeudorchis bifolium Dod.

Groß Zweyblat.

Wild Durchwachs.

Zweyblat / ſil.

In montibus & conualli-
bus, Vdis & opacis locis.

Maio & Iunio reperitur.

Calidæ & humidæ eſt na-
turæ. Ad fracturas ſanandas
& vulnera glutinanda.

Bifoli-

Bifolium minus.

Ophris bifolia minor.

Pseudorchis, *Dod.*Alisma Diosc. *Cordi.*

Perfoliata sylvestris.

Iisdem natalibus gaudet.

Vulneraria est.

Bifolium III.

Ophris trifolia.

Dreyblatt.

Tribus interdum folijs, sed
rarius, deprehendere licet.*Bistorta maior.*Βεττανία Diosc. *Aduers.*Britannica, *Lob.*Serpentaria, *Mattiol.*Colubrina, *Trag.*Dracunculus *Plin. Dod.*

Natterwurtz.

Schlangewurtz.

Maio & Iunio flores spica-
tos erigit, in pratis & pascuis
frigidis humectis Montium.Radix veluti contorti in-
troque reflexi pollicis digiti
Manus, intus rufescit, saporis
perquam austeri, adstringen-
tis quadantenus Tor-
mentillæ.Refrigerat, siccatur, cohibet,
roborat, adstringit, sangui-
nem sistit, Venenis aduer-
satur: vulneraria est.

Pota fluxiones Alui, Dys-

enterias, sanguinis eruptiones,
Menses immodicos co-
hibet; Abortum reprimat,
Vermes puerorum enecat.Contra Pestilentiam fe-
bresq; pestilentes vtiliter bi-
bitur.Sanguinis grumos ex ca-
su, contusione aut alia causa
discutit.Additur vulnerarijs po-
tionibus.Pulvis Melle affixus, scor-
butum sanat.*Bistorta minor.*Serpentaria mas, *Fuch.*Bistorta vulgaris, *Clus. P.*

Blein Natterwurtz.

Radix minor & nullis pe-
nè fibrillis, formâ serpentem
aut vermem imitatur.Succus aceto permixtus
lintheo circa collū impositus,
Narium hæmorrhagiâ sistit.Dentium dolores mulcet
recens admota vel cum Alu-
mine & pyrethro decocta,
fluxionesque eò decurrentes
sistit, Agricolarū vulgato vsu.*Bistorta alpina ma-
xima.*

Grosse Berg Natterwurtz.

Quadruplo maior vulga-
ri Radix, Caulis ad duorum
cubitorū assurgit altitudinē.

Secta-

Seclatur altissima, Suditorum iuga, velut ad Gigantum, Albis fontes Schneegruben.

Pari cum prædictis pollet facultate.

Blattaria lutea.

Χειρόγονος Diosc. Aduersf.

Blattaria Plin. Lob.

Verbascum leptophyllum.

Cordi.

Schabenfraut.

Goldknöpflein.

Wilder Möllig / Sil.

In marginibus campestribus lutosisque aggeribus. floret Iunio.

Amara est calidaq; & sicca gustanti.

Blitum album.

Βλίτον λευκόν, Diosc.

Blitum maius, Dod.

Beta insipida seu fatua.

Weisser Meyer.

In campis, hortis & areis secus itinera. Sine sapore & acrimonia vili, frigida & humida naturæ, Stomacho inutile.

Blitum rubrum.

Blitum minus rubrum, Martiol.

Blitum rubens, Dod.

Blitum rubrum lupinum, Lob.

Olus rubrum.

Blutt Kraut / Sil.

Koter Meyer.

Sponte in hortis oleraceis.

Refrigerat, humectat, emollit. In cibum venit Nonnullis instar Atriplicis: sed nullum dat nutrimentum.

Suffitus herbæ Menses remorantes prouocat, Molas & Secundas educit.

Ad Pecorum hæmorrhagiam vulgi medela.

Blitum sylvestre.

Βλίτον άγριόν.

Πολύσπερον.

Polyspermon, Anguil.

Fischmölten.

Wild Meyer.

Wild Traubenfraut.

Palsim secus vrbes, etiam in hortis oleraceis oritur.

Brassica syl. Napifolia.

Brassica syl. 2. Dod.

Brassica campestris 1.

Clus. H.

Perfoliata filiquosa, Aduersf.

Perfoliata Napifolia, Tabern.

Wilder Durchwachs.

Durchwachs mit steckrüben blettern.

Inter

Inter fegetes in Guß-
mansdorff.

Oleracea est gustu neutri-
quam acris.

Brassica syl. Glastifolia.

Brassica sylvestris virgata,
Cord.

Sinapi album, Lugdun.

Turrita, Clus. P.

Glastifolia filiquosa, I. B.

Wilder Kohl.

Thurnfrant.

Passim ad muros & secus
itineria montosis occurrit.

Iunio floret, semine in fi-
liquis longis succrescente.

Bryonia.

"Αμπελος λευκή, Dioscor.

Βρυονία, Galen.

Bryonia alba baccis ni-
gricantibus.

Vitis alba Fuchf. Aduersf.

Stickwurz.

Jaunküben/ Gichtküben/
Sil.

Propter sepes & secus iti-
nera. Aestate floret.

Radix moderatè calida de-
siccatur & abstergit cum partiū
tenuitate. Purgat bilem & fe-
rosos humores, urinam tra-
hit, Cerebrum mundat, Pe-
ctus & Nervos à pituitosis
putridisque excrementis li-
berat. Viscerum obstructio-

nes aperit. Renes à Calcu-
lo expedit. Comitialibus, At-
tonitis, Vertiginosis, Paraly-
ticis vtiliter datur. Corrigi-
tur Mastice, Cydonijs, &c.

Ex vino pota vtero suffo-
catas mirificè restituit.

Corpus abstergit, Cutim
erugat, vitia Cutis in facie e-
mendat, suppuraciones rum-
pit, sugillata tollit, & redu-
cias committit.

Folia, fructus vlcerū pha-
gædenis, Cancrenis, putren-
tium tibiæ tædio effica-
citer cum sale illinuntur.

*Buglossum germa-
nicum.*

Buglossa maior, Trag.

Buglossa vulgaris, Dod.

Buglossum angustifolium
germanicum.

Buglossum vulgare, Officin.

Deutsch Ochsenzunge.

Gemeine Ochsenzunge.

In agris frumentaceis &
secus itinera circa Viaticula-
m.

Flores purpurei, aliquan-
do rubri, rarò candidi à Maio
vsque in Aestatis finem vi-
suntur.

Cordiales sunt, tristitiam
depellunt, mœrorem excu-
tiunt, hilaritatem excitant,

E

VO-

voluptatem afferuat & Cor
roborant.

*Buglossum syl. spi-
nosum.*

Buglossum erraticum a-
sperum Echioides, *Aduers.*

Echium germanicum spi-
nosum, *Fuch.*

Wild Ochsenzung.

Lieb Eugelin / *Sil.*

Folijs est asperis oblongis,
at multò minoribus, flosculis
elegantè cœruleis, sed exi-
guis.

Per totam æstatem in a-
gris tam cultis quàm incul-
tis reperitur.

Flores Cordiales sunt &
primo aspectu suavi colore
oculos exhilarant.

Buglossum syl. nothum.

Buglossæ syl. species, *Thal.*

Alysson germanicum E-
chioides, *Lob.*

Aparine, *Plin.*

Blaw Kleber.

Groß Klebefraut.

Locis apricis asperis iuxta
ædificia areas & pagos.

Bursa pastoris maior.

Pastoria bursa *Dodon.*

Thlaspi fatuum, *Gesn.*

Sanguinaria, *Capella.*

Teschelkraut / *Sil.*
Dachsenkraut / *S.*
Bluttkraut.

Vbiuis obuiam & vulgo
nota herba. Locis incultis,
secus vias, sepes & in Oppi-
dorum arcis.

Aprili, Maio & Autumno
flore.

Inodora saporisq; expers,
præter leuem adstrictionem
& siccitatem. Refrigerat, ex-
iccat, adstringit, reprimat.

Aduersus Dysenteriã, cru-
entas excreationes, vrinam
sanguinolentam, Menstruo-
rum profluuiã, omnesq; in-
ternorum viscerum quasuis
erosiones ex vino rubro pota
seu admota efficacissima.

Trita & illita inflamma-
tionibus & ignibus sacris
prodest.

Succus vulnera glutinat
recentia & Auribus purulen-
tis infusus medetur.

Pessò hæmorrhagiam vte-
ri & Mensum abundantiam
sistit.

Pedibus nudis pressa au-
riginem tollit.

Bursa pastoris minor.

Bursa pastoris folio per-
foliato.

Thlaspi pumilum.

Klein

Klein Teschelfraut.
Montosis apricis & aridioribus agri Hirsbergenfis.

Bursa pastoris minima.

Paronychia vulgaris, *Dod.*
Paronychia Alsinifolia, *Lob.*
Pilofella filiquata minima, *Thal.*

Gensefraut.

Hungerblümlein / *Sil.*

Aprili floret in multam æstatem succrescente interim semine.

Arenosis agris & hortis plurima.

Vulgus credit eius vberem prouentum annonæ caritatem denotare.

Bursa pastoris Myagrisolia.

Pilofella filiquata maior, *Thal.*

Paronychia Myagrifolia, *Camer.*

Nagelfraut.

Agris prouenit aridiorib.

Calendula agrestis.

C Althula.

Acker Ringelblumen.

Ringelblumen.

In agris & ruderatis locis.

Flos ex vino potus cit Menfes, & secundas etiam e-

ducit, & arida suffitibus ad-mota.

Succus mira proprietate ad Carbones pestilentesque Bubones valet.

Caltha alpina.

Alisma alpinum, *Thal.*

Nardus Celtica 2. *Lob.*

Doronicum 4. *Clus.*

Solidago bupthalmica.

Geel S. Johannisblumen.

Schmerblumen.

Augenfraut.

Mutterwurz.

Marietranck.

Luxuriat passim in pratis humidioribus Montium. Circa solstitium floret.

Sapore Radix constat non nihil amaro, acri, penetrante, sed aromatico. Calefacit, ficit, urinam pellit, Menstrua ducit; decocta ex vino demorsis à Bufonibus potu prodest.

Ciet sternutamenta & pituitam è capite elicit.

Lixiuio flores vulgo incoquuntur aduersus Capitis dolorem, Capillosque fractos, quibus etiam flauum seu aureum conciliant colorem.

Caltha palustris.

Chamaeleuce, *Plinij.*

Populago, *Tabern.*

E 2

Amel-

* Amellus Virgilij putatus,
Thaly.

Schmirgeln / Kühschmir-
geln / Sil.

Schmalzblum.

Dotterblum.

Flos verno tempore vligi-
nosa prata riuulosque luteus
decorat, quibus nihil notius
aut frequentius.

Apum i&ui foliorum suc-
cus illitus succurrit. Infan-
tium torminibus decocta, in-
fessu, Muliercularum experi-
mento medetur.

Camelina I.

Μάργον Diosc. παρὰ τὸ μῦθον ἀ-
ρρεῖται, à Murium captura.

Cameline Myagrum, Lob.

Sesama, Trag.

PseudoMyagrum, Matt.

Cam.

Leindotter.

Dotterfraut.

Siackensamen.

In campis inter Linum &
frumenta nascitur.

Herba inflammationibus
& doloribus oculorum pro-
dest imposita.

Semen modicè calefacit
& humectat. Cibus auiculis
gratus.

Camelina II.

Myagrum Turcicum, Hor-
tulans.

PseudoMyagrum 2. Matt.

Camer.

Paronychia 2. Tabern.

Wild Dotter.

Knöpflein Dotter / Sil.

FingerNagelfraut.

Multa inter segetes are-
nosa Hirsbergensis agri.

Iunio & Iulio flosculi in
summo scintillant lutei, se-
men in capitulis rotundis,
Milij magnitudine relin-
quentes.

Campanula angustifolia
cærulea maior.

Φότρυα, Diosc. Mattiol.

Campanula. Perficifolia
nostras, Lob.

Waldglöcklein / Wald Cym-
beln.

Taube glocken.

Grosse Schellen.

In collibus apricis & fru-
tetis Iunio & Iulio floret.
Vfus neglecti.

Campanula minor angustifolia
flore albo.

Weisse Waldglöcklein.

Campanula minor ro-
tundifolia.

Campanula sylu. mini-
ma, Dod.

Campanula minor alpi-
na, Clus. P.

Rapun-

Rapunculus syl. minor 2.
Tabern.

Kleine Milchglöcklin.

Kleine wilde Rapunzeln.

In rupibus & præcipitijs.

Ad mœnia item vrbium, Iulio & Augusto flosculos exponit.

Tota lactescit.

Campanula minor rotundifolia nunc flore.

Kleine weiße Milchglöcklin.

Campanula minor pratensis.

Campanula minor 2. Cass.

Baub.

Wiesenglöcklin.

Schellen.

Hæc integra sæpe tegit prara.

Succus ex flore cœruleo expressus viridem efficit colorem.

Cannabis syl. spuria I.

Cannabis spuria facie Vrticæ, Lobel.

Cannabina alba, Tabern.

Wilder Hanff.

Weiß Hanff fraut.

Wilde Taubnessel.

Ackernessel.

Inter legetes enascitur.

Cannabis syl. spuria II.

Cannabis syluest. spuria 2.

Lobel.

Vrtica fatua syl. aculeata,

seu ἀκανθιστὸν δούλοσ, Thal.

Sideritis 2. Mattiol.

Stachelichte wilde Taubnesseln.

Stachelichte Ackernesseln.

Segetum pernicies.

Lamij vires imitatur.

Cannabis syl. spuria III.

Vrtica fatua syl. aculeata minor.

Kleine wilde Taubnesseln.

Cardiaca:

Sideritis 1. Dod.

Marrubium mas, Brunfels.

Palma Christi, Parisiens.

Melissæ species, Nonn.

Hertzgesperr.

Hertzgespan.

Wolffstope.

Prouenit passim prope vrbium mœnia iuxta sepes & veteres muros, in pagorum areis.

A Iunio in multum vsque Autumnum durat, floret ac semen perfert.

Amara est, Calidæ & siccæ naturæ. Vires Melissophyllo suppare.

Omnibus Cordis affectibus amica & familiaris, vt Palpitationi, Cardiaccæ, item

E 3

pecto-

pectoris, vt Asthmati, Tussi. Præstat ad conuulsos & resolutos.

Aqua destillata ægrè parturientibus opem fert, & Ictericam discutit.

Ad pecorum morbos vulgò adhibetur.

Carduus viarum vulgarior.

Carduus spinosissim⁹ vulgaris, Lob.

Onopordeum r. Tabern.

Distel/ Weddistel.

Secus itinera & in areis pagorum nihil vulgati⁹.

Semen potum Laterū doloribus remedio est. Cardueles eo delectantur.

Interdum etiam albo conspicitur flore.

Carduus palustris fruticans.

Carduus palustris procerus tricubitalis, Franci.

Grosse Wasserdistel.

Humectis montium locis, pratisque syluosis vdis. Iulio floret.

Carduus palustris minor.

Kleine Wasserdistel.

Flores in summo caulium ostentat purpurascens Au-

gusto & Septembri, humidis fecus fluenta locis.

Carduus leucanthemus.

Ακανθα λευκή, Dioscor.

Leucacantha.

Spina alba, Aduers.

Acanthium vulgare.

Weisse Distel.

Weisse Wegdistel.

In montibus & syluis Iunio & Iulio floret.

Radix desiccatur & modicè adstringit.

Stomachicis & cruēta expuentibus competit. Semen aduersatur venenis, maximè à serpente demorsis, conuulsisq; infantibus auxiliatur.

Carduus lanceolatus.

Spina lanceam referens.

Sperdistel.

Radix fibrosa, Caulis spinosus ramosus capitulis in summo rotundis aculeis paruis detortis; è quibus molles bombycini purpurantes flores cum semine paruo enascuntur. Folia lancem referunt. In montibus & rari⁹ quidem occurrit.

Carduus arvensis.

Carduus auenarius, Thal.

Carduus segetalis.

Aculeo-

Aculeosa Gazæ, *Aduers.*

Ackerdistel / Haberdistel.

Klein Margendistel.

In campestribus inter segetes, Auenam maximè. Æstate floret.

Carduus pratensis.

Ακάρδα ἀγρία, *Dioscor.*

Acanthus syluestris.

Carduus Acanthi facie, *Aduersaria.*

Carduus sylu. *Dioscor. Tabern.*

Geel Disteln / *sil.*

Wiesen fôl / Grasefôl.

Carduus omnium ferè tenerrimus.

In pratis montosis nonnihil humectis. Iulio & Augusto floret.

Folia tenerrima à Mulieribus in Cibis vt reliqua olea expetuntur.

Carduus fullonum.

Διψακός *Diesc.* ἀνὰ τὰς ἀγροὺς quasi fiticulosa.

Dipsacus syl. *Dod.*

Virga pastoris, *Offic.*

Lauacrum Veneris à concinnato foliorum ambitu, quæ anfractuosa ambage peluis seu labri figuram exprimit.

Bartendistel.

Weberdistel.

Weberfarten.

Tuchmacherfarten.

Nascitur humectis locis secus itinera & prope sepes in pagorum areis ac scrobium marginibus.

Iunio ac Iulio florent echinata capitula. Autumno leguntur.

Radix impensè amara est calida 2. recessu: siccatur, at tergit nonnihil. Viscera infarctui liberat. Tertianis nothis decocta medetur.

Folia capiti imposita Phrenesin mitigant.

Aqua foliorum concauis reperta, caliginosis & rubentibus oculis prodest. Eadem maculas faciei maximè oculorum emendat.

Echinorum vermiculi è collo contra Quartanas suspenduntur.

Carduus fullonum minor.

Virga pastoris minor.

Dipsacus minor, fatuus.

Wild fleine Weberfart.

Prouenit umbrosis & humidis ad sepes.

Carlina maior.

Χαμμήλας λευκός, *Diosc. Lob.*

Carlina Herbarior.

Cardopa-

Cardopatum *Officin.*

Chamæleon albus.

Eberwurtz.

Weisse Eberwurtz.

Asperis & incultis montosis, arido solo oritur ad vias & margines agrorum, florem promit Iulio & Augusto.

Excalefac. 2. ficc. 3. gradu, cum partium ac substantiæ tenuitate, sudores mouet, ventris lumbricos ac tineas pellit; venenis omnibus resistit, Pestis contagia arcet, Iecinoris ac Lienis obstructiones aperit, vrinas ciet, Menses prouocat. Datur & ex alto deuolutis lapsis ac cæsis. Dysenteria populari, torminibusq; Intestinorum vulgatum remedium.

Occidit Canes & Sues, Mures item necat subacta cum polenta.

Vulgo persuasum est, eam gestantibus vires augere, comitibus verò adimere.

Carlina minor.

Carlina syl. *Dod.*

Scolym⁹ syluestris, *Mattiol.*

Attractylis vulgaris minor, *Fuchf.*

Heracantha, *Tabern.*

Dreydistel.

Sewdistel.

Schönharle.

In asperis & aggeribus secus itinera montosis integra altate conspicua.

Capitula foeminae lixiuio indunt ad capillos ablucendos, qui inde flauescunt & pulciores efficiuntur, & a pediculis & lendibus immunes redduntur.

Carum.

Käps xyl. uägor.

Kägor, Aëtj.

Careum.

Carui, *Officin.*

Cuminum pratense.

Feldkümel.

Wiesenkümel.

Fischkümel.

Carui.

Integra prata camposque montium saepe conuestire solet. Iunio floribus & semine pragnans.

Optimum est Semen, non pauperum modò sed & diuitum, in cibis condimentum.

Semen modicè acre. Calefacit, exiccat 3. recessu. Aperit, incidit, digerit, concoquit, prouocat, flatu pellit, corroborat.

Stomacho & ori gratum accommodumq; concoctionem iuuat. Colicæ flatuosæ ventrisque torminibus imprimis vtile.

Lotium

Lotium euocat, & Renes ab arenulis liberat. Antidotis & oxyporis vtiliter miscetur.

Radix elixa Pastinacæ modo cibo vtilissima.

Caryophyllata vulgaris.

Caryophyllata, *Trag.*
Herba Benedicti, *Offic.*
Benedix.
Benedicten wurtz.
Neglinfraut.

Gaudet magis opacis ac vmbrosis, quam patentibus & apricis, iuxta vias in dumetis & syluulis nonnullis.

Floret Maio & Iunio.

Radix suauissimum Caryophylli spirat odoré, Cordi amicum & gratum.

In vino pota Cor exhilarat, Cerebrum roborat, spiritus cum animales tum vitales recreans. Hepatis obstructions aperit, Ventriculi, intestinorumq; dolores à flatibus subortos lenit, concoctionem prouocat, & contra omnia venena plurimum vtilis.

Puluis epotus prodest Cæliacis, Dysentericis, sanguinem expuentibus, ab alto deuolutis.

Tam intus sumta quam fo-

ris adhibita Enterocelis auxiliatur.

Caryophyllata alpina

lutea.

Caryophyllata alpina aureo flore, *Clus.*

Caryophyllata montana, *Dodon.*

Caryophyllata maior rotundifolia, *Leb.*

Grosse Benedicten wurtz.

Berg Neglinfraut.

Alp Benedix wurtz.

In summis duntaxat Suditorum iugis herbidis, sololato: veluti ad Gigantæum & alijs alpinis tractibus humidioribus. Iulio flos aureus erigitur, semen Augusto maturum.

Radix sæpe sesquicubitum longa, digitum crassa, odorata & adstringens.

Eiusdem cum vulgari naturæ & vsus.

Menstruorû profluvia immodica in puluere sumta cohibet.

Caryophyllata montana

purpureo flore.

Caryophyllata alpina nuntante flore, *Cl. P.*

Benedicta syluestris, *Trag.*

Berg Benedicten wurtz.

Wasser Benedictenwurtz.

F

Vdis

Vdis Montium recelsibus
Iulio floret.

Radix crassa longa ino-
dora, gustanti adstrictionem
imprimit.

Dysentericis opitulatur.

Caryophyllata alpina
minor.

Caryophyllata Veronen-
sium flore Saniculæ vrsinæ,
Aduers.

Sanicula alpina siue mon-
tana 2. Cl. P.

Sanicula alpina, *Tabern.*

Cortusa, *Mattiol.*

Campanula vulneraria.

Wundglöcklin.

Heilglöcklin.

Berg Sanickel.

Folia huic Maluæ pumilæ,
sed duriora ex atro virentia,
per extremum serrata, hirsu-
ta, gustu adstringentia. Pe-
diculi è medio foliorum pro-
deunt dodrantes, singula-
res, nudi vnicum florem su-
stinentes candidum ex sex,
septemue foliolis, luteis in-
tus instar Rosarum stamini-
bus, quibus capitula succre-
scunt trifida exiguum nigri-
cans semen claudentia. Ra-
diculæ tenues oblongæ per
terram sparsæ.

Humidis & vmbrosis Su-

detorum conuallibus.

Tota recēs gratissimo fra-
grat odore.

Radix gustu adstringit cū
partium tenuitate. Ad vul-
nera utilis.

Caryophyllus sylvestris I.

Garyophyllea sylu. *Thalij.*

Betonica altilis sylu. *Fuchf.*

Armerius flos 1. *Dodon.*

Feld Negelin.

Donner Negelin.

Wilde Negelin.

Vbiuis sponte prouenit in
petræis, montosis & syluosis
marginibus.

Satio calidior censetur.
Succus cum aq. Ononidis &
flor. Lilij Conuallij calculum
atterit & Comitialibus pro-
dest.

Caryophyllus sylu. II.

Caryophyll² *Poluxidis Gesn.*

Superba maior, *Lob.*

Feder Negelin.

Pflaum Neglin.

Mettwillen.

Böhmur.

Variat colore. Candido
aliquando, interdum purpu-
rascense reperitur.

In monte D. Georgij ad
Stregomium.

Caryophyllus syl. III.

Caryo-

Caryophyllus pratensis,
Tabern.

Armerius sylu. Dod.

Armeria pratensis syl. Lob.

Flos Cuculi, Cl. P.

Ἰβραμλον 2. Thal.

Pechblumen.

Pech Negelin.

Buckfuchblumen.

In pratis nihil vulgatus
Maio & Iunio. Venenis cō-
mendatur.

Caryophyllus syl. IV.

Caryophyllus viscosus.

Lychnis syl. purpurea, Ta-
bern.

Ἰβραμλον rubrum, Thal.

Kleber Negelin.

Pech Negelin.

Wilde Purpur roth/ Ma-
rienrößlin.

Apricis & aridis delecta-
tur collibus. Iunio floret.

Caryophyllus syl. V.

*Caryophyllus petraeus al-
bo flore.*

Lychnis syl. 1. Clus.

Cuculi flos 2. Trag.

Polemonium petraeum.

Weisse Stein Negelin.

Weisse Kleber Negelin.

Petrosis & asperis in Guß-
mansdorff nascitur. Iunio
flores vigent.

Caryophyllus syl. VI.

*Caryophyllus montanus
seu mediterraneus, Lob.*

Gramen marinum maius,
Tabern.

Gramen polyanthemom
maius, Dod.

Neglingras.

Neer Neglin.

Señatur campestris &
prata aridiora agri Ligni-
censis & Vratislauensis. Au-
gusto & Septembri floret.

Caryophyllus syl. VII.

*Caryophyllus marinus o-
mnium minimus, Lob.*

Gramen polyanthemom
minus, Dod.

Ἰβραμλον graminis spe-
cies, Eidem.

Klein Neglingras.

Klein Neergras.

In aggeribus secus itinera
frequens. Augusto cū flore.

Cassuta.

Cassuta Lupulorum.

Cuscuta, Officin.

Linodesmus, Gesner.

Podagra Lini.

Κασσιθα, Gracis.

Seide.

Glachs Seide.

Hopffen Seide.

Prope sepes, inter Lupulos
F 2 etiam

etiam & Linum luxuriat, id
strangulans & corrumpens.
Alba est & ruffa, mas & fœ-
mina. Iulio & Augusto
max. viget.

Eligitur quæ Lupulos &
Hyslopum apprehendit.

Amara est, viscera infar-
ctu liberat. Bilem deijcit,
sanguinem purgat & regium
morbum pellit.

Febribus auxiliatur, Ter-
tianiis impuris ac longiori-
bus, item Quartanis.

Ad quasvis Melancholi-
cas affectiones vtilissima.
Corrigitur Mace, Zingibere,
Aniso.

Catanance.

Κατανάχη I. Diosc.

Eruum syl. Herbarior. Ad-
uers.

Vnguimilua.

Amatoria.

Buler frant.

Bulen Gruen.

Circa Vratislauiam Æsta-
te flosculos edit.

Præstigiosis & fascinatricis
infantiæ amatorijs illecebris
commendatur quasi amoris
illicium necessarium, anili
superstitione.

Caucalis aruorum.

Δαῖνος ἀρου.

Caucalis albis floribus
vulg. Lob.

Lappa agrestis, Trag.

Daucus ἀναθουαππος seu ἰ-
χθυαππος, Thal.

Apium seu Petroselinum
aruense.

Äckerförfel.

Blettenförfel.

Inter segetes Iunio floret,
dein semen succedit.

Crudum & coctum editur.

Vrinas & Menses cit. Cal-
culos & Arenulas dissoluit.

Caucalis Dumetarum.

Daucoides minor, Cordi.

Caucalis semine aspero
flosculis subrubentibus, Cass.
Bauh.

Lappula Dumetarum.

Becken Blettenförfel.

Nascitur passim frutetosis
locis secus vias. Flosculi æ-
state ex albo rubent in par-
uis umbellis, semen succedit
Anisi minus asperum & Lap-
parū instar vestibus adhæret.

Centaurium minus.

Κενταύριον μικρόν, Diosc.

Λιβάδιον.

Centaurium paruum.

Panax leptophyllon Plin.
Dodon.

Febrifuga, Fel terræ.

Erdgalle/ Biberfrant/ sã.

Tauæ

Tausentgüldenfraut.

Zurenfraut.

Planta est maximè laudata veteribus, nulli non cognita, In pratis, pascuis, collibus & campestribus Iulio & Augusto cum flore oritur.

Amara est vehementer. Aluum purgat, Bilem crassam pituitamq; educit, sanguinem trahit. Iecinoris ac Lienis obstructions & durities tollit. Tertianas Ictericumq; sanat, putredini resistit, diuturnis ac prorogatis febribus auxiliatur.

Alui tineas pellit, & Menstrua mouet. Vulneraria est recens tusa. Vulnura glutinat, vetera vlcera purgat & cicatrice obducit.

Succus instillatur Auribus vermiculosis & illinitur contra papulas & manantia Capitis vlcera.

Clysteribus inditur in affectibus Neruorum, Apoplexia, Paralyfi, &c.

Centaurium minus album.

Fieberkraut mit weissen blumen.

Isdem locis, at rarius occurrat.

Cerasus syluestris.

Κεραυός.

Wilder Birschbaum.

Cerasa Actiana, Tragi.

Cerasa Cæciliana, Plin.

Cerasa Amaralia & Laureana.

Wilde Kirschen.

Vogelkirschen.

In proceris gignuntur Arboribus ad sepes hortorum, in montibus, syluis.

Rubra sunt & nigra, duriuscula, satius multò minor, nonnihil amaricantia, gustu non iniucunda.

Liquor stillaticius ex integris tuis nucleis Epilepticis summopere & Paralyticis commendatur. Loquelam deperditam restituit. Melancholicis etiam & calculosis salubris.

Cerasus montana racemosa.

Cerasus Anium racemosa, Lobel.

Padus, Theophr.

Pseudoligustrum, Dod.

Olantbaum.

Olirkirschen.

Oelbaum.

Sectatur ripas flumini in Sudetis. Arbor procera valde, etiam pueris nota, qui verno tempore ramos cum floribus decerpentes in clauia

clauia Odoris caussa transportant.

Fructus in racemis nigricans, cibus auiculis gratus, quo & pueri delectantur.

Dulces sunt bacculæ, sed ingrata & facile nauseam mouent. Vehementer adstringunt & aluum cohibent.

Cerinthe maior.

Acynogaphis.

Maru herba, *Dod.*

Cynoglossum montanum maius.

Telephium montosum.

fleckenkraut.

Geele Hundszunge.

Latis ac herbosis collibus, tum secus vias & agros. In vineis Boiemia.

Aestate floret.

Refrigerat & adstringit.

Cerinthe minor.

Maru minus.

Klein fleckenkraut.

Eadem amat loca.

Chamadrys vera.

Χαμαδρυς, Diosc. & Gal.

Chamadrys maior repens *Dodon.*

Chamadrys legitima maior, *Clus.*

Chamadrys vera mas, *Fuchs.*

Teucrium minus.

Braun Menderlin.

Klein Gamanderlin.

In Boiemia asperis collibus, in monticulis ad Poidebradum plurima.

Iulio & Augusto, cum floret, colligitur. Vincentem habet amaram qualitatem. Acris est quodammodo & tenuium partium. Incidit, aperit, abstergit, prouocat, Lienem colliquat, vrinam & Menses mouet. Humorum crassitiem incidit & viscerum obstructions expurgat. Aduersus venena efficax. Præstat ad omnes Capitis frigidus morbos.

Chamadrys vulgaris.

Teucrium pratense & spurium, *Lob.*

Chamadryoides.

Gamandrea.

Speckhilgen/ Sil.

Blaw Menderlin.

Schaffkraut.

Frequens in collibus, pratibus, scrobibus & secus frutera.

Triplex est. Maior, minor & latifolia.

Flos Iunio & Iulio conspicuus cœruleus, interdum candidus, nonnunquā obsoletus.

Amara est gustu, particeps & caliditatis & siccitatis. Aperien-

periendi & expurgandi vi integre non destituitur.

Miris & certissim. viribus pollet ad viscerum obstructions, Cacochymiam virginumq; foedos colores. Oculis etiam haud ingrata.

Chamamelum vulgatius odoratum.

Χαμαίμυλον, quoniam flores
πῶλος odorem habent.

"Ανθῆμις, Diosc.

Anthemis vulgatiore, *Aduers.*
Leucanthemis.

Bermelin / 2 sil.

Römerey / 5

Bermüntzel.

Camillen.

Huius maximus in segetibus prouentus. Iunio & Iulio colligitur ad Balneorum usum.

Calefacit & ficit cū partium tenuitate. Digerit, laxat, emollit, lenit, rarefacit, discit, anodynum est, ad lassitudinem confert.

Pota Anthemis fecinoris & Lienis obstructions ex vino soluit, bilem suffusam expurgat. Menstrua pellit, partus, vrinam, calculosq;. Aduersus inflationes Coli & Ilei tormina bibitur. Matricis internos dolores mulcet, Late-

rumq; dolores lenit. Eodem modo phthificos sanat, suspiriosis prodest, Lienteriam cohibet & Stomachum frigidum excalefacit.

Extrinsecus in fotu, infusu aut sacculis adhibiti quous dolores sedant Chamamelis flores. Renum, Vteri, Iliorum, Vesicae, Aegilopis illitu medentur. Duros tumores emolliunt, & crudos discutunt humores.

Lixiuo induntur ad Capitis & Cerebri corroboracionem.

Chamamelum fatuum.

Χαμαίμυλον ἄγρον.

Chamamelum 4. Trag.

Chamamelum leucanthemum agreste.

Anethum vaccinum.

Wilder Bermel.

Rühdille / sil.

Totos agros interdū cooperit, tam cultos, quā quiescentes. Aestate floret.

Odorem spirat grauiorē, minus gratum vulgari.

Additur Infusibus ad Renum, Intestinorum, Vteri & Vesicae affectus.

Vulneraria est.

Chamamelum caninum fatidum.

Παθῆ-

Παρθέριον, Diosc. Aduers.
Chamamelum album seu
foetidum, Thal.

Parthenium vel Virginea,
Aduers.

Amaracus foetida.

Anethum caninum.

Cotula foetida, Officin.

Hundesille.

Hillige dille.

Stinckende Camillen.

Sectatur oppida & pagos.
In areis pagorum & nobili-
um frequens.

Iulio & Augusto floret.

Odore graui, foetido, sub-
uiroso vulgo notum, gustu a-
marum.

Bilem atram & pituitam
haud secus atq; Epithymum
per inferna ducit.

Asthmaticis, Melancholi-
cis, Vertiginosis atq; Calcu-
losis prodest.

Vino decoctum bibitur
aduersus Hydropem Cache-
xiam & vteri strangulatio-
nem vulgi experimento. Ex
Cereuisia Icterus curat. Ea-
dem præstant Succus & Aqua
stillaticia.

Lotio Pedum ex florū de-
coct. Capiti confert, Melan-
cholicis & Vertiginosis fe-
minis quæ vteri suffocatio-
nem patiuntur, competit.

*Chamamelum caninum
inodorum.*

Βέφαλμος, quod flores bou
Oculis similes.

Bupthalmum 2. folio &
facie Cotulæ foetidæ, Aduers.

Cotula, Tabern.

Cotula alba non foetida,
Dodon.

Kindes Auge.

Wilde Hundesille.

In agris incultis & secus
itinera, nec non hortis ole-
raceis, Iulio & Augusto flo-
ret, Ad vulnera cōmendatur.

Chamamelum rubrum.

Ἐγέρθεμος, Diosc. Nonn.

an φλωξ Theoph?

Chamomilla rubra, Gesn.

Anemone agrestis, Trag.

Adonis flos.

Rote Camillen / rote feld-
röslin.

Marienröslin / Margen-
blümlin / Sil.

Maio & Iunio passim in-
ter segetes viget. Subamarum
est, & herbaceum quid redo-
let. Sudores in balneis mi-
rificè prolicit. Semen Cal-
culum frangit efficacissimè.

Chamapitys.

Χαμαπίτυς mas, Diosc. Lob.

Χαμαπτέκη.

Iua

Iua moschata Arthetica,
Officin.

Pinus pumila.

Aiuga, Abiga.

Erdfyser / Erdweyrauch.

Schlagfrentlin.

Aridis arenosis & incultis.

Gustu amarus sapor acri
validior, Pinum redolet.

Magna in Nerviū affe-
ctib. commendationis. Con-
fert Apoplecticis, Epilepti-
cis, Vertiginosis, Arthetis,
Paralyticis & alijs capitis fri-
gidioribus affectibus.

Ex aqua Scabiosæ puru-
lenta excreantibus & Phthi-
siccis alijsq; vitijs Pulmonum
salutaris.

Viridis rec. vulnera ma-
gna glutinat, putrescentia
sanat, Mammarum durities
discutit, & Articulorum vi-
tia adiuvat.

Aconiti antidotum.

Chelidonium maius.

Χελιδόνιον μέγα, Dioscor.

Chelidonia, Officin.

Hirundinaria maior.

Schwalbenwurtz.

Schölkraut / 2 Sil.

Blutkraut / 5

In parietinis muris & ve-
tustis ædificijs inter cætera
herbarum vitia luxuriat. To-
to viret anno. A Maio in

multam Aestatem floret, fi-
liqua interea perficiuntur.

Succo prægnat sanguineo.

Feruidiore acrimonia est,
& fœtidiore minimè gustu
aut odore gratum.

Excalesc. sicc. 3. recessu.

Extergit, mundat, soluit, a-
perit, digerit validè.

Rarius intrò sumitur, com-
modius foris ad Impetigi-
nes & pforas adhibetur.

Radix cum Aniso ex vino
pota Hepatis obstructos
meatus adaperit, & Regio
morbo medetur, yrinas mo-
uet, Hydropicos sanat. Ace-
to decocta aduersus Pestem
bibitur. Mansa dentium do-
loribus confert. Herba re-
cens tusa Nuchæ & pedibus
imis cum sale alligatur in Pa-
raphrenitide & febribus ar-
dentibus.

Succus ineunte æstate ex-
trahitur & Sole siccatur ad
Oculorum vitia.

Chelidonium minus.

Χελιδόνιον μικρόν, Diosc.

Malococistis minor, Fuchs.

Scrofularia minor, Officin.

Hirundinaria minor.

Amellus Virgilij, Nonn.

Klein Schwalbenkraut,

Feigwarzkräut.

Frühe Schmirgeln / Sil.

G

Gigni-

Cignitur ubiq; viginosis tractibus, in pratis, hortis & limitibus humidis. Circa Martij Calendas oritur; paulò post floret; Aprili deficere incipit; Maio integrè perit.

Acrimonia omni prorsus caret, contrà quàm veteres scripserunt.

Recentiores radiculis in extendis Ficubus, Mariscis, Strumis singulari experimēto, naturæ ductu vtuntur.

Cherifolium sylvestre.

Cerifolium asininum.

Onoselinum.

Wilder Körffel.

Eselskörffel.

Sponte in hortis graminosis ac pomiferis.

Chondrilla viminea.

Xor Spindel.

Geeler Sonnenwirbel.

Acker Chondrilla.

Geel Feldwegwart.

Ad margines agrorum, Iunio & Iulio floret.

Parem cum Cichorio vim obtinet.

Chondrilla minor.

Chondrilla species 3. Dod.

Chondrilla Coronopi aut

Cyani tenuifolia lutea vinearum, *Aduers.*

Sesamoides paruum Matt.

Cam.

Kleine geele Chondrilla.

In aggeribus secus vias.

Semen amarum est, multum excalefacit, rumpit, extergit.

Cicercula.

Vide Ernum.

Cichorium sylvestre.

Σίσις, αἰθῆρ, Galen. & Diosc.

Κίχουρον ἀγρῶν, παρὰ τὸ κίχουρον

διὰ χίχουρον, ab errando.

Intubum sylvestre.

Intubus erratica.

Sponsa Solis, Pet. *Crescent.*

Cicorea, *Officin.*

Solisequium cœruleum.

Wegleuchte.

Hindlenuffre.

Feld Wegwart.

Blau Sonnenwirbel.

Nusquam non obuium, secus itinera & margines agrorum. Aestate in Autumnum vsque floret.

Gustu amara Radix. Refrigerat, siccatur, cum moderata adstrictione, ita tamen vt non ventriculum lædat.

Hepar roborat & venarum oscula extergit, obstructionsq; aperit.

Eius vsus in febribus ardentibus, & omnibus alijs inter-

internis calidis affectib. Hepatis, Renum, Lienis: præcipuè in Ictero, Alui fluxionibus, dolore Renū, in Menstruorum retentione, malignis febrilib. & Lue Venerea.

Radix & herba comesta opitulatur à rabioso cane demorsis.

Succus recens linteo duplicato impositus mirum in modum Hepar inflammatum temperat.

Radices tenellæ, antequā caulis exeat, & flores saccharo condiuntur ad eodē vsus.

*Cichorium sylvestre
albo flore.*

Cichorium album.

Weisse Hindleuffe.

Wegwart mit weissen blumen.

Iisdem natalibus, sed rarè.

Radix, si certo tempore effodiatur, ab Obstetricibus peritis creditur partum accelerare substrata parturientibus.

Cichorium luteum.

Cichorium luteum pratense. syl. luteum, Dod.

Cicorea lutea, Trag.

Geel Wegwart.

In pratis montanis.

Sapore amaricat, Cichorij instar.

Cicuta.

Κάδυστος, Diosc.

Cicuta.

Schirling / BluttSchirling.

Wütterich.

Luxuriat vberimo prouentu locis incultis, vmbrosis, sordidis prope vrbium & oppidorum mœnia.

Ingratum grauē fœdumque tota spirat odorem; facultatis extremè refrigerantis & lethale venenum.

Lac extinguit Mammis imposita vulgato vsu. Mammillas virginibus cohibet & incrementum non patitur.

Sanguinem reprimat.

Oleum auribus instillatum Otalgiam vehementissimam mulcet, quasi incantamento, multorum experimento. Cautè agendum tamen, cum frigidum sit Cerebro & Neruis inimicum.

Cicuta fatua.

Cicuta fatua minus fœtida, Aduers.

Cicutaria.

Wilder Schirling.

Minus fœtet.

Cicutaria palustris.

G 2

Phel-

Phellandrium Plin. Dod. &
Lugdunensib.

Cicutaria Anglica minor.
Sion.

Frosch Peterlin.

Froschkraut.

Wasser Schirling.

Non nisi palustribus & stagnantibus aquis nascitur. Caulis aliquando brachium crassitudine æquat, ramulis multis brachiatus.

Odorata est, calida & sicca. Urinam & Menfes prouocat. Ad Vesicæ frigidos affectus utile, & calculum quemuis comminuere potest.

Cicutaria Montana.

Cicutaria maxima Brancionis Lob.

Berg Schirling.

In montibus, humidis locis.

Circaea domestica.

Circaea Lutetiana Lob.

Herba D. Stephani Taber.

Ocymastrum verrucarium an *Κικαία* Diosc.?

S. Stephans Kraut.

Humidis & vmbrosis ad oppida nonnulla locis.

Circaea syluatica.

Helxine syluestris siue flumiatilis, Tab.

Wald tag und Nacht.

In syluis opacis & humidis montium ad Quissum fluium.

Minor est tota, & flosculi tantillum rubent. Solani naturam æmulatur.

Cirsium montanum I.

Κίρσιον Diosc. *Ἰνὸ τῶν κρύπτων* à varicibus quibus medetur.

Schardistel / Scharteindistel. Sil.

Weicher zarter Bergdistel.

Passim altis Suditorum pratis floret Iunio.

Cirsium montanum II.

Cirsium 2. siue Britannicum Clus. P.

Cirsium 3. siue maius Lob.

Cirsium maius singularibus capitulis Lugd.

Breitbletterne Schardistel.

Weiche Bergdistel mit breiten blettern.

Ad ripam Iseræ fluu. & alijs montosis & humidis locis.

Pabulum dum tenellum & recens, Pecori gratum.

Cistus humilis germanicus I.

Cistus parvus Clus.

Hysopus campestris Trag.
Flos

Flos Solis Dod.

Panax Chironium *Mattiol.*

Sophia aurea *Paracels.* Con-
solida aurea.

Elisabethblümlein *Vratif.*

Sonnenblümlein.

Sonnengunzel.

Amat campestris & apri-
cos colles. In monte D. Ge-
orgij ad Stregomium floret
Iunio & Iulio.

Omni prorsus odore desti-
tuitur, adstringendi vi pol-
lens, minimè acris.

Vulnera glutinat ac san-
guinis fluxus cohibet. Men-
sum redundantiam in se su si-
stet.

Datur cruenta expuenti-
bus & Dysentericis.

Cistus humilis II.

*Ηλιαίθεμος λεπιδυλλος.

Panax Chironium minus.

Flos Solis minor.

Blein Steingunzel.

Locis incultis apricis.

Clinopodium maius.

Origanum minus *Trag.*

Origanum verticillatum
Thal.

Acinos *Aduers.*

Beuphtosten *Sil.*

Wirbeldost.

Wilddost.

Montosis passim, in dume-
tis & frutetosis.

Florem habet album &
purpurascentem.

Odoratum est nonnihil
gustanti siccius tantillo calo-
ris subadstring. vt Betoni-
ca.

Calefacit, siccit, digeren-
do modicè repellit.

Caput, viscera roborat.

Additur Infensibus. Men-
ses sistit & partes imbecilles
confortat.

Clinopodium minus.

Κλινοπόδιον, ἔπε ποδῶν τῶν κλί-
νων, quòd multos habeat cir-
ca caulem verticillos rotun-
dos lectorum pedibus simi-
les.

Clinopodium vulgare *Lob.*

Pulegium petræum *Gesn.*

Lectipes *Aduers.*

Polium montanum *Offic.*
Nonnullis.

Bleine Bergmunzel.

Wild Birch 3sop.

Steinpooley.

Gaudet incultis & apricis
petrosis in alto sitis.

Gustu acrimoniam quan-
dam præ se fert permixtam
leui amaritudine. Odorem
spirat suauem Serpylli qua-
dantenus.

G 3

Cale-

Calefacit, siccatur 3. recessu. Aperit, prouocat, discutit, venenis resistit, roborat. Tenuium est partium. Menfes & partus pellit. Ex vino potum Melancholicos restituit.

Colchicum.

Κολχικόν καὶ ἐφύμερον Diosc.

Strangulatorium Lob.

Hermodactylus Off. Fuchs.

Crocum pratense syluestre.

Wilder Safran.

Spinnblumen.

Nichelsblumen.

Nichelswurcz.

In pratis solo pingui Autumno floret, circa solstitium semen maturat.

Radix sapore dulcis, simulq; amara tenuis, saluam prouocans & nonnihil nauseam. Odor totius herbae grauis & nauseabundus.

Calefacit & siccatur 2. recessu: facultatis deleteria. In cibo acceptus strangulando enecat. Pediculos abigit.

Consolida regia aruensis.

Flos regius syluestris Dod.

Consolida regia segetum strigosior Lob.

Wild Rittersporn.

Acker Rittersporn.

Iunio & Iulio inter segetes, flore cæruleo incarnato & albo quandoq; conspicitur.

Siccatur & mediocriter calefacit, simulque refrigerat cum leui quadam adstrictione.

Auxiliatur ardoribus, tussi, inflammationibus, venenis, vomitionibus, biliosis affectibus. Vulnera sanat.

Conuolulus maior.

Σείδιον καὶ κεία Diosc.

Volubilis maior læuis Dod.

Smilax læuis Martiol.

Funis Arborum.

Weisse Winde Sil.

Grosse Winde

Saunglocken.

Prouenit iuxta sepes & arbores. Aestate floret. Linguam amaritudine vellicat, calidæ naturæ & digerentis.

Melancholiam purgat cum Helleboro & Epithymo; Pectus cum Helenio & Capill. Veneris.

Semen è vino Stranguriæ medetur.

Conuolulus niger.

Μαλονβίατος Democriti.

Helxine Cissampelos 2.

Atriplicis effigie Aduers.

Orobanche vera Gesn.

Volu-

Volubilis media seu nigra
Thal.

Conuoluulium nigrum.

Schwartz Winde Sil.

Buchwinde. Grosse Winde.

Olerum pestis & vitium,
quæ circumuolutione sua e-
necat & strangulat.

Gustu est glutinoso suba-
cido.

Alum, velut Atriplex, lu-
bricare creditur.

Vulgus eius decocto con-
tra tormina ventris vitur.

Aqua Infantibus ad eos-
dem vsus propinatur.

Conuoluulus minor.

Ελεῖν κίον ἀπὸ τοῦ περιελθόντος Diosc. περι-
ελθόντος ἀπὸ τοῦ περιελθόντος.

θεοφ. Nonnull.

Conuoluulus aruensis ro-
seo flore *Tabern.*

Smilax lauis minor *Dod.*

Helxine Cissampelos *Fuch.*

Volubilis minor *Trag.*

Born Winde / Sil.

Kleine Winde / Sil.

Acker Winde / Erd Winde.

Kleine Glocken.

Alumn^o est satorum, quas-
cunq; plâtas arripit, strangu-
lat & in terram deprimat, ne-
glectus & inuisus Agricolis.

Flores ostendit Aestate al-
bos leui purpura perfusus
calathi figura, è quibus se-
men nigrum.

Succus foliorum potus al-
uum subducit.

Cum sale & aceto illitus,
cutis sorditates, & scabiem
delet.

Folia miscentur Infessibus
ad calculum & stranguriam.

Conyza maior.

Κόνυζα Diosc. *Mattiol.*

Πάνυξ αὐτὸς πάνυξ αὐτὸς Ad-
uersar.

Conyza Helenitis *Cordi.*

Baccharis Monspeliensi-
um *Lobel.*

Grosse Dürwurtz.

Gros Flöhkraut.

Geele Mûnke. Sil.

Locis apricis aridis rude-
ratis, in Talckenstein am
Lehnberge, auffm Spitz-
berge.

Graui odore non admo-
dum ingrato prædita, sed
hâudquaquam glutinosa,
gustu amara & acris.

Decocta Menses suppres-
sos & Secundas potenter tra-
hit.

Suffitu Serpentes fugat,
Culices abigit & necat.

Conyza media.

Conyza 3. *Mattiol.*

Calaminthe 3. genus *Fuch.*

Aster Atticus luteus *Alijs.*

Sonnenwurtz.

G 4.

Gees

Gele Mütze.

Dürwurz.

Aestate floret, humidis
ac riguis pagorum areis.

Halitum virosum & quid-
dam Cimicum aut Cotulae
foetidae spirat.

Ex vino rubro Dysenteri-
cis auxiliatur.

Ictericos juvat cum radi-
cibus Cichorii, Menfes trahit;
Stranguriam cum Aniso sol-
uit.

Conyza minor.

Κόνυζα μικρά.

Cunilago Plin.

Pulicaria seu Pysyllū Cord.

Conyza minima Aduers.

Ad loca irrigua circa prae-
dia & pagos.

Augusto & Septembri flo-
res extrudit.

Amara est & acris. Odo-
rem exhalat grauem suba-
crem: praesertim flores.

Calefacit & siccatur, tenuis
essentiae.

Aperit, penetrat, extergit.
Cerebrum purgat & pitui-
tam e capite elicit: sternuta-
menta mouet. Pulices ne-
cat.

Coriandrum.

Κόριον ἢ κορίαννον Dios. καὶ τὸ κό-
ριον, à foedo, quo Cimices re-
fert, odore.

Coriandrum Off.

Anethum cimicarium.

Wanzendille.

Coriander / Coliander.

Extra oppida circa fime-
ta. Seritur etiam in hortis.
Floret sub Canis exortum.
Autumno semen maturescit.

Planta virescens grauem
emittit Cimicum putorem.

Semen siccum exuta gra-
ueolentia odoratum euadit,
& ad multa utile.

Calefac. 1. & sicc. 2. re-
cessu, cum leni quadam ad-
strictione.

Corrigitur maceratum
per noctem in aceto, & rur-
sus siccatum. Stomacho salu-
bre. Ructus acidus emendat,
saluationem prohibet, vapo-
rum sursum eruptionem fla-
tumq; impetum sistit. Ce-
rebrum roborat. Largius ta-
men sumtum Mentem mo-
uet.

Corniolus.

Κορνιόλια Theoph.

Cornus femina. Aduers.

Cornus sylvestris Dod.

Virga sanguinea Mattioli.

Pseudocrania Cord.

Sanguis Pet. Cresc.

Schiesbeeren. Sil.

Faulbaum

Bartriegel Sil.

Spina

Spindelholz.

In frutētis, sepibus saxosis-
que collibus floret Iulio ini-
tū.

Gustus baccarum acerbis
amarus adstringensque, nul-
lius, quod sciam, vsus.

Corylus sylvestris.

Corylus.

Καρύδα, καρύδα ποικίλη.

Haselstrauch / Haselstaub.
Haselbaum.

Arbuscula notissima, in
montibus, collibus, syluis fre-
quens.

Flosculi rubri staminibus
Crocī perbreuibis similes,
& Iulii Februario, Martio &
& Aprili erumpunt & pro-
pendent, Augusto nuces ma-
turæ.

Iuli refrigerant & siccant
cum adstrictione, Ventris
fluxiones sistunt.

Simplex obseruauit Rusti-
citas, Serpentes & viperas
obtorpescere, si Coryli cau-
dice vel furculo icti aut per-
cussi fuerint, & tandem emo-
ri.

Vulgus Metallicorum ad
virgulam diuinam, ut vo-
cant, qua venas Metallorum
inquirat, præ cæteris furcam
eligit columnam: Verum cum
ex impuris fontibus Incanta-

torum primò in Metalla de-
fluxerit, Metallicus utpote
vir bonus & grauis ac Natu-
ræ peritus, eam non utitur, sed
alia naturalia signa venarum
obseruat.

Nux auellana candida.

Λιπτακέρυον.

Nux prænestina.

Abellina nux. Inde forsan
germanicum paucis mutatis
literis:

Haselnuß.

Weisse wilde Haselnuß.

Auellanæ plus habent ter-
ræ & frigida substantiæ
quàm Iuglandes.

Cibis in Ventriculo super-
natant, & largiùs esitata ca-
pitis dolorem creant.

Immaturæ comestæ faciliè
dysenteriam gignunt.

Cyanus vulgaris.

Κύανος.

Cyanus minor Mattiol.

Flos Frumentorum Dod.

Flos Siliginis.

Blaptifecula, Baptifecula.

Blaue Kornblumen.

Rockenblum / Zacharias-
blum.

Ziegenböcke Agricola.

Importuno sæpe luxu se-
getes, Secales maximè, in
montanis propemodum e-
necat.

H

Variat flore, qui aliquando ruber, cœruleus ut plurimum, purpureus nonnunquam, interdum candidus observatur.

Refrigerat, repellit, siccat, glutinat. Venenis resistit. Præstat ad pestilenciales & perniciales febres.

Aqua in Oculorum inflammationibus magnæ commendationis.

Cynoglossum maius.

Κυνόγλωσσον.

Cynoglossum vulgare.

Lycopsis Lacunæ Ruell.

Cynoglossa maior.

Hundezunge / Liebeuglin
Non.

Nascitur in arcis prope sepes & muros in pagis passim, locis nonnihil humentibus.

Iunio & Iulio floret lappis subinde succedentibus.

Manifestè refrigerat & siccat. Emollit, incrassat, dolorem lenit & maiorem affluxum prohibet.

Radix sanguinem excrementibus ex aqua Plantaginis aut Prunellæ cocta exhibetur.

Fotu dolorem Hamorroidum demulcet egregiè.

Folia igni sacro meden-

tur, ad canis rabidi morsum valent.

Flores saccharo conservantur aduersus Pleuresin & Hæmoptoisin.

Cynoglossum pumilum.

Cynoglossum pusillum
Narbonense Lob.

Cynoglossa minor.

Ackerfletten.

Kleine Hundezunge.

Inter segetes.

Cynosorchis maior.

Cynosorchis prior. Dod.

Cynosorchis nostra maior
Lob.

Orchismas latifolia Fuchf.

Testiculus canis maior.

Gros Knabenkraut.

Gauchblume.

In pratis humidioribus montosis Maio exoritur.

Cynosorchis morio.

Orchismas angustifolia
Fuchf.

Testiculus morionis mas
Doden.

Gesprenget Knabenkraut.

Sprenglichter Buckst.
Sil.

Locis iisdem. Vires eadem cum Orchide.

Cyperus gramineus L.

Cype-

Cyperus longus inodorus
fyl. Lob.

Cypergras.
In pratis vdis.

Cyperus gramineus I I.

Pseudo *Cyperus* Lob.
Falsch Cyperwurtz oder
Wildergalgen.
Humida sectatur loca.

Cyperus gramineus I I I.

Cyperus aquaticus Sep-
tentrionalium Lobel.

Wild Galgengras.
In piscinis & alijs palu-
stribus.

Damasonium latifolium I.

Επιρανθης Diosc.

Αλισμα βολενωδης seu race-
mosum Thal.

Helleborine Dod.

Epipactis Recentior.

Damasonium montanum
flore atrorubente.

Wild Nisewurtz.

Nemorosis ymbrosis fa-
miliaris. Iunio & Iulio flo-
ret.

Gustu amaricat. Iecinoris
vitijs vtile, & contra venena
pollet.

*Damasonium latifoli-
um* I I.

Damasonium montanum

minus flore purpurascente.

Wild Knabenkraut.

Folia ei subrotunda, flo-
res purpurei.

In pratis irriguis monto-
sis.

Vulnera glutinat.

*Damasonium angustifoli-
um purpureo flore.*

*Damasonium angustifo-
lium montanum purpuras-
cente spica* Cass. Bauh.

Helleborine angustifolia
flore carneo,

Αλισμα κυμβαλιαειδης ruben-
ti flore Thalij.

Leibfarben Cimbblümlin.

In syluis montosis & pra-
tis nemorosis.

Iunio floret.

*Damasonium angustifoli-
um candidum.*

Αλισμα κυμβαλιαειδης al-
bum Thal.

Helleborine flore albo
Tabern.

Elleborine i. Clus. P.

Schneeweis Cimbblüm-
lin.

Maio & Iunio in monti-
bus iuxta castrum. Kynast
floret.

Radix profundè in terra
delitescit.

H 2

Daucus

Daucus Sefeli pratensis facie.

Saxifraga Anglicana facie
Sefeli pratensis Monspeliensis Lob.

Wild BergMörn.

In pratis nonnullis montosis.

Daucus montanus Boemicus.

An Daucus 3. Diosc?

Böhmischer Daucus.

Ad Poidebradum in monticulo amœnissimo Iulio floret.

Radix candida in fibras crassiusculas diuaticata. Folia Saxifragæ Anglicanæ latiora humi accumbentia: semen Septembri in umbella Dauci Cretensis oblongum candicans, odoratum, aromatici saporis.

Dens Leonis.

A'φάκκ Theoph. Matt.

Hieracium maius Tragi.

Hedypnois Fuchs.

Dens Leonis vel Caput Monachi Mattioli.

Taraxacon Offic.

Vrinaria.

Börlinfrant / Wegelattich.

Wild Gensedistel.

Geel Sonnenwirbel.

Geel Meyenblume.

Pappenblum / Poppenblum.

Pompeblumen sil.

Vbius in campis, pratis, hortis, agrorum marginibus oritur. Flores Maio lucent, paulò post vnà cum semine in pappum fatiscentes. Radix oblonga digitum crassa lacteo turgēt succo.

Adstringit, roborat, amaricat, abstergit.

Hepatis & primarum venarum obstructions reserat. Vrinās ciet, & somnum conciliat in acetarijs deuorata radix.

Cocta Stomachum dissolutum adstringit.

Corrigit Iecinoris intemperiem. Ictericis, febricitantibus decoctum auxiliatur.

Herba contrita & imposita omnem inflammationem nigricantium & adurentium pustularum compescit.

Liquor stillaticus cum succo Violarum à fœminis Vratislauiensibus Epilepticis infantibus instillatur. Medetur Pleuriticis & tussientibus, ac somnum conciliat.

Dentaria à Poda.

Dentaria maior Matt.

Anbla-

Anblatum *Corda*.
 Squamaria radix.
 Schupenwurtz *Sil*.
 Blumenfraut.
 Freisam fraut.

Aprili & Maij initio floret
 sine folijs, dein arefcit, in syl-
 uis montium opacis.

Resiccans est radix gustu
 acerba.

Aqua ex tota herba cum
 radicibus destillatur, ad flu-
 xus & puerorum Convulsio-
 nes magnæ commendatio-
 nis.

Dentaria *weylá* *Phyll.*

Viola *Dentaria* 1. *Dodon*.
 Nemoralis alpina Herba-
 rior. *Alabastrites Aduers*.
 Sanicula *Dentaria*.
 Symphytum *dentarium*.
 Weisse *Baselwurtz Sil*.
 Grimwurtz / *Zahnfraut*.
 Weisser *Sanickel*.
 Saltubus vmbrosis Sudi-
 torum frequens.

Aprili flores promit. Ma-
 io semen in filiquis succres-
 cit, Iulio, Augusto emori-
 tur.

Gustu tota amaricat & ca-
 lefacit, non vacans acrimo-
 nia.

Radix abstergit, glutinat,
 cohibet, roborat.

Datur ruptis & ad interna
 vulnera cum Thoracis tum
 Intestinorum. Pulvis Herni-
 osis salubris. Ouibus datur
 à Pastoribus.

Dentaria *enlá* *Phyll.*

Coralloides *Cordi*.

Dentaria septifolia.

Zahnwurtz mit sieben blets-
 tern.

Dentaria *enneá* *Phyll.*

Eine ander art der *Zahn-*
wurtz mit neun blettern.

Foliorum numero à prio-
 ri solummodo differunt. Iis-
 dem fruuntur natalibus.

Dentaria baccifera.

Rhizo *Corallum Thal*.

Symphytum *Coralloides*

Sanicula *corallina*.

Corallen wurtz.

Oreyoeker wurtz.

Señatur opacos altissi-
 morum montium saltus.

Maio ostendit flores, qui
 odorati ex candido purpu-
 rascunt: semen in filiquis.
 Radix serpit dentata candi-
 da, velut *Corallum album*
 splendens.

Ad exortum foliorum,
 quæ colicolum ambiunt, nas-
 cuntur bulbuli *Lilij rubri*
 bulbi-

feri, veluti ex squamis compacti, initio virides, dein nigri aut pulli, ingrati admodum saporis.

Radix Maio eruitur. Contra venena & ventris tormina vulgi medela.

Digitalis Lutea.

Digilatis flore albo.

Campanula lutea.

Geele Fingerhütlin.

Geele Glöcklin.

Præruptis & asperis Montium saltibus.

Aestate floret. Vfus incognitus.

Draco sylvestris.

Ptarmica Mattioli.

Ptarmica syl. Germanorum Thal.

Tarchon aquaticum Gesn.

Tanacetum album Trag.

Pyrethrum Brunfels.

μαρμυρις Diosc. à *μαρμυρις* id est sternutamentum prorito.

Ad fruteta & margines pratorum. Radix longius vagatur per summum cespitem exigua.

Iunio, Iulio flores ostendit.

Sapore nonnihil amari-
cat. Folia recentia tenera Lactucis alijsque acetarijs adduntur; quarum frigidita-

tem corrigunt ac temperant: ob id in hortos recipitur.

Radix restibilis longè lateq; serpendo se propagat.

Flores sternutamenta efficacissimè mouent.

Dracunculus minor.

Aron Trag.

Serpentaria minor Officin.

Luph planum seu minus.

A^reg^o Diosc.

Sparganium purg.

Veronicken wurtz. Sil.

Wilder Ingwer.

Deutscher Ingwer.

Klein Schlangentraut.

Nascitur opacis syluis. E-rumpunt folia mox post hyemem: Pistillus & vaginula Iunio exit folijs marcescentibus. Vua Iulio & Augusto maturefcit.

Radix acris, tenuis essentia: Incidit, attenuat lentos & crassos humores. Pectus expurgat. Asthmaticis utilis. Stomachum Phlegmate & atra bile infestum maximopere iuuat. Venenis resistit & Pesti medetur.

Farina faciem abstergit & claram reddit.

Dracunculus palustris.

Aron palustre Gesn.

Hydro-

Hydropiper rubeum *Fuchf.*
Anguina aquatica seu Dra-
cunculus *Aduersf.*

Dracontium palustre.

Groschlöffel *Sil.*

Groschfraut.

Löffelkraut.

Wasser Alron.

Wasser Schlangenkraut.

In vliginosis & palustri-
bus territorij Hirsbergensis
frequens.

Augusto baccæ rubent.

Fructus ex vino contra
Viperarum ictus bibitur.

Ebulus.

X *Amor. d. n. Diof.*

A. n. d. g. e. a.

Sambucus humilis.

Sambucus humilis seu pu-
mila herbacea.

Seldholder / Ackerholder.

Altich / Ottich *Sil.*

Campestris sectatur. In a-
gris circa Kaufungam pluri-
ma. Floret Iunio & Augusto.

Grauis est & terri odoris.

Radici purgandi vis ve-
getatiua. Mirificè enim pitu-
itam & aquas ducit: vnde
singulari experimento Hy-
dropicis propinatur.

Vterum emollit & affe-
ctus circa vesicam corrigit ad
infeßum decocta.

Rusticæ feminæ herbam
seu folia porcis aduersus
scrofulas & grandinem sub-
sternunt.

Echium caeruleum.

*E'χιον Diof. παρὰ τὸ ὁμοῦν
σπέρμα κεφαλῆς ἐχίων; vel quod
ictus à viperis sanet.*

Echium siue Buglossum
syl. Lob.

Anchusa syluestris *Thal.*

Buglossum viperinum.

Natterkraut.

Wild Ochsenzung.

Gravenkrieg. *Sil.*

In campestribus agris in-
cultis inter segetes sicco &
exoluto solo, integra æstate
luxuriat.

Præstantiss. est ad lethali-
um ferarum imprimis Ser-
pentum & Viperarum mor-
sus, potum & impositum.

Florem interdum candi-
dum exhibet.

Equisetum nudum.

ἵππωνος ἄφυλλος.

Hippuris nuda sine folijs.

Polygonum scæmineum &
φινδραγυλον Thal.

Schasthem.

Schlotten.

Holgrasß *Sil.*

Palustribus & humenti-
bus latatur locis.

Refri-

Refrigerat, fíccat. Sanguinem è naribus & vulneribus erumpentem reprimít. Ruptis, Vesicæ & Intestinatorum dissectionibus & Enterocelis utilis. Contra Scorbutum efficacax.

Equisetum I I.

αν'ιπποεις Diosc.

Hippuris Lobel.

Equisetum 1. Mattiol.

Equisetum aquaticum longioribus folijs C. B.

Wasser Rosschwanz.

Pferd Schwanz.

Gaudet vdis & humentibus.

Equisetum I I I.

Equisetum longius Fuchf.

Equisetum palustre maius Tabern.

Hippuris fontalis.

Groß wasser Rosschwanz.

In piscinis & palustribus vliginosis.

Equisetum agreste maius seu IV.

Hippuris aruensis maior Tabern.

Hippuris segetalis maior.

Cauda Carti.

Karzenwadel/Karzenzagel.

Reibisch/Kreibisch, St.

Schasthem halm.

Acker Schasthem.

Kannenfraut.

Agris delectatur macilentis.

Fœminæ hoc stanneam suam suppellectilem elegantiss. abstergunt.

Pictoribus in vsu.

Equisetum agreste minus seu V.

αολύγονον εἴληυ Diosc.

Hippuris aruensis minor seu 5. Tabern.

Polygonum fœmina Dod.

Sanguinalis fœmina.

Klein Karzenzagel.

Tannenwadel.

Vliginosas Conualles & quas riuuli interluunt crepidines sectatur.

Siccat & adstringit validè. Eapropter ad vulnera commodum. Ad sanguinis reiectionem, ad profluuium muliebri potissimum rubrum, ad Dysenterias & alios ventris fluxus generosum medicamentum.

Equisetum syluaticum seu VI.

Hippuris syluatica.

Cauda equina syluarum.

Wald Ross Schwanz.

Folia circum Caulem cubitalem prædictis tenuiora, sub-

subtiliora, capillacea.

Amat umbrosa & humida
sylvarum loca.

Equisetum iunceum
seu VII.

Equisetum iunceum fo-
lijs nudum.

Equisetum non ramo-
sum, C. B.

Hippuris iunca.

Bintzen Roßschwanz.

Vlginosarum piscina-
rum alumna.

*Erica vulgaris pur-
purea.*

*Ereim Diosc. *μαχαρόερινον* à
multiplici foliorum incisura.

Erica maior floribus pur-
purantibus, Lob.

Heide.

Kote Heide.

Plurquam notissima in a-
ridis campestribus, collibus
& syluis.

Aestate floret & autumn.

Calēfacit & siccāt, dige-
rit per halitum.

In Lienis affectibus, Cal-
culo & Colica commenda-
tur.

Additur Balneis ad sudo-
rem ciendum: In fessibus itē
Podagricorum & Paralyti-
corum. Floribus apes dele-
ctantur: sed mel fit reprobū,

*Liquor stillaticius Ophthal-
miam mulcet.*

Erica candido flore.

Erica vulgaris flore albo.

Weisse Heide.

Flores ex vino rubro poti,
album Menstruorum fluxum
inmodicum absument, mu-
liercularum experimento.

Eruca palustris
maior.

Eruca aquatica maior.

Eruca palustris lutea ma-
ior.

Grosse wasser Raucken.

Geeler weisser Senff.

Ad ripas torrentium &
fluuiorum.

Nasturtium sapore amu-
latur aquaticum.

Eruca palustris minor.

Kleine wasser Rauckelen.

Iisdem locis.

Eruilia.

Eruilia seu Ochrus, Dod.

Aracus Mattiol. Cam.

Ochrus syl. seu Eruilia,

Aduers.

Kleine wilde Wicken.

Esels ohren.

Nascitur campestribus.

Semen abstergit, desic-
cat, Cum melle pulu. vlceri-
bus

I

bus

bus & vulneribus illinitur.

Eruum syl. latifolium.

Αδύκος.

Cicercula syl. Tabern.

Lathyrus syl. maior seu
purpureus, Thal.

Pisum angulosum.

Wild Ernen.

Wolffs Schotten/ Sil.

Wilde Wicken.

Altis delectatur incultis
& macris locis, inter arbusta
& vepres.

Iulio & Augusto floret.

Semen amaritudinis par-
ticeps, extergit, incidit, ob-
structiones expedit.

Eruum syl. angustifolium.

Pisum Græcorum syl. Trag.

Lathyrus angustiore gra-
mineo folio, Lob.

Lathyrus leguminosa an-
gustifolia, Tabern.

Lathyrus syl. floribus lu-
teis, Thal.

Αδύκος & αδύος & αδύος.

Vogel wicken.

Geel Wicken.

Passim locis caduis &
pratensibus, Iulio & Augu-
sto floret.

Erygeron maius.

Senecio maior, Mattiocl.

Iacobeia Senecio, Aduers.

Iacobeia vulgaris Cl. P.

Arthemisia *αολιδανος*, Dod.

S. Jacobefraut.

Groß Creutzkraut.

Zeckkraut/Spinnenkraut/
Sil.

In collibus latis passim se-
cus itinera.

Amarum est subadstringens. Odor nullus.

Ad anginas tonsillarum-
que inflammationes vtile
gargarismate, quas discutit
& persanat. Araneorum ictui
opitulatur.

Erygeron minus.

Ἡερύγων Diosc. Aduers. *α-
α τὸ ἐν ἡερύγωνος.*

Senecio Herbar.

Erygeron minus seu *a*
Dodon.

Salutaris.

Creutzkraut.

Sew wurtz.

Grindwurtz.

Baldgreys.

Speykrant/ Sil.

Nascitur in macerijis, pa-
rietibus & circum oppida.
In hortis, item olerariis locis
cultis, aestus & frigoris patiens.

Mixtam obtinet faculta-
tem simul refrigerantem, &
modi-

modicè digerentem. Sapo-
re est insulso & oleraceo.

Folia hyeme inter aceta-
ria recipiuntur, nec ori in-
grata. Saluam cient.

Phlegmonum initijs atq;
Erysipelatibus optimè facit.

Trita Cataplasmate, Mām
marum inflammationibus &
duritiei vtiliter à feminis
imponuntur.

Aqua stillaticia infantibus
Epilepticis commendatur.

Erygeron tomentosum.

Erygeron maius siue 1.
Dodon.

Senecio maior 2. Tabern.

Wolledt Creutzwurtz.

Ceteris maius, folia pau-
latim habet hirsuta & gra-
ueolentia.

In syluis cædis frequens
& secus vias Augusto floret.

Erygeron alpinum.

Senecium montanum.

Iacobeia latifolia 2. Clus. P.

Conyza alpinae genus,
Gefn.

Amat altissimos & humi-
dos montium saltus.

Flores fert Iulio & Augu-
sto aureo colore radiantes.

Eryngium vulgare.

Héyywv, Diosc.

Eryngium campestre, Dod.

Centumcapita, Plin.

Iringus, Officin.

Brackendistel.

Wallendistel.

Manstreu/ob multa glo-
bosa capitula in eminentes
spinas aculeata.

In asperis campestribus,
incultis Boemia: apud Si-
lesios non ita frequens.

Consistit in terrena essen-
tia, calefaciens & siccans. A-
perit, digerit, vrinas mouet,
Menstrua prouocat, Lienis &
Iecinoris farctus expedit.

Radix cocta & pota Coli-
cos sanat & Calculos rumpit
magno experimento.

Contra stranguriam præ-
stat pota.

Condita saccharo senibus
impotentibus vtilis.

Eryngium nothum.

Crithamum montanum
vel terrestre, Mattiol.

Eryngium montanū re-
centioribus, Lob.

Crithmus aruensis.

Sichelfraut.

Sichel Möhren.

Feld Bacillen.

Ad agrorum margines, in
vincis Boemiae passim. Ac-
tate floret.

I 2

Odo-

Odore & sapore Eryngium refert.

Radix longa altè in terram subacta, dulcis, subacris, odorata.

Aperit, calefacit, digerit, siccatur, urinas trahit, & Menstrua pellit, Calculum eijcit.

Euonymus.

Ευώνυμος, Theoph. *Aduers.*

Τριτάγαντα, Theoph. *Dalechamp.*

Anonymos, *Cordi.*

Carpinus Theoph. *Trag.*

Fusamum.

Spindelbaum.

Τζωεφholz / *Sil*

Psaffenrößlin / *Sil*

In sepibus, dumetis & syluis montosis vulgo nota. Maio floret, Octobri fructus consequitur.

Materies verrunculis culinarijs aptandis commoda, ad carnes ligulis transfigendas apta.

Fructus oues enecat.

Lixiuum ex eo capillos splendidos facit. Furfures abstergit, & pediculos necat.

Eupatorium Græcorum.

Ευπολίειον Diosc. *ἐπὶ τῇ ἡπατί.*

Eupatorium, *Tabern.*

Agriemonia, *Officin.*

Lappula hepatica.

Matmorella.

Concordia.

Odermenig.

Leberfletten.

Planta vulgaræ notitiæ in pratis siccioribus ad sepes & colliculos pagorum.

Floret Iunio & serius vsq; ad Octobrem.

Eligatur ad vsum odorationis, Betonica ferè odorem emittens: altera inodora minus utilis.

Tenuium est partium. Aperit, incidit, abstergit, citra manifestum calorem exiccat & moderatè adstringit.

Obstructiones referat viscerum, Hepatis præsertim, intemperiemq; omnem corrigit.

Nervos luxatos restituit vulgato vsu, urinas ciet & menstrua prouocat.

Recens vel sicca cum furfuribus Triticeis in vappa decocta luxatos articulos imposita emendat.

Eupatorium adulerinum.

Hepatorium vulgare. *Dod.*

Pseudohepatorium mas, *Thal.*

Origanum palustre.

Cannabina aquatica.

Eugenia

Tugentblumen/
 Drachenkraut/ } *Sil.*
 Wasser Otisch/
 Albkraut/
 Wasser Dosten.
 S. Künigundiskraut.

Ad scrobes riuiuloru, frangnantium aquarum margines fluuiorumq; ripas Iulio & Augusto viget.

Amaricantis est gustus, odoris non minus suavis, quam Agrimonia odorata, cui viribus proximè accedit.

Herba viribus insignis; quamvis ab antiquis silentio fuerit prætermissa.

Hepatis ac Lienis affectibus, tumoribus ac obstructionibus citra calefactionem mirè prodest. Datur Tertianâ & Quartanâ laborantibus, nec non bile suffusis post principia.

Suffitus animalia fugat venenata.

Additur balneis ad vteri affectus & lixiuijs aduersus iuueteratos capitis dolores.

*Eupatorium Cony-
 zoides 1.*

Eupatorium Cannabinum femi. Septentrionalium stellato & odoro flore, *Lob.*

Eupatorium Cannabinum

Chrysanthemum Auic. & *Mef. Dodon.*

Pseudohepatorium femina, *Thal.*

Hydropiper Pseudepatorium fem. *Dodon. Lugd.*

Conyza aquatica max. ferratifolia.

Geel Ferberkraut.

Wasser Sternkraut.

Staubars/ *Sil.*

Vbiuis fermè humectis vdis & squalidis circa oppida & pagos multum.

Amarum est, grauis odoris. Calidæ & siccæ naturæ. Sternutamenta ciet.

*Eupatorium Cony-
 zoides 1 1.*

Eupatorii Cannabini 2. species.

Hydropiper 2. *Lugdun.*

Bidens folio non dissecto, *Cesalp.*

Ein ander art mit vnzer-
 teileten bletteren.

Ijsdem locis.

Euphrasia candida.

Εὐφρασίαν.

ὀφθαλμοδουλία.

Euphrasia, *Dod.*

Euphrasia, *Mattiol.*

Oculorum lumen, solamē.

Augentrost/ Augendienst.

Weisse Leuchte.

Tage Leuchte/ sil.

Pratis gaudet strigosis,
secus agrorum margines ac
vias, vbiuis nota.

Floret Iulio, Augusto, Se-
ptembri.

Gustu nonnihil amara Ex-
calescit parum & desiccatur
magis. Abstergit, cohibet, ro-
borat. Ad oculorū caligines,
& morbos pituitosos perua-
gata commendationis, quo-
quo modo sumata.

Ex vino pota lēterū tollit.

Additur vtiliter Cephalicis
decoctis & Pedū lotionib.

Vinum Euphragiatum reiuue-
nescere facit aufertq; omne
Oculorum impedimentum,
visusq; defectionem, praefer-
tim putridis crudisque hu-
moribus redundantibus.

Euphrasia caerulea I.

Auricula Muris Diosc.

Mattiol.

Myosotis scorpioides par-
tim repens, partim erecta,
Lob.

Echium scorpioides ma-
ius & aquaticum. Heliotrop-
ium palustre.

Blauer Augentrost.

Blawe Leuchte.

Vergiß mein nicht/

Susannenfraut/

Bröthen Englin/

} sil.

In pratis iuxta profuen-
tes aquas & riuulos à Maio
in multam ætatem floret.
Temperate refrigerat &
humectat.

Flosculi visui gratissimi
Maio ad corollas à virgun-
culis colliguntur.

Euphrasia caerulea II.

Μυδς ὀρίων Diosc. Aduers.

Echium scorpioides mi-
nus, Gesn.

Cynoglossa minor, Brunfels.

Auricula Muris Dioscor.
Aduersar.

Blaw Acker Augentrost.

Blaw Meußdöhrlein.

Blein vergiß mein nicht.

Inter segetes ætate obuiā.

Siccatur 2. ordine absq; ma-
nifesta calefactione.

Fagus.

Φυδς, Dioscor. κατὰ τὸ φάγαν.

ὄξυς, Theoph. Aduers.

Fagus vulgaris, Aduers.

Ein Buche/ Buchbaum.

Rusticis nota arbor in
montibus, collibus, & syluis
montosis nonnihil humenti-
bus. Theophrastus distinguit
in Marem & fœminam. Alij
à colore ligni in albam &
nigram.

Flores Maio Iunio sunt
iuli

iuli rotundi, sublutei, quibus
subnascuntur fructus.

Folia refrigerant, adstringunt, siccant. Calidis tumoribus & inflammationibus incipientibus prosunt, imbecillas nervorum partes roborant.

*Fructus, faginæ Glandes, nucleis similes, triangula-
cute inclusæ, Buch&Efer/
cum levi adstrictione dul-
ces, calidæ & humidæ. Ve-
hementer tentant Caput &
inebriant quasi, si nimium
edantur.*

Porci eo saginantur No-
uembri mense.

Oleo ex Nucibus expres-
so paupercula plebs tempo-
re Quadragesimali loco bu-
tyri vtitur.

Filipendula pratensis.

Θιναίν Theoph. ως οίνου αἵματος.

Filipendula vulgaris Cl. P.

Saxifragia rubra Offic.

Vitiflora.

Roter Steinbrech.

Silipendelwurz.

Haarstrang. sil.

In pratis altis & herbidis
locis, Junio & Julio fre-
quens in monte D. Georgij
ad Strigomium.

Flores suae quiddam re-

dolent Labruscæ. Radix amara est, abstergit cum leui adstrictione, vrinas ciet. Calcfacit & siccat 2°. gradu.

Pota dysuria ac urinae stil-
licidio laborantibus pro-
dest. Renum item & Calculi
doloribus. Stomachi inflati-
ones discutit, Tormina & In-
testinorū flatus resoluit. Sin-
gulare, naturæ ductu, contra
Picarias remedium.

Filipendula palustris.

Filipendula palustris.

Oenanthe aquatica repens Matt. Cam.

Wasser Filipendelmurtz.

In palustribus, Junio.

Filipendula montana.

Oenanthe seu Filipendu-

Electrololophus I. Cl. P.

Alectorolophus alpinus.

Berg Kodel.

Berg Filipendulwurtz.

In montibus: circa gigan-
teum Iulio floret.

Folia tenuia quasi crispa.
Radicula plurimæ candida,
circa exortum foliorum con-
iuncta instar Phthoræ VVal-
densis.

Filix mas vulgaris.

Πτέρις Diosc.

Filix

Filix mas Mattioli. & Lob.

Filix monocaulis.

Farrenfraut.

Wald farren.

S. Johannis farbe sil.

Apertis & patentibus locis delectatur.

Amara est radix paululum adstringens, valenter desiccatur.

Lumbricos latos cum Mulsapellit. Lienosis prodest pota, nec non Hepatis obstructione laborantibus.

Stomacho inutilis.

Filix mas alpina maxima.

Grosser Berg farren.

Berg farbe.

Notissima in montibus humidis & saxosis locis. Ad trium cubitorum proceritatem assurgit.

Filix femina vulgaris.

Ἰνδὸν ἡγεῖς Diosc.

Νουφῶνα Πλεῖς.

Filix ramosa.

Farrenfraut Weiblin.

Wald farbe Weiblin.

Koß farren.

Circa margines agrorum sub sentibus, in sylvis etiam restibili ubertate luxuriat.

Similem cum Mari vim obtinet.

Folia tenella adhuc deco-

cta ac comesta, aluum solvant, primo bilem, mox aquam trahentia.

Feminis data sterilitatem faciunt & gravidis abortum.

Cimices necant, Serpentes non recipiunt.

Farina radices humidis ulceribus & cicatrici repugnantibus inspergitur. Rimas labiorum sanat, Iumentorum Ceruicibus medetur.

Folia recentia in pileo vel capite gestata caput graui dolore afficiunt.

Utraque flore & semine destituitur, tota sterilis.

Aduersæ Filicum frondes pubescunt plumata quadam ferruginea lanugine, in qua veluti mollicellis cubiculis autant & nitent semina nigra lucidaque æstiuo solstitio maturelcentia ruptis vesiculis.

Filix muraria seu minor.

Filix pumila saxatilis mas & femina.

Filix petraea.

Steinfärkin.

Maurfarbe.

In præruptis inter saxa.

Adstringentis est saporis.

Filix spinosa seu aculeata.

Filix

Filix aspera mas & femina.
Spitziger Farren.
 In montibus opacis altis-
 simis.

Filix fontana.

Brunnenfarb.
 Ad puteorum & fontium
 muros.

Filix arborea.

Αφροίτης Diosc. & Gal.
Filix querna Lobel.
Pteridion femina Cord.
Baumfarbe.
Eichfärrlin.
 Caudicib⁹ muscosis Quer-
 cum vetustarum aliarumq;
 arborum adnascitur.
 Psilothrum est cum radi-
 cibus trita & illita.

Fistularia lutea.

Α' λικτολόφος.
Alectoroloph⁹ lutea Thal.
Crista Galli Dod.
Pedicularis campestris.
Geeler Rodel.
Taschenkraut.
Blaffer Agricolis.
 Nullis non pratis & agris
 humidis frigidisque multa.
 Aestate pluuiosa & humida
 Secale in hanc degenerare
 solet inuitis Agricolis.
 Gustu subadstringit non-
 nihil amaricans.

Semen Siligini permix-
 tum panem obscurat & a-
 trum reddit, saporeq; ama-
 rum.

Fistularia purpurea.

Pedicularis Aduers.
Alectorolophus 3. Clus. P.
Ruta pedicularis.
Braunrodel.
Fistelfraut.
Rodel/Hundsrott/Sil.
 Vliginosis & muscosis
 pratis multa.
 Herba noxia & pratorum
 vitium pabulumque pecori
 ingratissimum.
 Ad fistulosa & sinuosa vl-
 cera utilis.
 In vino rubro decocta fluo-
 rem nimium feminarum in-
 hibet.

Fænuigracum syluestre.

Polygonon, Cord.
Glycyrrhiza syluestris,
Gesner.
Glauz vulgaris, Aduers.
Securidaca maior, Guland.
Stein Wicken.
Beeren Schotten/Wolffs-
Schotten/Sil.
 In montibus inter arbu-
 sta, & syluis cæduis. Radix
 longissima & altè subacta
 non facile interimitur. Iu-
 lio florer.

K

Semen

Semen siccat, emollit, digerit, discutit, quàm proximè viribus ad Fœnugræcum accedit.

Fragraria.

Fragula, *Cordi.*

Herba Fragi.

Erdbbeerfraut.

Montibus, syluis, collibus & viarum marginibus familiaris.

Viret toto anno herba. Vere latius expatiatur fibris, dein flores facit, Iulio fructus maturefcit.

Folia gustu modicè amara, adstringunt, refrigerant, siccant.

Radix cum folijs mulieres fluxiones & dysenteriam cohibent, vrinas cient, & Lienî conferunt in cibo sumata.

Potu præstant ad Iecinoris inflammationes, Renum vesicæq; sordes.

In ore retentū decoctum gingiuas roborat, commotos dentes stabilit & destillationes sistit.

Succus vlcusculis in facie à caliditate prouenientibus mirificè medetur: itemque varos & Oculorum nubeculas calidasque defluxiones impositus tollit.

Fraga rubra.

Mora terrestria, *Seruij.*

Erdbbeeren.

Refrigerant. Alimentum conferunt exiguum tenue & aquosum. Biliosis æstuantibusque ventriculis profunt.

Rob Fragorum, Erdbbeeren safft / siticulosis opem fert, febrientibus gratissimum & suaue. Eadem præstat stillaticius Liquor.

Fraga subalbida.

Fraga candida.

Fraga montana.

Manßbeere, Besslinge / *Sil.*

Weisse Erdbbeeren.

Subalbida sunt, maxima & longa.

Folia habet hispidiora.

Frangula.

Auornus, *Petri Crescent.*

Alnus nigra, *Lugdun.*

Arbor foetida.

Hundsbaum.

Schießbeeren / *Sil.*

Zipffenholz.

Faulbaum.

In syluis humidioribus v-
liginoso solo fruticat. Folia
lætum bobus ac vaccis pa-
bulum, quæ horum pastu lac
reddunt copiosius.

Cortices interiores crocei
Vere

Vere delibrantur & in vmbra siccantur, multæ virtutis.

Expellunt bilem & pituitam serofosque educunt humores, solvunt aluum, bellè Iecur expurgant & roborant, aperiunt viscerum obstructions: verùm nauseam & vomitum cient ventriculūque perturbant. Corriguntur Cinnam. Zingibere spica, macere, aniso.

Decoquantur cum aperientib. medicamentis ad Cachexiam, icteritiam, Aquam intercutem & lienis affectus: at Rusticis; non vrbanis aut delicatis.

Vulgus corticem luteum flore lactis incoquit, contra scabiem præsentissimum remedium. Noui attamen, eius vſu Agricolas hydropicos factos & penè suffocatos fuisse, repentina malignæ materiæ percussione. Ea propter ab eius vſu abstinendum suadeo, nisi prius fuerit probè euacuatū corp⁹.

Flores apibus grati.

Fraxinus frugifera.

Μελις, Theoph. & Dioscor.

Fraxinus angustioribus folijs, *Cord.*

Fraxinus, *Herbar.*

Alschbaum / Eschbaum.

Esche.

Passim in montibus & cliuosis. Ad arcem Greiffenstein / quotannis fert fructū. Aprili filiquæ prodeunt, Autumno semen matureſcit.

Folia vino decocta Hepaticis & Spleneticis conferunt, viperarumq; morſibus auxiliantur.

Cortices Lienem ex vino absumunt.

Morbū Regium tollunt. Calculosis & Hydropicis profunt.

Radix vulnera recentia sanat.

Fraxinus serpentibus adeo inimica, vt & vmbra eos abigat, Plin.

Bibenti ex poculo huius ligni absumitur Lien, & potus aduersatur venenis.

Expertus refero, si fronde ea gyro claudatur ignis & serpens, in ignem potius quàm in fraxinū fugere serpentem. Ambrosius Par. lib. 21. cap. 20.

Orneoglossum.

Ορνιθόγλωσσον.

Lingua auis, *Officin.*

Semen Fraxini.

Eschschmen.

Eschen missel vulgò sed falsò.

K 2

Race-

Racematim cohæret in si-
liquis membranaceis, se-
men oblongum Avium lin-
gulas representans. Autum-
no spontè decidit. Gustu a-
cre est & amarum. Calefac. &
siccat 3. recessu: vrinas ciet,
Venerem stimulat.

Potum auxiliatur Calcu-
losis, Hepaticis; Aquam, quæ
cutim subiit, extrahit.

Fraxinus sterilis.

Ὀξύμελις.

Άγρία μελίς.

Ornus, Trag.

Ostrya Cordi, Thal.

Fraxinus latifolia, Cordi.

Fraxinus fago similis, Thal.

Hanbuche.

Hagenbuche.

Buch Esche.

Weisse Buche.

Montium alumna.

Materies eius candidissi-
ma, omnium lignorum du-
rissima solidissimaque. Ad
cochleas Tinctorum & alia
instrumenta, quæ pondus
magnum sustinent, expetitur.

Fraxinus dura.

Fraxinus ἁβύσσος, Thal.

Fraxinus petra.

Stein Esche/Stein Esche.

Petrosis & præruptis mon-

tium locis saltem nota.

Fraxinus crispa.

Glader Esche.

Eius materies undulata,
ab Arcularijs ad mensas, ta-
bular & alia colligitur.

Fumaria Herbariorum.

Καρνός, Dioscor.

Karnior.

Fumus terræ, Officin.

Cerefolium felinum.

Erdranch.

Feld Rauttee/Sil.

Acker Rautte.

Taubenfropff.

Sponte inter segetes &
hortis oleraceis enascitur ci-
tissimè quasi effumans. In-
tegra æstate viget.

Acris simul & amara qua-
litas. Abstergit, aperit. E-
ducit bilem, omnesq; falsos
& adustos humores. Vis non
modò ad Iecur, sed ad ve-
nas permeat; quare sangui-
nem expurgat.

Scabiem, impetigines,
Morbum gallicum & alias cu-
tis infectiones curat, nec nõ
aduersus venenosos & im-
modicos sudores prophyla-
cticum est haud poenitendum.

Succus acris est, visum a-
cuit, lachrymas trahit.

Conseruantur flores sac-
charo,

charo, Melancholicis affectibus salutare & Cachecticis.

*Fumaria bulbosa maior
albo flore.*

Καπνὶς χιλιόβια.

Capnos bulbosa.

Capnos phragmites, Plin.

Radix caua Herbarior. Lob.

Aristolochia vulgaris rotunda, Trag.

Holwurtz.

Kunde Holwurtz.

Hertzwurtz/Donnerfing.

In umbrosis decliuibus & nemorosis saltibus Aprili floret, Maio semen maturat, ac tum tota planta arescit, sola radice superstita.

Radix naturæ miraculo rotunda quasi hemicylindros est, adulta verò excavatur. Gustu cum amaritudine quadam austerâ. Calefac. siccat, abstergit, mundat, adstringit nonnihil, sudores ciet, diuretica est.

Hepati succurrit & sanguinem purgat, Morbum regium curat. Vulneraria est, ad sinuosa ulcera & apostemata utilis: item ad veteres diuturnosque tonsillarum ac faucium tumores.

Aduersus Hamorrhoides cum dolore tumentes cum

Populneo permixta illinitur.

*Fumaria bulbosa maior
flore rubente.*

Radix caua purpureo flore.

Holwurtz mit roten blümlen.

Hanensporn.

Locis iisdem nascitur.

*Fumaria bulbosa
minor.*

Radix caua minor, Dod.

Radix tuberosa minor.

Capnos 2. fabacea radice,

Aduers.

Aristolochia fabacea.

Kleine Holwurtz.

Kleiner Hanensporn.

In syluis & frutetis umbrosis passim obuam.

Radicis exilitate, nulla insignita cavitata, à priori discrepat: flores purpurei. Pulvis eius contra lumbricos prædicatur.

*Fumaria bulbosa viridi
flore.*

Radix caua viridi flore.

Holwurtz mit grünlechten blumen.

Inter alias aliquando occurrit.

Fungi.

Mixtus.

K 3

Schwein.

Schwemme.

Fungifauaginosi.

Adre. Diosc.

Fungi spongiosi Lugdun.

Subera terræ.

Morcheln / Erdmorcheln.

Aprili prodeunt in pascuis.

Duplices sunt. Latiusculi, vulgo *Morcheln* / & acuminati seu turbinati, *Lauerchen* appellantur.

In delitijs sunt diuitum, à quibus vel frixi in butyro, vel decocti cum lactis flore, ouis pipere & butyro præparati comeduntur.

Stomachum refrigerant & prauis sunt succi.

Boleti Bonini.

Grosse Kùhböhlze.

Maximi sunt & molles, esu minus suaves.

Boleti nobiles.

Herren Böhlze.

Duriores sunt & palato gratiores.

Boleti petrosi.

Steimböhlze.

Steinfappen.

Maiores sunt & duri, superiori parte seu capitulo ut plurimum rubent.

Petrosi nasci gaudent.

Palato non ingrati. Duriores sunt capitulis rubentibus.

Boleti adiposi.

Schmerböhlze.

Nascuntur Boleti in syluis sub Pinastris, Pineis, Fagis, Betulis, &c. à Iunio ad Septembrem vsq; pluuiæ & humida cœli constitutione.

Hi detracta tunica & à sordibus mundati incisi minutim cum butyro, additis cœpis, Petroselino, Pipere, Zingibere in sartagine fringuntur pro quotidiano vsu.

Exiccantur pro hyeme, quos cum Pipere, Cœpis, aceto, butyro addito decoctos ut suauis edulium Silesij comedere solent absque vlla noxa. Cum ab exteris pro malignis & venenosis rejiciantur tanquam inutiles. Nutrimentum dant exiguum idq; minus probum.

Fungi Capreolini.

Rhellinge.

Reischen.

Passim in pratis & pascuis.

Luteoli sunt & orbiculares, luteum prorsus fundentes succum; palato ceteris gratiores.

Afsi

Asi cum butyro & sale
deuorantur.

Fungi punicei.

Fungi Columbini.

Teublinge.

Blawlinge.

Candidi sunt, punicei &
cœrulei.

Fungi Betularum.

Birckenschwemme.

Bircklinge.

Lutei sunt & lati, succo
turgentes luteo, Capreolinis
ferè similes.

Sub Betulis ut plurimum
proueniunt.

Fungi piperini.

Fungi amaricantes.

Bitterlinge.

Pfifferlinge.

Fungi sunt prorsus candi-
di, rotundi, qui fracti succum
manant lacteum, feruentis-
simi saporis, ut Piper.

Aqua feruenti sæpe ma-
cerati lacti incoquantur, &
addito butyro & sale paran-
tur ad cibum.

Calefaciunt, siccant, ape-
riunt, abstergunt, comminu-
unt.

Succus recens cum syr. vi-
olato aut alio appropriato
potus Calculum frangit, de-

turbat, & urinas potenter
pellit singulari experimen-
to.

Fungi lutei.

Fungi digitelli lutei.

Gele Schwemme.

Kölgen/ Schelinge.

In syluis ad radices &
truncos Picearum & Abie-
tum ubertim luxuriant.

Minores sunt cæteris, toti
lutei, esu haud ingrati.

Fungi Arborum.

Stock Schwemme.

Opincfel.

In caudicibus Betularum
& Abietum leguntur.

Molles sunt & lubrici ta-
ctu.

Fungi fagini.

Buchschwemme.

Habichschwemme.

Fagis adnati, Autumno
leguntur ad Ciborum usum.

Phthificis commendan-
tur. Consolidant & gluti-
nant vlcera.

Frequens eorum usus suc-
cum gignit prauum.

Fungi digitelli.

Fingerschwemme.

Hendelschwemme.

In digitos videntur disse-
cti,

ſti, Muſco qui antiquis arboribus adhæret, ſimillimi quamplurimi coniuncti partim lutei, partim candidiſſimi, partim rubri.

Nascuntur juxta putrida ligna & arborum truncos putreſcentes.

Prorſus ſunt inſalubres.

Fungi non edules.

Fungi Sambucini.

Auriculæ Iudæ.

Aures Iudæ.

Golderschwemme.

Holunderschwemme.

Caudicibus veterum arborum aut fruticum Sambuci Maio adhaſcuntur. Cuti elixæ aut Corio ſimiles.

In aqua molleſcunt & tument veluti ſpongiæ.

Gultu pene inſipidi. Adſtringendi & reſiccandi vim habent.

Ex vino decocti contra Anasarcam bibuntur. Anginis certiffimo experimento utiſſimum, & tumoribus intus forisq; nunquam ſatis laudatum medicamentum.

In aqua Sambuci aut Barbæ prætenſis ſicci præmacerati, maximo doloris leuamento Podagris imponuntur.

Fungi ceruini.

Boleti ceruini.

Hirschschwemme.

HirschBrunſt.

Tubercula ſunt rotunda omnino inæqualia, putamine ſcabro teſta, pulpa, ſeu fuligine potius nigra repleta.

In altiffimis montibus paſſim ſub Muſco terrâ quaſi cortice inuoluti naſcuntur.

Gultanti naſeam mouent, haud intra corpus ſumendi, quemadmodum veri & ſolidi, quibus Sileſia noſtra deſtituitur.

Ad Venereos uſus vulgo commendantur. Fuligo lanuginem vulneribus inſperſa cohibet.

Fungi Ouales.

Fungi orbiculares.

Spongiæ terreſtres.

Lupi crepitus.

Buben fiſt / Phalen fiſt.

Hi terrâ coherant nullo ſulti pede in globum circinati, nec vlla ſui parte dehiſcunt, quorum interior medulla, laxa, candida & præhumida. Qui dum reſiccati rumpuntur, atram fuliginem eructant toto callo in fumum abeuntes.

Paſſim

Palsim in campis graminosis & pratis siccioribus gignuntur.

Impositi Hemorrhoidibus nimium fluentibus non modò sanguinem fluentem sistunt; verum etiam partes illas exulceratas melius quàm ullum aliud medicamentum sanant.

Fungi Igniarij.

Sunder Schwemme.

Sewer Schwemme.

Fungi sunt Fagorum aliarumq; arborum, qui decocti cum Nitro, sulphure & alijs, vt ignem facile concipiant, præparantur.

Fungi perniciosi.

Fungi Suilli.

Fungi porcini.

Sew Schwemme.

Rostri suilli formam quandenus referunt. Aprili & Maio reperiuntur.

Ex aqua ad serpentis morsus illinuntur.

Fungi Fimetarij.

Fungi lethales.

Giffige Mist Schwemme.

Variant figura & colore.

Alij virides, alij fusci, alij caelij.

Butyro frixi illinuntur contra scabiem Capitis malignâ, vulgo den bösen grind.

Fungi Muscarij.

Musciperdæ.

Fliegen Schwemme.

Mücken Schwemme.

Fungi sunt capitulis gibbis rubentibus, punctis albicantibus insigniti, aspectu elegantes.

Lacte triti ad Muscas encandas tabulæ imponuntur; quos si gustauerint, citissimè moriuntur.

Exiccantur & aceto imbuti tuberculis pestilentialibus haud inutiliter imponuntur.

Galega sylvestris.

Securidaca minor Cortus.

Securidaca Pannonica a.

Cl. P.

Vogels Wicken.

Wilde Geiß Rante.

In agris inter segetes Iulio & Augusto floret.

Galium tenuifolium.

Galium Dod.

Galium luteum Matt.

Lob. Lugdun.

γάρνι Diosc. à coagulando lacte.

Megerfrant / Labfrant.

L

Walstro /

Wolstro/Wegestroh.
Butterstiele *Sil.* Glieder
frant.

Seclatur aridiores agro-
rum limites. Iunio & Iulio
flore.

Subacris est & desiccato-
riæ facultatis, boni odoris.

Flos tusus & impositus
Sacris ignibus & ambustis I-
gni medetur, sanguinis pro-
fluvia sistit. Contra Can-
crum & cancrofa ulcera ma-
ximoperè commendatur.

Coma in lacte macerata,
illud coaguli modo conden-
sat.

Miscetur acopis. Fotu ar-
ticulos luxatos restituit.

Galium latifolium.

Cruciata *Dod.*

Cruciata herniaria *Thal.*

Crucialis *Casalp.*

Asperula aurea.

Gulden Waldmeister.

Geele Gliegegenge. *Sil.*

Gelb Kreuzkraut.

Iuxta fossas aquarum, ri-
uulos & quandoq; agrorum
margines.

Flores lutei odorati Iunio
apparent.

Folia sunt amara, abster-
gunt, calefaciunt & siccant.

Vulneraria planta, inpri-

mis Herniosis utilis. Pota
Thoraci, Ventriculo, Venis
Mefaraicis & visceribus ob-
structis prodest, excrementa
pituitosa foras propellit; i-
deo appetitum jumat.

Genista fruticosa.

Genista maior.

Genista scoparia.

Gienst/ Pfriemen.

Incultis parietibus iuxta
sylvarum & agrorum limi-
tes fruticat. Vere flores
ostentans luteos.

Virgularum ac cymarum
decoctum Hepar, Lienem &
Renes expurgat ac aperit.

Aquosos humores per al-
uum trahit; idcirco Hydro-
pici auxiliatur.

Flores vomitum cient,
contriti strumas discutunt.

Genista humilis.

Chamægenista r. *Clus. P.*

Genistella infectoria *Lob.*

Ferula *Trag.*

Geele Gerbblumen.

Holbeide/ Khorbeide *Sil.*

Mägde Krieg.

Abundè incultis & aridis
pratis collibusq; luxuriat.

Iunio & Iulio flores colli-
guntur ad tincturæ vsum.

Tota gustu amaricante.

Calida.

Calida & sicca 2°. ordine.
Ad sudorem prouocan-
dum balneis additur.

Genistella spinosa.

Genista pumila spinosa.
Genistella aculeata *Aduers.*
Stechende oder kleine Hol-
beide.

Stechende Psfriemen.

Erdspsfriemen

Hanc nutriunt exusti col-
les squalidaq; montium eri-
cera.

Adstringit cum amaritu-
dine, ac proinde valenter si-
mulque citra mordacitatem
exiccat.

Foliorum decoctum Men-
struorum profluuium sistit:
idem potum ventris fluori
succurrit.

Gentiana Silesiaca maior.

Germand.

Gentiana Asclepiadis fo-
lio, seu 2. *Clus. P.*

Gentiana cœruleo flore.

Engies.

Klein Engian.

Folia ei mucronata Ascle-
piadis ferè, sed colore dilu-
tius virente; flores oblongi
colore cœruleo saturatiore.
Radix digitalis crassitudi-

nis, lutea, multis oblongis
crassis fibris donata.

In montibus excelsis Su-
detis, herbidis locis Angu-
sto floret: semen paleaceum.

Radix amara quidem sed
minus quam vera seu maior
Gentiana: aperit, abstergit.

Febricitantibus, Asthmati-
cis, Calculosis, & bile suffusis
utilis. Venenis resistit.

*Gentiana Silesiaca maior
niueo flore.*

*Engian mit Schneeweissen
Blumen.*

Priori prorsus similis præ-
ter flores, qui prorsus can-
didi.

In valle Gigantum ad
Onpam fluuium.

Gentiana cruciata.

Germand. unged.

Gentiana minor *Dod.*

Cruciata gentianella *Thal.*

Phyteuma Græcorum

Tabern.

Radix Sibyllæ *Offic.*

Creutzwurtz.

Modelgeer.

Sibyllenwurtz. *sil.*

In collibus & monticulis
apertis & gramineis; tum
pratibus siccioribus maximè
Boiemiâ versus. Floret Iulio.

L 2

Radix

Radix cum herba amarissima est, magni apud plebeculam nominis, calida & sicca. Incidit, aperit, abstergit.

Menses prouocat, comitiali prodest, febribus putridis competit, Lumbricos ventris enecat. Contra Pestilentiaë contagia Antidotis additur: vitia Pectoris expurgat. Vulneraria est præstantissima. Rupturas & Strumas exulceratas sanat.

Ex aceto ruptis, ab alto deuolutis propinatur, communi vsu.

Gentiana punctato flore.

Gentiana 7. Clus. 12. & punctata Pinnei.

Gentianella flore atroceruleo punctis nigris notato.

Klein Enzies mit schwarzblauen gestirnten Blümlin.

Radix ex pallidolutea, tenuis, fibrosa, coliculus promittit sesquidrantalem & altiore. Flores stellati ex cæruleo nigricant, punctis nigris insigniti, Iulio & Augusto conspicui. Folia Plantaginis ferè. Amat petrosa & humida altissimorum montium loca: veluti in Schnee gruben, ad lacum maiorem & alibi.

Tota amara est instar Gentianæ, Venenis medetur pota.

Gentiana angustifolia pulcherrimo flore.

Gentiana angustifolia pratensis.

Campanula autumnalis in pratis proueniens Dod.

Schmalblettericht Enzian.

Circa montem D. Georgij ad Strigam.

In pascuis & pratis Boemiarum copiosissimè, hilari & jucundo cæruleorum florum aspectu visum recreat.

Radix oblonga, candida, in fibras diducta, impensè amara.

Efficax habetur aduersus pestilentes morbos, & ad virulentorum animalium ictus & morsus. Tineas ventris pota necat.

Gentiana fugax.

Gentiana angustifolia 2. Cl. P.

Campanula autumnalis Dod.

Pneumonanthæ Lob.

Viola Calathiana seu autumnalis 1. Thal.

Lungen Enzian.

Lun-

Lungenblümle.

Autumno passim in campestribus, pratis, pascuis, areis pagorum & alijs incultis.

Flos ex cœruleo purpurascens sursum hiat. Amaricat abstergit, aperit.

Ex hydromelite pectus purgat, Hepatis & Lienis obstructions tollit, Icterus soluit & Menstrua mouet.

Radix tusa & imposita umbilico Lumbricos expellit.

Gentiana fugax Polyanthos.

Gentiana fugax siue annua 1. vel Gentiana 7. Cl. P.

Gentiana minor polyanthos.

Viola Calathiana 2. siue πολυάνθος Thaly.

Blein Lungenblümle.

Ad Landeshuttum in pago Reusendorff multa Autumno.

Geranium Robertianum.

Γεράνιον χελιδόνιον.

Geranium Chelidonium siue Hirundinarium, Turneri. Sideritis 3. Diosc. Nenn.

Robertiana.

Gratia Dei.

Gottes gnad.

Blutkraut.

Rotlauffkraut.

Storckenschabel.

Duplex est. Viride omnino, quod femina dicitur, & rubens quod mas, & praefertur.

In muris, pomœrijs, tectis & alijs vmbrosis locis notissimum.

Tota hyeme viret, à Maio in multam aetatem florens.

Odore est graui satis atq; haud iniucundo. Mediocriter calef. refrigerat, siccatur, cum adstrictione, abstergit, consolidat.

Recens tritum peculiari-ter commendatur, ad Erysipelata, Mammarum inflammationes, oris & pudendorum vlcera.

Aquæ incoquitur, & pectori cruenta mingenti potui datur.

Geranium Columbinum.

Γεράνιον έτερον, Diosc.

Pes Columbinus, Dodon.

Geranium Maluaceum.

Taubenfuß/Scartenkraut.

Secus itinera, campis incultis, cœmiterijs & hortis

L 3

olera-

oleraceis notum. Floret plurima ætatis parte.

Mediocriter calefacit & siccatur cum leui quadam adstrictione.

Vfus eius est ad vulnera & fracturas, fistulas & vlcera sananda.

Balneis percommode ad Intestinorum tormina additur.

Fotu Articulorum dolores iuuat.

Geranium myrrhinum inodorum.

Geranium gruinum.

Geranium 3. & 4. Tabern. Branich schnabel.

In ruderibus circa sepes, secus itinera. Agris quinetiam incultis, arenosis & saxosis flore albo & purpureo æstate occurrit.

Vulneribus commodum.

Geranium hamatodes.

Geranium sanguineum, Tabern.

Geranium hamatodes lupinum.

Blutwurtz.

Blutfrant.

Nascitur secus itinera locis incultis & ad pratorum margines.

Geranium bulbosum

Slesiæcum.

Radix von Berg- & Joides.

Geranium bulbosum Pen- næ seu 3. Clus. P.

Geranium sanguinarium, Sanguinaria radix.

Blutwurtz / Bluttröglin.

Rote Hünervurtz / sil.

Nabelwurtz /

Flos roseus æstate & Autumno prodit.

Ad pratorum margines humidioribus locis territorij Hirsbergensis passim occurrit.

Radix ex multis oblongis bulbis Sisari instar rubentibus constat, siccandi & adstringendi vi prædita.

Datur ruptis, conuulsis, dysentericis.

Ad sanguinem vndeque emanantem compescendum haud quicquam præstantius Chirurgis in vfu & vulgo notum.

Geranium petraeum.

Geranium saxatile.

Geranium hygroscope- lon, Thal.

Stein Storckenschnabel.

In asperis & petrosis montium.

Geranium alpinum.

Rad-

Γεράσιον ἀμαλῶδες.

Ἰχθυίος.

Geranium montanum.

Geranium 6. Fuchf.

Geranium 13. Tabern.

Berg Schnabelfraut.

Gorttes gnade.

Radix magna in multa capita rubentia protuberat, multas fibras spargētia. Flores purpurocæruleos. Maio & Iunio promit, montibus altissimis saltem notum.

Refrigerat, siccatur, adstringit. Ea propter sistit sanguinem, glutinat & consolidat.

Geranium alpinū fuscum.

Glaux exigua.

Γλαῦξ quasi γάλαξ.

Glaux exigua marina, Lob.

Glaux marina minor, Tabern.

Klein Seentelckfraut.

Herbula exigua circa Gryphibergam secus itinera solo fabuloso reperta.

Rara & incogniti usus.

Gnaphalium vulgare.

Γναφάλιον Diosc. ἂ γναφάλη, tomento.

Filago seu Impia, Dod.

Centunculus Romanis.

Rhurfraut.

Kätzlin/ feldfäzen.

Schimmelfraut/ sil. à colore. Tota enim incana apparet.

Vbique aridis & sterilibus multum Iunio & Iulio floret.

Adstringit, siccatur, Dysenteriam, Diarrhœam Menstruæque mulierum immodicè fluentes potum sistit.

Succus lacte & vino permixtus gargarizatu Anginis prodesse creditur.

Gnaphalium tenuifolium.

Γναφάλιον λεπτόφυλλον.

Filago minor.

Cotonaria minor.

Klein Schemelfraut.

Agris demessa segete, hortisq; oleraceis familiaris. Eiusdem cum priorī naturæ; sed mollicella tota & pusilla.

Gnaphalium virgatum.

Gnaphalium Anglicū vel Belgicū folio longiore, Lob.

Pseudoleontopodiū, Matt.

Groß Rhurfraut.

Prouenit in syluis cæduis, collibus aridis & secus itinera.

Nonnihil amaricat multum exiccans.

Gnapha-

*Gnaphalium minus
album.*

*Gnaphalium montanum
album, Aduers.*

Lagopus 2. Trag.

Weisse Katzenpfötlin/ *Sil.*

Weisse Engelblümlin.

Hasenpfötlin.

Aridis collibus & sterilibus apricis, Aprili & Maio floribus conspicuum.

Adstringit & exiccat gustu insulso,

Gnaphalium minus purpureum.

Pilosella minor, *Dod.*

Lagopus flore subpurpureo, *Trag.*

Rote Hasenpfötlin/ *Sil.*

Rote Engelblümlin.

Pueris notum, quorum osculis colludere solent.

*Gnaphalium minus
suaue rubens.*

*Gnaphalium montanum
suaue rubens, Aduers.*

Pilosella minor flore carneo, *Clus. P.*

Lagopus ex candido & rubeo aspersis colore, *Trag.*

Leibfarben Katzenpfötlin/ *Sil.*

Leibfarben Engelblümlin.

Vt plurimum hæc triplex

differentia coniunctim nascitur summum cespitem fibrillis perreptans.

Gramen Manna I.

Gramen Mannæ esculentum, Lob.

Gramen dactylon esculentum, Cas. B.

Gramen aculeatum Plinij I. Tabern.

Oryza minor, Cordi.

Oryza Boiémica.

Manngras/ Schwadengras.

Weisser Schwaden/ *Sil.*

Böhmischer Schwaden/ *Sil.*

Vliginosis & palustribus Silesiæ, maximè Boiémix, ubi & seritur.

Semen oryza candore & sapore.

Gramen Manna II.

Gramen Mannæ 2. Dodon.

Gramen Mannæ griseum sine aristis.

Oryza Silesiaca.

Entengras/ *Sil.*

Haschengras/ *Sil.*

Schlesischer grauer Schwaden.

Vberrimè luxuriat humidis & palustribus piscinis pratisq; humentibus.

Colligitur semen oblongum, fuscum, Iulio & Augusto ad

sto ad Ciborum delicias. Flosculi sunt Triticei purpureique.

Vis utrique inest urinas mouendi referandique obstructions internas, maxime radici & semini, quod & mediocriter adstringit & Oryzæ ferè qualitates habet.

Facilioris est digestionis quàm Milium aut Panicum siue Oryza. Non enim inflat ventrem, minusq; adstringit quàm Oryza.

Semen ex lacte seu pingui iure decoquitur edulium gratum ac suaue Silesijs, boni succi ac facilis digestionis.

Ex pingui iure decoctum, & illitum Mammæarum durities resoluit.

Gramen Manna clauatum.

Manna luxurians.

Schwaden Mütterlin.

Gehörnter Schwaden.

In palustribus ad Kaufungam.

Incuruatur semen veluti vnguiculæ Anium.

Gramen Manna III.

Manna barbata, cum aristis.

Bart Schwaden.

Iisdem prouenit locis: sed

rarius occurrit.

Semen paulò maius fuscum foliaceo folliculo includitur aristas habens oblongas.

Gramen Manna spurium.

Gramen Panici effigie 3. Lob.

Gramen Mannæ syluestre. Wilder Schwaden.

Passim secus itinera. Vfus neglecti.

Gramen Paniceum I.

Gramen Panici effigie simplici spica, Lob.

Gramen Dens canis, Io-han. Bauh.

Lolium 6. Trag.

Ἐλυμάχρωσις.

Hirshegras.

Jenichgras.

Oritur locis graminosis campestribus & secus itinera solo humidior.

Gramen Paniceum II.

Gramen Panici effigie aristis circumuallatum.

Gramen Paniceum multiplici spica.

Panicum syluestre, Martiol.

Panicum palustre, Dodon.

Ἐλυμος ἀρειος.

Hirshegras.

Wilder Hirsche.

M

In cam-

In campis & pratis humidioribus. Inter olera etiam hortis humidiorib. exurgit.

Exiccat, refrigerat, adstringit magis quam satiuū.

Semine, quod Augusto & Septembri maturefcit, deletantur Auiculæ.

Gramen sanguinarium I.

Gramen digitatum.

Bluttgras / fingergras.

Campis incultis.

Gramen sanguinarium II.

Ἰσχάμων, Theoph.

Δακτύλιος.

Ischæmon vulgare, Lob.

Gramen dactylon.

Sanguinaria.

Pes cornicis.

Bluttgras.

fingergras.

Braenfuß.

Arida & sterilia sequitur.

Subdulce est: siccantis & adstringentis naturæ.

Semen sanguinem sistit & omnibus alui profluuijs vtile.

Spicæ asperiusculæ conuolutæ naribus insertæ extraxq; sanguinem eliciunt.

Gramen medicatum I.

Gramen, Dod.

Gramen Canarium seu medicatum Officin. *Aduers.*

Gramen Caninum, seu Canarium i. *Tabern.*

Gramen verum officinar.

Ἀγροστὶς, Diosc. quasi agrestis, vel *πὰρὰ τὸν ἀγρὸν καὶ ἰσχυρὰ*, quod in agro consistat.

Tzwecken / *Sil.*

Queckengras / *S.*

Apotekergras.

Vberime in hortis & agris frumentarijs luxuriat, totos agros longè lateque perreptans, tam frugum quàm agrorum vitium ac pestis.

Pertinacis est vitæ & agrè intermoritur, facilè enim licet semiaridæ radices terrâ obrutæ reuirescunt.

Radix mediocriter est frigida & sicca, sapore dulcis instar aquæ, acre tamen quiddam exiguum ac subacribum obtinet, tenuis & exiguè incidentis substantiæ.

Aperit, attenuat, viscerū Renumq; sacculus expedit citra calefactionem, vrinam ciet & colluuiem calculosq; propellit & detergit, vulnera glutinat.

Decocta pota vermes puerorum enecat & excludit.

Ad eosdē vsus Liquor extrahitur per destillationem.

Gramen

Gramen medicatum I I.

Gramen geniculatum,
seu 3. Tabern.

Bnodengras.

In campis graminosis.

Gramen caninum I.

Gramen caninum supi-
num 2. Lob.

Gramen officinar. Nonn.

Bundesgras.

Liegend friechendes hunds-
gras.

In campis & agris ori-
tur cultis.

Gramen caninum II.

Gramen caninum 3. Ta-
bern.

Gramen geniculatum ca-
ninum marinum, Lobel.

Bnodecht Bundesgras.

Prope piscinas, vbi efflu-
unt aquæ.

Gramen floridum I.

Αγρωστὶς λεονάνθημος.

ἐλβετον.

Gramen floridum maius,
Tabern.

Gramen leucanthemon,
Mattiol.

Holostion, Ruell.

Euphrasia graminea.

Blumengras / Jungfraw-
gras.

Augentrost gras.

Passim in conuallibus mu-
scosis & humidis dumetis,
Maio & Iunio floret.

Refrigerat & siccatur. Ad
inflammatos & obscuros o-
culos adhibetur succus.

Gramen floridum I I.

Gramen floridum minus,
Tabern.

Gramen minus virgineū.

Diuersitas Holostij Ruel-
lij, Lob.

Klein Blumengras.

Minus est priore & folia
habet angustiora.

Gramen floridum I I I.

Καρδιόφυλλον.

Gramen Caryophylleum.

Caryophyllus holostius,

Lob.

Holostium caryophyl-
leum, Tabern.

Weis Vieglingras.

Hertzgras.

Hertz Köslingras.

Montosis gramineis col-
libus & marginibus Maio
lucet.

Siccatur cum mediocri ca-
lore.

Flores Cordiales sunt, in
palpitatione & alijs Cordis
affectibus vtilis.

Aqua infantulis fontico
morbo

morbo correptis exhibetur.

Gramen floridum IV.

Holostium Caryophyl-
leum aruense, *Tabern.*

Caryophyll⁹ aruensis vm-
bellatus folio glabro, *Cass.*
Bauh.

Weis Acker Neglingras.

Folia priori obtusiora,
breuiora, crassiora, latiora :
flosculi stellati candidi : se-
men teres, oblongum rubet,
folliculo molliusculo inclu-
sum. Nascitur in agris inter
segetes, Maio & Iunio flo-
sculos edit.

Tota planta amara est
maximè semen, quod in pau-
ca quantitate Secali permix-
tum, panem amarissimum
reddit.

Vulneraria est, aperit, ab-
stergit, glutinat.

Gramen pratense I.

Gramen pratense 1. *Dod.*

Gramen pratense maius
vulgare, *Aduers.*

Gramen vulgò cognitum
sive notum, *Trag.*

Gemein gras.

Wiesen Gras.

In pratis, hortis, campis,
nonnullis semitis gramino-
sis vulgatissimum. Maio flo-
ret, Iunio fert semen.

Semen in horreis è spicis
excussum vulgo notum ad
medicos vsus. *Heusahmen.*

Ad obstructiones visce-
rum, ad discussionem perti-
nacium humorum & flatuū
valet potum admotumque.
Nephriticum & Colicū do-
lorem fotu & infusu resoluit.

Gramen pratense II.

Gramen pratense 2. *Dod.*

Gramen minus.

Gramen 4. *Tabern.*

Klein gemein Gras.

Incultis, exuctis & ari-
dioribus agris montanis de-
lectatur.

Vt pabulo gratius & vti-
lius velleri : sic multò deli-
catius minus, & semine effi-
cacius est.

Gramen pratense III.

Gramen Rabinū, *Tabern.*

Gramen folijs Vetonicae
Caryophyllatae, *Aduers.*

Gramen Rauisum mon-
tanum.

Rabissgras.

Montosis vdis pratis.

Sagina & lactis vbertate
omnium laudatissimum.

Gramen pratense IV.

Gramen exile durius,
Lob.

Gramen

Gramen minus duriuscu-
lum, *Tabern.*

Klein Hartgras.

Passim fabulosis, ericetis
& squalidis aridioribusq; a-
gris occurrit.

Pabulum pecori & ouibus
gratum.

Gramen pratense V.

Gramen pratense 4. *Dod.*

Gramen Miliaceum, *Lob.*

Gramen Cenchroides.

Hirschgras.

In campis aridis, incultis.

Gramen pratense VI.

Gramen Leporinum, *Ta-
bern.*

Aegylops *Plin. Trag.*

Phalaris pratensis minor,
Aduers.

Gramen tremulum.

Sittergras / Sydern.

Glittern / Flemmel / *Sil.*

Glittergras / Hasenbrod.

Ich achte sein nicht.

Herbidis pratensibus Ma-
io & Iunio exurgit maius &
minus.

Gramen pratense VII.

Gramen lucidum, *Tabern.*

Gramen capitulo globoso,
Cass. Bauh.

Köblingras.

Pratis obuium.

Gramen pratense VIII.

Gramen pratense 5. *Dod.*

Gramen Sorghi effigie,
Lobel.

Gramen Dens canis 2. *Ioh.
Bauh.*

Sorg gras.

Iisdem natalitijs.

Gramen pratense IX.

Gramen spicatum folijs
Vetonicæ caryophyllatum
Lob.

Gramen caryophylleum
f. 23. *Tabern.*

Neglingras / Klein Spieß-
gras.

Vda amat pratorum loca.

Gramen segetale I.

Gramen segetale panicu-
latum *Tabern.*

Gramen segetum panicu-
la speciosa latiore *Lob.*

Ackerstrausgras.

Kornstrausgras.

Schmellen *Sil.*

Inter segetes campis cul-
tis Iulio paniculam purpu-
rascentem surrigit.

Gramen segetale II.

Gramen arundinaceum
aruense *Tabern.*

Agrorum venti spica *Lo-
bel.*

Gramen agrorum latiore

M 3

arun-

arundinacea comosa pan-
cula.

Acker Riedgras/ Straus-
gras.

Grosse Schmellen Sil.

Iunio in agris & pratis
nonnullis coma perspicitur.

Gramen Myosurinum.

Muhregos.

Cauda Muris Lob.

Cœcula marina Dod.

Gramen Cauda murina
dictum.

Neusegras.

Neusechwentlin.

In aruis nascitur agri
Vratislauiensis.

Gramen Alopecuri-
num I.

Gramen Alopecuroides Lob.

Fuchschwanz.

Taubgerste Sil.

Secus vias & margines a-
grorum notum.

Gramen Alopecuri-
num II.

Gramen Alopecuroides
minus Lobel.

Fuchschwanzgras.

Eadem vt prius occupat
loca.

Gramen Alopecuri-
num III.

Gramen Alopecuroides
minus 2. Lobel.

Kölblinggras.

Marginibus graminosis.

Gramen Alopecuri-
num IV.

Gramen Phalaroides Ta-
bern.

Wild Canariengras.

Prata & agros sequitur.

Gramen typhoides I.

Gramen typhinum I. Ta-
bern.

Gramen typhoides molle
maius Thal.

Kölblinggras/ Lieschgras.

In campis graminis &
pratis quibusdam.

Gramen typhoides II.

Gramen typhinum 2. Ta-
bern.

Gramen pratense 7. Dod.

Gramen typhoides aspe-
rum angustifolium C. B.

Gras Kölblin.

In pratis siccioribus & a-
gris incultis.

Gramen typhoides III.

Gramen typhinum 3. Ta-
bern.

Gramen typhoides mul-
tiplici spica C. B.

Liesch=

Lieschgras.

Humectis oritur locis.

Gramen typhoides IV.

Gramen τυφειδης asperum
maius Thal.

Rauch Kölblinggras.

Gros Raupengras.

In campis, ad margines
agrorum & secus vias pro-
uenit.

Gramen typhoides V.

Gramen τυφειδης asperum
minus Thal.

Klein Raupengras.

Locis iisdem.

Gramen Arundinace-
um I.

Gramen tomentosum &
acerosum Lobel.

Calamogrostis vel Arun-
dinaceum fortè Babylonium
Aduers.

Wasser Riedgras.

Pratis vdis & strigosis,
macilentis familiare.

Pabulum pecori ingra-
tum & perniciosum.

Gramen arundinace-
um II.

Gramen arundinaceum
maius Tabern.

Gros Riedgras.

In pratis humidioribus.

Gramen arundinace-
um III.

Gramen arundinaceum
paniculatum Tabern.

Gramen maius aquati-
cum Lobel.

Riedstrauchgras.

Rohrgras.

In palustribus vdis.

Gramen arundinace-
um IV.

Gramen harundinaceum
minus Tabern.

Carex acuta Virgilij.

Klein Riedgras.

Schwertelgras.

In fossis, pratis alijsq; hu-
midioribus locis.

Gramen arundinace-
um V.

Σχοινάλαμος.

Gramen arundinaceum
montanum Tabern.

Calamogrostis montana.

Bergried.

Bergschmelen.

Montium incola.

Gramen Cyperinum I.

Gramen Cyperinum pi-
losum Tabern.

Gramen exile hirsutum
Cyperoides Lobel.

Haarecht Cypergras.

Himela

Himelbrod/ Hasenbrod.

Hungerbrod. *sil.*

Vulgatissimum est, etiam
Pueris notum, in pratis, eri-
cetis & secus vias. Aprili flo-
ret.

Vrgente fame capitula
cum semine recenti, quod
subdulce, à pueris deuoran-
tur.

Gramen Cyperinum I I.

*Gramen Cyperoides Ta-
bern.*

Cypergras.

Wildgalgengras.

In pratis & conuallibus
herbidis humidis.

*Gramen Cyperi-
num I I I.*

*Gramen Cyprianum pa-
lustre Tabern.*

*Gramen palustre Cyper-
oides Lobel.*

Wasser Cypergras.

In vdis & squalidis mon-
tium pratis.

Gramen Cyperinum I V.

*Gramen Cyperoides a-
quaticum vulgatius Lobel.*

*Gramen Cyperinum ma-
ius Tabern.*

*PseudoCyperus ὀλιγόκλαρος
maior Thalij.*

Gros Wildgalgengras.

In palustribus vliginosis
montium vere floret.

Gramen Cyperinum V.

*Gramen Cyperinum pa-
lustre minus Taber.*

*Gramen Cyperoides par-
uum aquaticum Lob.*

*Pseudocyperus ὀλιγόκλαρος
minor Thal.*

Klein Wasser Cypergras.

In palustribus vt prius.

Gramen Cyperinum V I.

*Cyperus graminea seu
Miliacea Aduers.*

*PseudoCyperus seu Cy-
perus siluestris πολύκλαρος
Thalij.*

Geschoster Löchel Agri-
colis.

Cypergras / Hirschegras.

Humidis & vmbrosis
montium Iunio & Iulio co-
ma viget.

Gramen Cyperinum V I I.

*Gramen Cyperinum ne-
morosum.*

*Gramen Cyperinum syl-
uarum.*

Wald Cypergras.

In syluis humidioribus
graminosis locis.

Gramen aquaticum I.

Gramen palustre maius Lob.

ῥόδι-

Ἰσπύρεως.

Spies gras.

Vlginosis palustribus primo vere affurgit.

Gramen aquaticum II.

Gramen aquaticum spicatum Lobel.

Gramen fluuiatile album Tabern.

Briechend Spiesgras.

Weis flutgras.

In piscinis fluitat erectis paululum spicis.

Gramen aquaticum III.

Gramen palustre echinatum Lob.

Gramen nigroluteum.

Ἰγελstölblin gras.

Pratorum vclorum inquilina.

Gramen aquaticum IV.

Gramen fluuiatile Tabern.

Aquis innatans Lobel.

flutgras.

Ad ripas fluuiorum.

Gramen aquaticum V.

Gramen aquaticum geniculatum Tabern.

Wasser Knodengras.

Iisdem locis.

Gramen iunceum I.

Gramen iunceum I. Tab.

Gramen iunceum ὁλό-
κρον, Thal.

Ἰσπύρεως.

Bingengras.

Waldbiesgras.

In syluis humecto solo.

Gramen iunceum II.

Gramen iunceum Tabern.

Gramen iunceum ὁλόκρον Thal.

Gros wasser Bingengras.

In humectis & vdis pratensibus.

Gramen iunceum III.

Gramen aquaticum 2. Lob.

Gramen iunceum semine triangulari C. B.

Iuncus semine triangulo Ioh. Bauh.

Bingengras.

Vlginosos amat tractus.

Gramen iunceum IV.

Gramen iunceum 6. Tabern.

Gramen ὁλόκρον Thal.

Holostium Mattiol. Lobel.

Brötengras.

Pasim locis muscosis ac putridis, humentibusq; pratis.

Gramen iunceum V.

Gramen iunceum lanigerum Thal.

N

Gramen

Gramen eriophoron Dodon.

Iuncus bombycinus Advers.

Andrygosa.

Eriophorum.

Flachsgras.

Wiesenflachs / Al-

te Mägede } Sil.

Wiesenwolle / }

Vdis & riguis pratis Aprilis floret, Iunio & Iulio lanugo dependet candicans.

Adstringentis & obstruentis est natura. Ex vino decoctum torminibus ventris confert, pabulum pecori valde perniciosum.

Gramen iunceum VI.

Gramen 9. Dod.

Apricis & aridis, tenui & macro solo, Iunio & Iulio spica emicat.

Gramen syluaticum I.

Gramen hirsutum nemorosum, Lobel.

Gramen syluaticum 4. Tabern.

Gramen Luzula dictum, Joh. Bauh.

Haarechtig waldgras.

Buschgras.

Montosis & opacis syluis Maio & Iunio comâ sparsa viget.

Semen adstrictoria est facultatis & siccantis.

Gramen syluaticum II.

Gramen Auenaceum, Tab.

Gramen montanum Auenæ simile, Clus. P.

Haber Waldgras.

In syluis opacis montium Maio floret, semen Iunio & Iulio maturescit.

Gramen syluaticum III.

Gramen syluaticum sem. 3. nemorosum, Tabern.

Waldgras.

Buschgras.

Gramen syluaticum IV.

Gramen syluaticum 3. Tabern.

Ander Waldgras.

Iunio in syluis occurrit.

Gramen syluaticum V.

Gramen montanum Miliaceum.

Gros Wald hirsche gras.

Ad trium cubitorum altitudinē assurgit calamus paniculâ sparsâ miliacea. Nasceitur vmbrosis montium syluis.

Gramen sparteum I.

Spartum Plin. Lobel.

Spartum herba, Dod.

Gra-

Gramen sparteum maius.

Gros Pfriemen gras.

In agris & apricis collib⁹.

Gramen sparteum II.

Gramen minimum, *Lug-*
dunens.

Spartum nostras paruum,
Lobel.

Gramen sparteum minus.

Klein Pfriemengras.

Sterilib. & apricis oritur.

Gramen sparteum III.

Spartum 3. *Clus.*

Spartum Plinij 3. *Tabern.*

Helm/ Helmfrut.

In aggeribus & tumulis.

Gramen sparteum IV.

Gramen sparteum, *Tabern.*

Iuncispartium, *Dod.*

Pfriemengras.

Gramen sparteum V.

Gramen sparteum 2. *Tab.*

Gramen Schoenanthinum.

Bingengras.

Gratiola.

Gratiola recentior. *Aduers.*

Limnesium seu Centau-
roides, *Cordi.*

Sesamoides, *Gesner.*

Eupatorium Mesues, *Nonn.*

Tertionaria.

Erdgalle/ *St.*

Niesefraut.

Gotteshülfe.

Wild Durin.

In paludibus exiccatis ad
Quissum fluuiū abundè cre-
scit infra Neumburgam Cœ-
nobium.

Tota est amari & ingra-
tissimi gustus, quodammo-
do adstringens. Excalefacit,
siccat, attenuat, aperit, deij-
cit, abstergit.

Iecur & Lienem expurgat
& ab obstructione liberat,
ventris lumbricos pellit, pu-
tredinibus aduersatur.

Aduersus diutinos Co-
xendicum dolores, febres
inueteratas, Tertianas erra-
ticas feliciter vsurpatur vul-
gi noto experimento.

Vulnera celeriter glutinat.
Extractum Gratiolæ omnia
feliciter præstat & minima
in dosi.

*Gratiola minor ru-
bentifloræ.*

Gratiola minor, *Gesn.*

Hyssopoides, *Thaly.*

Anagallis aquatica, *Mon-
spel.*

Halimus palustris, *Alijs.*

Wilder Eisp/ Wasser Eis-
sewig.

E radice alba, tenui, digi-
tum longa, fibrosa Colicu-

N 2 lus

lus nascitur virgatus (interdum plures) cubitum ferè altus, in varios ramulos, qui partim humi incumbunt, partim eriguntur, diuisus. Folia ei Hyssopi ferè angustiora & breuiora, splendentia, masticando lentore linguam illinentia, saporis aliquantum nitrosi, omnis odoris expertia. Flosculi ex sex foliolis rubentes secundum singula folia ab imo ad summum, Augusto, Septembri & Octobri exeunt, quibus interim succedunt theculae oblongae foliaceae Centaurei minoris, semen minutissimum subfuscum Maioranæ claudentes.

Humidis & vdis pagorum frequens.

Folia sicca Centaurei minoris ferè amara sunt.

Aperit, abstergit, incidit, glutinat.

Vulneraria est & Scorburi medela.

Hedera baccifera.

K^{arst} Diosc. à textura porosa & spiraculis innumeris ferè peruia.

Hedera maior siue arborea, *Mattiol.*

Hedera arborea, *Trag.*

Hedera maior nigra, *Dod.*
Hedera corymbosa communis, *Lob.*

Gros Ephew.

Baumwinde.

Nawer Ewidh/*Sil.*

Nascitur in montibus circa parietes, arbores & muros ædificiorum.

Flores Autumno promit glomerofos, muscosos, pallescentes, corymbos nigros post se relinquentes.

Ex contrarijs constat facultatibus, terrena frigida, calida & aquea tepida.

Folia recentia in pilei formam confuta papulosis exulceratisq; infantium capitibus vtiliter imponuntur.

Ad ulcerationes igne factas, Herpetas & Erysipelata valent.

Cum vino cocta grandia vulnera coniungunt, & maligna sanant.

Hodie fontanellis adhibentur. Humores enim & Ichores ad eas partes allciunt: inflammationes verò ab iisdem arcent recenter decerpta.

Succus putrida Narium vlcera emendat. Acinorum tritorum puluis 3j. pondere ex vino haustus calculum expellit.

Hedera

Hedera minor reptans.

Κισός ἑλιξ, Diosc.

ἑλγεις κισός.

Hedera helix, Mattiol.

Hedera helix siue prouoluta seu sterilis, Aduersf.

Briedhender Ewich.

Bleiner Ephew.

Palsim syluarum opaca, arida & saxosa perreptat.

Iisdem constat viribus sed inefficacioribus.

Hedera terrestris maior.

Κισός χερσῶος.

χαμᾶκισός, Diosc.

Gunderman.

Gundelrāb.

Grundrāben.

Gaudet opacis circa semitas, vrbium muros & hortorum margines.

Odore tora est grauiusculo, sapore amaro, mediocriter acris. Aperit, abstergit, vrinam pellit, calculū frangit. Expurgat pectus & vterum, Mensesq; tardius fluentes prouocat, Pestilentia aduersatur & Morbum regium expellit.

Herba ex vino cocta fotu furditatem & tinnitum aurium aufert.

Cataplasmate sinistri lateris Lienis tumores resoluit.

Additur in fessib. ad Menstrua prouocanda & calculū.

Vulneraria est: ideo efficaciter potionibus, quæ ad viscerum internorum vulnera parantur, additur.

Hedera terrestris minor.

Chamæcissus minor, Matt.

Hedera terrestris verna.

Blein Gunderman.

Locis humectis ad arbores & vrbium mænia.

Minor est. Primo vere flosculi eleganter cœrulei apparent.

Eiusdem cū vulgari vsus.

Hedera terrestris montana.

Hederæ terrestris species montana, Mattiol.

Berg Gunderman.

Folijs maioribus & flosculis purpureis opacas montium syluas perreptat.

Valentior est vulgari, quod sapor & odor validiores testantur.

Hedera palustris.

Hedera palustris, Tabern.

Hederula aquatica.

Trinitas aquatica, Quorundam.

Wasser Ewich.

In palustribus.

*Helenium.**Ἑλένιον, Dioscor.*Panax chironium folio
Lapathi Theoph. Dodon.Panax chironium, Anguil-
lara.

Enula campana, Officin.

Inula.

Alantwurtz.

Oltwurtz.

Amat vliginosa hortorum
& prædiorum loca, vulgata
notitiæ. Iulio floret.Radix eruitur Vere & Au-
tumno. Odorata est, subacris
& amara. Calefac. & sicc. 2.
recessu, cum excrementitia
humiditate.Aperit, incidit, abstergit,
prouocat, concoquit. Cras-
sos & lentos humores Tho-
racis attenuat, & excreatu
faciles reddit. Eapropter
Asthmaticis, Orthopnoi-
cis, tussientibus utilis.Ventriculum roborat fri-
gidum, & concoctionem
promouet. Cordi familiaris:
Venenis resistit: facit ad E-
pidemios morbos. Aduersus
aëris pestilentem noxam va-
let plurimum, quo nomine
etiam cruda a multis man-
ditur.*Helleborus albus.**Ἑλέβορος λευκὸς Diosc.*Helleborus albus flore
subniridi.Helleborus albus mas Ta-
bern.

Veratrum album Dodon.

Weisse Wiesewurtz.

Wendewurtz.

Soltocken.

Huius feracissima sunt v-
da montium Suditorum iu-
ga, præsertim quæ frigida,
cella & pratensia. Iulio flo-
ret.Leguntur radices Maio &
Autumno.Rusticis nota & familiaris
medicina, qua indifferenter
contra omnis generis inter-
nos affectus, maxime ventri-
culi & philtia, vtuntur cum
vitæ saepe detrimento. Ven-
triculum enim subuertit,
Singultus & Conuulsiones
excitat.Calefacit & siccit, exter-
git, vomitu & purgatione
varios extrahit humores,
sternutamenta violenter
mouet.Prisci propinabant comi-
tialibus, Resolutis, Hydropi-
cis, Elephantiscisq;: sed eius
vſus apud Lectiores hodie
exoleuit.In lixiuio decoct. Pedicu-
los

los & Lentas interimit, cum lacte Muscas perdit.

Radix vino Maluatico solibus æstiuis exponitur: de quo cochleare N^o. j. sumtū, vomitum mouet, nec admodum affligit.

Helleborus niger vulgaris.

Helleborus niger hortensis flore viridi C. B.

Helleborum 2. Mattioli.

Helleborastrum Aduersar.

Veratrum nigrum 2. Dodon.

Christwurtz.

Schwarzwurtz.

Floret hyeme post Christi natalitia, vnde ei nomen.

Passim sponte luxuriat in hortis.

Radix vehementer amara est & acris nonnihil. Calefacit & siccatur.

Purgat perinde atq; genuinus per vomitum & inferiorem ventrem, pituitam & bilem vtramque ducens. Quartanarijs, Melancholicis, Cholica diuexatis vtilissima: sed nonnisi robustioribus & validis naturis propinanda.

Corrigitur Aniso, fœniculo, Macere.

In defectu Hellebori nigri veri commodè substituitur.

Helleborus niger Boeoticus.

Helleborus niger ferulaceus.

Helleborastrum nigrum Gesn.

Helleborus Hippoc. Tabern.

PseudoHelleborus Mattioli.

Bupthalmum Clus. P.

Vermeinte schwarze Wiesewurtz.

Böhmische Christwurtz.

Vbertim circa Limburgum collibus apricis & siccioribus luxuriat. Aprilis fine & Maio flores lutei e terra gliscunt.

Radix amara commendatur ad Pulmoniam Pestilentiamq; arcendam.

Quidam pharmacopolæ Hellebori loco vtuntur.

Hepatica nobilis.

Hepaticum trifolium Lobel.

Hepatica aurea flore cæruleo Tabern.

Trinitas seu nobilis Hepatica Mattioli.

Epimedium Cordi.

Blawe Mertzblümlin.

Edel Leberfraut.

Gulden

Gulden Leberkraut.
 Blaw Leberblümlein.
 Schwarzblatterkraut.
 Umbrosis montium syluis
 & nemoribus Martio & A-
 prili cum flore passim lucet,
 succrescentibus tandem fo-
 lijs.

Amaricat, adstringit,
 nonnihil siccatur.

Hepar roborat, Renibus
 & Vesicæ conducit.

Vulneraria est; ad exul-
 cerationes Intestinorum &
 Enterocelas mirificè præ-
 stat.

Folia pustulis nigrican-
 tibus vtiliter admouentur.

Flore aliquando rubente
 & albo variat.

Hepatica fontana.

Alex. & Dioscor.

Lichen Dod.

Lichen Hepatica Lob.

Iecoraria f. Hepatica fon-
 tana.

Lichen petraeus siue saxa-
 tilis.

Brunnen Leberkraut.

Stein Leberkraut.

Steinflechten.

Leber Moos.

Asperginosa & rorida
 montium saxa amplectitur,
 Maio & Iunio stellata capi-
 tula attollit.

Refrigerat, siccatur, adstringit paulatim & abstergit.

Magna cum Hepate co-
 gnationis, ad cuius affectus
 maximopere commenda-
 tur.

Adversus Iecoris inflam-
 mationes, calores, febres a-
 curas & Tertianas ex bile
 ortas efficax habetur. San-
 guinem sistit, inflammatio-
 nem arcet.

Hepatica pratensis alba.

Gramen Parnassi Recen-
 tior.

Pyrola pratensis.

Flos Hepaticus.

Kapfharbros.

Weisse Hertzblümlein.

Weisse Leberblümlein.

Perquam vulgata est in
 pratis & pascuis vdis monti-
 um. Augusto & Septembri
 floret, Autumni nuncia.

Tota herba subamara est,
 leniter acris & modicè ad-
 stringit.

Peculiari facultate imbe-
 cillum Iecur roborat, obstru-
 ctum aperit.

In dysenteria & diarrhoea
 vtiliter vsurpatur, maximè
 verò ad potiones vulnerari-
 as & vulnera.

Vulgus ad Cordiales affe-
 ctus pradicat.

Hernia-

Herniaria.

Herba Turca siue Herniaria multigrana Serpylli facie *Aduersar.*

Herba *Hollerij.*

Polygonum minus *Mattiol.*

Empetron *Cordi.*

Herniola *Ital.*

Barnfraut / Bruchfraut.

Tausentkern / Bernlinfraut.

Hendlinweis / Blatlos.

Jungfrawtrost / Stopsloch.

In aruis sabulosis montium plusquam notissima.

Calefacit, siccit, abstergit, conglutinat, vrinas ciet, calculos frangit Renum & Vesicæ, Hepatis obstructions & Ictericam sanat octiduo pota.

Ad viperea item maleficia venenataque cætera tum foris tum intus laudatur.

Succus expressus subinde affuso vino albo certissimum & aliquoties probatum remedium contra Intestini prolapsum. Idem puluis pluribus diebus ex vino haustus operatur.

Infantibus herniosis *Aqua stillaticia* commodissime propinatur.

Hieracium I.

ἱεράκιον μέγα *Diosc.* *ἱεράκιον*. Accipitres enim eius lacteo liquore Oculorum acies acuere existimantur.

Hieracium maius *Fuch.* *Lob.*

Accipitrina maior.

Herba Hieracia.

Lactuca Accipitrina.

Gros Habichsfrant.

Geel Sonnenwirbel.

Wilde geele Meyenblumen *Sil.*

Agrorum marginibus & pratis siccioribus frequens.

Floret Iunio & Iulio.

Omne est è genere Sonchi, lacte turget non secus ac Lactuca & Sonchus.

Refrigerat, siccit, adstringit, abstergit, aperit, mordicat.

Stomachum purgat, inflationes discutit, ructus lenes facit, concoctiones adiuvat, somnum conciliat, venerem inhibet, vrinæ difficultati succurrit.

Ad ambusta cum sale recens illitum præstat. Eruptiones papularum ex vino & polenta abstergit.

Succus Oculorum sanat vitia. Ad nebulas, caligines & Epiphoras utilis.

O

Hierac.

Hieracium II.

ἱεράκιον μικρόν.

Blein Babichfraut.

Pratis montosis macris familiare.

In gustu paulò maiorem amaritudinem habet.

Hieracium III.

Hieracium præmorsum.

Hieracium minus præmorsa radice Aduers.

Lactuca Leporum.

Basen Lattich.

Abbis Sil.

Agros quærit incultos.

Hieracium IV.

Hieracium nigrum Tabern.

Schwartz Babichfraut.

Iulio & Augusto in agris quiescentibus.

Hieracium V.

ἱεράκιον Theoph.

Hieracium Aphacoides seu V. Tabern.

Hedypnois Dod.

Cichorium luteum 2. C. B.

Geel Sonnenwirbel.

Marginibus delectatur graminosis, agrisq; incultis montosis.

Hieracium VI.

Hieracium folijs & facie Chondrilla.

Hieracium maius hirsutius.

Pratorum alumna.

Hieracium VII.

Hieracium macrorrhizon seu 2. Tabern.

Hieracium longius radicatum Lobel.

Babichfraut mit langen wurzeln. Ibidem.

Hieracium VIII.

Hieracium Intybaceum.

Wegwarten Babichfraut.

Agris incultis.

Hieracium IX.

Hieracium montanū latifolium, Tabern.

Hieracium 5. Clus. P.

Breitblettericht Babichfraut.

Apricis & aridioribus agri Hirsbergensis collibus, ubi Iulio floret.

Hieracium X.

Hieracium montanū angustifolium, seu 15. Tabern.

Hieracium Sabaudum.

Berg Babichfraut.

Passim in Ericetis ad sylvarum margines occurrit.

Hieracium

Hieracium XI.

Hieracium alpinum latifolium sinuato folio.

Hieracium latifolium seu montanum 2. seu 13. *Tabern.*

Gros Berg Sabichfraut.

Humidis alpinis tractibus inter ceteras herbas ad riuulos frequens.

Hieracium XII.

Hieracium lanuginosum.

Hieracium polycephalon alpinum.

Hieracium montanum 6. *Cl. P.*

Hieracium montanum angustifolium 2. *Tabern.*

Hieracium Draconites.

Drachenwurz.

Saumwurz.

Raumwurz.

Radix longissima, pollice crassior, exterius nigricans, in fena, septena & plura quandoque capita protuberat, Draconem multis capitibus representans. Folia habet oblonga, angusta, incana: florem ex luteo pallentem Hieracij. Pratis altioribus & siccioribus montium familiaris, Rhizotomis notum.

Amarissima est radix, plurimo turgens lacte. Calefac. sicc. vehementer abstergit.

Ad pecorum vermes encandos vulgo nota medicina.

Mures maiores domesticos fugare in ea loca ubi versari solent. Herbam cum toto coniectam, Rustica gens affirmare audet.

Hieracium XIII.

Hieracium maculosum.

Flecken Sabichfraut.

Folia Hieracij, ut Pulmonaria maculosa. Radix succo pus apprimè representante prægna.

In monticulo D. Georgij ad Stregomium. Vulneraria est, amara, abstergit, & vlcera curatu difficilia ad sanitatem perducit.

Hieracium XIV.

Hieracium vulnerarium.

Virga aurea, *Ioh. Iac. VVeckeri.*

Heidnisch wundfraut.

Wund Sabichfraut.

Passim in montosis sterilibus ad sylvarum margines occurrit.

Vulnera recentia sanat. Potionibus vulnerarijs addebat, *Ioh. Iac. VVeckerus.*

Hieracium XV.

Hieracium porcellinum.

O 2

Hypo-

Hypochæris, *Tabern.*

Porcellia, *Gazæ.*

ὑποχαιρίς.

Gercklinfraut.

Apricis & aridis.

Refrigerat, siccatur, aperit
cum gustu amariuscule.

Hieracium XV I.

Hieracium minimum seu
porcellinum minus.

Hieracium 8. *Clus. P.*

Hyoseris, *Tabern.*

ἡσέρης latifolia,

angustifolia.

Blein Gercklinfraut.

Inter segetes æditioribus
locis, solo arenoso Iulio &
Augusto nascitur.

Hordeum murinum.

ῥορνί, *Diosc.*

Hordeum murinum vel
Lolium rubrum, *Aduers.*

Phœnix seu Lolium ru-
brum, *Dodon.*

Mensgerste.

Fürsthaber.

ῥόρνε / ῥόρνεγρας / *Sil.*

In campis, arcibus hortorum,
ageribus nihil frequentius:
etiam Lini vitium, quod à mu-
lierculis diligenter eruitur.

Vi pollet refrigerandi, sic-
candi & sistendi.

Ex vino austero potum

omnis generis alui fluxus
compescit.

Horminum sylvestre I.

ὀρμινον ἀγρουν.

Horminum sylvestre Mat-
tiol. *Lobel.*

Horminum sylv. 2. prima
species, *Cl. P.*

Scarlea sylvestris, *Tabern.*

Wilder Scharlach.

Wilde Salbey.

Campestris prætæ; ma-
cilentia sectatur.

Flores cœrulei Scarleam
redolent.

Viribus magis valet quàm
fatium.

Horminum sylvestre II.

Horminum murale Sle-
siacum.

Horminum sylvestre lati-
folium 2. *Cl. P.*

Wilder Mauer Scharlach.

Ad mœnia Gryphibergæ
Iunio floret. Alibi minus
notum.

Folia nigricant, lanugi-
nosa, odore Hormini.

Hyoscyamus niger.

ὑποκύαμος μέλας, *Diosc.*

Hyoscyamus flavus, *Fuchs.*

Hyoscyamus niger seu A-
pollinaris herba, *Aduers.*

Bilsentraut.

Binsens

Binselfraut / Sil.

Sewfraut.

Sewbohnenn.

Zigeunerfraut.

Circa loca habitata & cul-
ta nullibi non obuim.

Aestiuus mensibus & in
multum vsq; Autumnū flo-
ret: semen interea perficitur.

Grauis odoris ac ingrati
tota stirps est, caput aggra-
uans ac somnolentiam in-
ducens.

Frigidam & humidam for-
titur naturam, Venenosā &
deleteriae facultatis.

Semen fotu dentium do-
lores mulcet.

Oleum ex herbae folijs in
aetili circa solstitium in ter-
ram reposito paratum, ad in-
flammationes & calidas po-
dagras commendatur.

Hypericum verum.

Ἰππεύριον Diosc. ab ἵππεϊν ἰνδῶν
quod culmen altius tollat.

Perforata.

Chamaepitys.

Fuga Daemonum.

S. Johannisfraut.

S. Johannisblut.

Jagereussel.

Wildgartheil / Sil.

Vbique vulgatissimum,
margines satorum, agros
macilentos, incultos occu-

pans. Aestate flosculos edit.

Tenuis est essentia, cale-
faciens & siccans. Aperit, re-
soluit, agglutinat, Menfes &
vrinas prouocat, Calculum
frangit, venenis aduersatur.

Medetur ruptis, conuul-
sis, ambutis.

Herba deuorata haustaq;
tum vulnere illita venenoso-
rum moribus resistit.

Miscetur infestsibus & de-
coctis ad articulorum & ma-
trici affectus.

Superstitiosum est & ho-
mine Christiano indignum
hoc abuti ad Dæmones a-
liosque malos spiritus fu-
gandos.

Hypericum reptans.

Hypericon minus, Dodon.

Hypericon minimum su-
pinum Septentrionaliū, Lob.

Ruta syluestris Diosc. Nonn.

Klein.

Klein Wild Gartheil.

Schön klein S. Johannis
blümlin.

Erdkyserlin.

In agris reptat fragmenta-
rijs, quo tempore à ferendis
frugibus conquiescunt.

Integra floret æstate.

Tritum resinaceum spirat
odorem. Gustu amaricat. Ad
vulnera efficacius vulgari.

O 3

Hyper-

Hypericum Androsamon.

Ἀνδρσαμων Diosc. *Aduers.*
quasi *ἀνδρὸς ἀμα.*

Ruta sylvestris hypericoides, Dod.

Ruta sylvestris Diosc. *Cass.*
Bauh.

Hyperici genus in dumetis nascens, *Trag.*

CunradisFraut.

Opacis & syluosis quibuscum oritur locis.

Flores triti sanguine fundunt.

Folia extergunt & desiccant, urinam & menstrua cient.

Hæmoptoicis ex alto de lapsis & viscerum exulcerationibus summitates utiliter exhibentur.

Hypericum Ascyron.

Ἀσχυρον Diosc. quasi *ἀσθενός* sine scabritie. Rotundum enim glabrumque caulem habet.

Ascyrum, Recentioribus.

Hypericum ἀσχυρον.

Barthow/Waldhoff.

Grundheil / Wildgarheil / Sil.

Agris incultis, pratis siccioribus & aggeribus secus itinera multum.

Folia latiora sunt, non perforata.

Ex vino austero magna vulnera glutinat. Additur Balneis ad sudores eliciendos.

Iacea nigra vulgarior.

Ἀφύλλανθες, quasi *ἀφύλλος* *ἀνθος.*

Iacea nigra seu *Aphyllantes*, Dod.

Sanicula rupturarum.

Schwarz flossblum.

Bruch Samfel.

Iuxta sepimenta agrorum, pratisque macilentis fruticat, Iunio & Iulio floret. Calida est & sicca cum adstringendi vi. Commendatur ad faucium, tonsillarum vixque tumores.

Ad Hernias & vulnera ventilis.

Iacea collina maior dissectis folijs.

Iacea nigra montana squaroso capite. Centaurium collinum maius, *Cass. B.*

Centauroides maior.

Grosse braune Scabiosen.

Grosse flossblum.

Wilde Scabiosen.

Knopffwurtz / rote Bornblumen.

Inter

Inter segetes arenoso solo, & secus itinera, in territorio Hirsbergenfi.

Flores Iulio ostendit Centaurei maioris.

Iacea collina minor leptophyllos.

Centaurium collinū minus, Ioh. Bauh.

Iacea nigra vulgatio angustifolia.

Centauroides minor.

Kleine zart bletterichte flockblum.

Iulio & Augusto cum flore fruticat in aggeribus secus vias regias.

Iacea montana villosa capite.

Iacea montana nigra villosa capitulo.

Gehempte flockblum.

In pratis Riphæorū montium nascitur.

Iris.

Ἴρις seu Iris Diof. ab irrundo, quod ignea vi & feruido gustu in linguā irruat.

Iris seu Erysimum Diof. Lobel.

Erysimum i. Tabern.

Verbena recta seu mas, Fuchf.

Verbena femina putata. Creutzfrant.

Eisenfrant weiblin.

Wegesenff/ Wilder Senff.

Iuxta vrbes in ædificiorum areis & cœmeterijs neglecta planta.

Calidæ & tenuis, incidentis ac cum humiditate abstergentis substantiæ.

Arteriacum laudatissimum. Asthmaticis & farctui Pulmonum vociq; rauca etiam diurnæ aded est præfenti remedio, vt fidem ferme superet.

Bibitur aduersus venena mortifera.

Isatis sylvestris, Vaccaria dicta.

Isatis sylvestris Ocymastri caliculo, flore exiguo pallido Aduers.

Vaccaria rubra Lugdun.

Perfoliata rubra Gesu.

Wild Weid.

Rühfrant.

Chartenfer blumen.

Lato & restibili solo inter segetes prouenit.

A solstitio æstiuo in Autumnum vsq; floret, & interea semen perficitur.

Nullius adhuc comperti vsus.

Juncus

Iuncus vulgaris levis
Herbar.

χοῖνος λεῖα Diosc.

Iuncus Mattioli.

Iuncus levis § sparsa
panícula § glomerata.

Glatte Bintzen.

Sembden / Sympsen. sil.

Pratis vdis deterioribus
nihil viuidius familiariusue
iunco hoc.

Iunci recentes in cubicu-
lum sparsi Aërem tempe-
rant & sensim frigidos vapo-
res ad Caput submittunt,
quibus somnolentos effi-
ciunt.

Semen vltum, ex vino
styptico potum aluum sistit
& rubra feminarum proflu-
ua: vrinam ciet, sed capitis
dolorem facit.

Medulla ad ellychnia &
turundas expetitur.

Iuncus vulgaris acutior
sive mas.

ὀξύχοῖνος Diosc.

χοῖνος ἀκρότερος.

Iuncus acutus, acumina-
tus.

Iuncus sterilis.

Spitzige Sembden.

Gemeine scharffe Bintzen.

Eadem occupat loca.

Iuncus sylvaticus.

Wald Bintzen.

Wald Sembden.

In syluis vdis.

Iuncus acutus minimus.

καμάχοῖνος ὀξύς.

Kleine spitzige Sembden.

In pratis vliginosis radi-
cula oblonga serpendo sese
propagat.

*Iuncus minimus lan-
ceatus.*

Iuncus spicatus.

Spies Bintzen.

Spies Sembden.

Minimus est & in summo
capitulum gerit hastæ instar.

*Iuncus palustris ma-
ximus.*

ὄλβοχοῖνος Diosc.

Iuncus aquaticus maxi-
mus Lob.

Iuncus palustris maior
Tabern.

Iuncus laevis aquaticus
maximus Thal.

Grosse Weiher Bintzen.

See Sembden / Pferd
Bintzen.

Stagnosis & palustribus
piscinisq; latatur.

Constat ex terrena essen-
tia leuiter frigida & aquea.

Aluum

Aluum fistit & crebra femi-
narum profluua.

Ad triclinia insternenda
perquam notus.

Iuncus palustris minor.

• Iuncus aquaticus minor
capitulis Equiseti Lobel.

Iuncus clauatus Dalechamp.

Iuncus cum capitulis lon-
gis I. B.

Kleine Weiher Birtzen.

Proximè dicto leuore si-
milis, sed minor; tenuior,
breuior: Piscinarum alum-
nus. Medulla candida fun-
gosaq; refertus est ad nexus
vtilis.

*Iuncus palustris flo-
ridus.*

Ζιφθρονος.

Gladiolus aquatilis Do-
don.

Iuncus Cyperinus flori-
dus Tabern.

Birtzenschwertel.

Blühende Birtzen.

In lacunis torpidis circa
Vratislauiam flores fert ex
purpura candore dilutos Iu-
lio, Augusto.

Creditur ea præstare, quæ
cæteri.

Juniperus arborescens.

Αἰξουθία, Diosc.

Juniperus baccifera, quod
iuniores & nouellos fructus
pariat.

Weckholder / Wacholder-
strauch.

Jachandel Baum. sil.

Apricis, aridis, desertis,
incultis montibus & colli-
bus nota.

Sola fructus in biennium
retinet: Nostra lachrymam
non gignit.

Bacca Iuniperi.

Grana Turdorum.

Αἰξουθία.

Jachandelbeeren.

Brametbeeren.

Colliguntur Octobri: in
hyeme sunt Turdorum ci-
bus.

Laudantur nigra, rotun-
da, in mandendo dulces,
subamaræ. Calefac. 3. sic-
cant 1. gradu. Adstringunt
modicè, Stomacho vtilis.
Contra pectoris vitia, Tus-
sim veterem & difficilem
Puerorum, Inflationes, tor-
mina, Febres pestilentia-
les efficacissimè bibuntur,
Iecur, Renes expurgant,
crassos glutinososq; humo-
res extenuant, Menses mo-
uent. Ruptis, conuulsis &
vulua strangulatui subueni-
unt, sed caput tentant.

P

Salu-

Salubribus medicamentis
& Antidotis miscetur.

Ex his *Mel* conficitur *Iuni-*
perinum, quod Mellis con-
sistentiam habet, ad prædi-
ctos vsus efficacissimum.

Oleum ex baccis arte chy-
mica extractum calidæ est &
siccæ naturæ. Contra Calcu-
lum & pestis contagia ma-
gnæ commendationis.

Lignum spontè arefactum
accensum suauissimè olet,
aërem purgat Pestis tempo-
re, serpentes & venenata
fugat.

Ex ligno etiam omnis ge-
neris pocula torno artificia-
liter excuantur: item pila
rotundæ foraminibus per-
tusæ, quibus Pomambræ vel
spongiolæ liquoribus approp-
riatis imbutæ includuntur
& aduersus pestem collo vel
manibus gestantur.

Iuniperus alpina fruti-
cans.

Iuniperus minor alpinus.
Bergwachholder.

Wilder Sadelbaum sil.

Nonnisi altissimis monti-
bus nota, veluti in Iseræ pra-
to ad giganteum, ad fontes
Albis & alijs locis inter Pi-
ceas pumilas & Pinaestros à
niue depressos, qui nun-

quam Arboris altitudinem
acquirunt, sed humi ramulis
reptantes tandem arescunt.
Vulgo *Das Knickholz.*

Baccæ autumnò maturef-
cunt, oblongæ ex cœruleo
nigræ.

Folia vulgari minus pun-
gunt, trita grauius Sabinam
ferè spirant.

Calidæ & siccæ naturæ.
Menstrua vehementer pel-
lit. Eisdem ferè cum Sabina
effectus obtinet.

Lactuca sylvarum pur-
purea.

Lactuca agrestis, *Lobel.*

Lactuca sylu. purpurea
Gesn.

Lactuca sylu. *ego Spachauer*
Thal.

Sonchus z. Cl.P.

Waldlattich.

Berglattich.

Dürrehenne sil.

Plurima in montium Su-
ditorum saltibus nemorosis
ad duorum cubitorum alti-
tudinem assurgit.

Planta tota lactea est, sa-
pore moderatè dulci, tan-
dem ad amaritudinem ali-
quam leniter declinante,
quam subsequuntur postre-
mò adstrictio & exiccatio.

Pabu-

Pabulum iumentis gra-
tum.

Lactuca sylvarum lutea.

*Lactuca sylvestris muro-
rum.*

Chondrilla lutea 1. *Dodon.*

*Sonchus lauis syluaticus
luteus.*

Sonchus 2. folio profun-
dis lacinijs sinuato hedera-
ceo *Lobel.*

Hasenlattich.

Wald geel Sonchenfraut.

Wald Genscköl.

In syluis, petrosis locis, &
ad muros nascitur. Aestate
flore.

Lagopus campestris.

Λαγώπης *Diosc.*

Lagopus genuinus Anti-
quorum, *Aduers.*

Trifolium leporinum.

*Trifolium spicatum hu-
mile.*

Hasenflée.

Hasenpförlin.

Bäzlinfraut *sil.*

Inter segetes in aruis Iu-
lio & Augusto frequens.

Siccandi & adstringendi
vi pollet.

Alui & seminis profluui-
o laborantibus mirum præstat
auxilium potum.

Tumoribus Inguinum &
laxis Hernijs cohibendis
peroptimus.

Lagopus montanus maior.

Lagopus maior 2. *Dod.*

*Trifolium montanum
maius* *Thal.*

Cytisus *Trag.*

Geißflée.

Gros Hasenflée.

Montosis & syluis cæduis
nascitur.

Omnes partes desiccant
& adstringunt.

Lagopus montanus minor.

*Trifolium montanum mi-
nus* *Thal.*

Kleiner Geißflée.

Iuxta agrorum & viarum
margines.

*Lamium purpureum vul-
gatum.*

Γαλιόψις *Diosc.*

Vrtica fœrens purpurea
Lobel.

Galeopsis siue *Vrtica mor-
tua* *Mattiol.*

Vrtica labeo.

Taubnessel.

Binsauge.

Stinckende Nessel.

In ædificiorum areis, pla-
teis, & circa hortorum sepes.
Tota æstate flore.

Fœtidi est & grauis odor. Eius calorem & siccitatem sapor arguit.

Eius folia durities, strumas & carcinomata discutunt: ad putrescentia vlcera, gangrenam & nomas vtiliter cum sale illinuntur.

Lamium purpureum minus.

Morsus gallinæ folio Hederulæ 2. Lobel.

Ballote crispa Lugdun.

Galeopsis minor folio caulem ambiente.

Klein Taubnesseln.

Cultis delectatur, in agris & hortis oleraceis primo vere floret.

Lamium candidum.

Lamium siue Archangelica flore albo Aduers.

Vrtica iners λευκάθεμος.

Weisse Taubnesseln.

Todte Nesseln mit weissen blumen.

Humida & opaca occupat loca, fossas & areas Nobilium & Rusticorum. Iulio flores ostendit niueos.

Amaro constat gustu. Ex vino potum Iecinoris adimit obstructions.

Flores Menstrua alba ab-

sumere, feminarum experimento celebrantur.

Herba tusa cum sale plagis & contusionibus vtilis, nec non vlceribus putridis & vulneribus, vlcera serpigiosa, vulgo den Wurm/imposita sanat.

Lamium pictum.

Vrtica fatua, λευκόστυλος, Thal.

Milzatella vulgo, id est, Lienaris.

Vrtica iners picta.

Glecken Taubnessel.

Folia lineis albis natura pinxit.

Lienosos fotu iuuat.

Lamium luteum.

Lamium λευκόμορφον aut πολεμόμορφον, Thal.

Archangelica lutea.

Geele Waldnessel.

Gelber Hanenkopff.

In syluis opacis Maio floret.

Ad vulnera, tumores, vlcera cæteris efficacior.

Lamium sylvaticum spicatum.

Vrtica Heraclea, Trag.

Vrtica fœtida max. πορφυρόανθος, Thal.

Waldnessel.

Scharz

Scharlachfessel.

Gottes vergeß/ Nonn.

In syluis & dumetis ad
syluarū margines. Iulio flo-
ribus viget purpureis ex atro
rubentibus.

Grauißimum & ingra-
tum spirat odorem.

*Lamium sylvarum Me-
lissæfolio.*

Lamium Pannonicum,
Clus. P.

Melissa Fuchf.

Melissa montana.

Waldfessel.

Wald Mutterkraut.

Mutterkraut/ Sil.

Stabulatur in syluis &
montibus.

Passim pro vera vtuntur
Melissa, à qua tamen toto
genere distat, cum neq; vul-
tus neq; Citrij odor respon-
deant.

Lampfana.

Λαμπάνη, Dioscor.

Lampfana, Aduersf.

Papillaris.

Wild Sonchenkraut.

Reinföl.

Milchen.

Parietinis, ruderibus, ar-
uorum & hortorum margi-
nibus cretens.

R. abstergit, dige-

rit. Papillas exulceratas im-
posita sanat.

Folijs reperitur integris
& laciniosis.

*Lapathum vulgatis-
simum.*

Λάπαθος, Gracis.

Lapathum, Officin.

Hippolapathum sylvestre
Tabern.

Rumex agrestis siue 2.

Cordi.

Ochsenzunge/

Butterbletter/ } Sil.

Ohmletter/ }

Butterampffer.

Grindwurz.

Herba vulgatæ notitiæ lo-
cis humidioribus in areis
pagorū ad stabula plerunq;

Radices tritæ illinuntur
contra scabiem aliasq; cutis
infectiones.

Addunt vnguentis, qui-
bus capillos flauos reddunt,
Capitisq; furfures abstergūt.

Folia calidis defluxioni-
bus vtiliter imponuntur.

Pares obtinet cum Oxyla-
patho vires.

*Lapathum folio sub-
rotundo.*

Lapathum folio minus a-
cuto, Lobel.

P 3

Lapa-

Lapathum folio retuso.
 Klein Ampffer.
 Lendenkraut.
 Folia minora sunt & minus acuta.
 Iisdem nascitur locis.

Lapathum acutum.

Ὀξύλαπαθον, Diosc.
 Oxylapathum, Mattiol.
 Rumex acutus, Cordi.
 Lapathum acutum, Offic.
 Gelb spitz Ochsenzunge.
 Spitz Mengelwurz.
 Zitterwurz.
 Agris & pratis nusquam deest.

Mistam habet facultatem.
 Digerit & nonnihil repercutit. Constringit, amarum est, abstergit, Dysenterias, Diarrhoeas ac cætera alui profluuia sanat.

Radix ex aceto cocta aut cruda illita Lepras, Impetigines & scabrosos vngues per sanat. Ad lotiones, fotus & linimenta vsurpatur.

Lapathum acutū crispum.

Lapathum ἐλάφουλον.
 Oxylapathum crispum.
 Spitziger krauser Ampffer.
 Humectis gaudet.

Lapathum palustre maximum.

Ὑδρολάπαθον μέγα.
 Hydrolapathum magnū,
 Lobel.
 Hippolapathū sylu. Matt.
 Rumex aquaticus.
 Groß wasser oder weiber Ampffer.

Wild Münch Rhabarbarwurz.

In aquis oritur stagnantibus & fossis humidioribus.
 Radix crassa crocea alui lenit, Ictericam discutit.

Folia Podagris calidis & vlceribus vtiliter imponuntur fluentibus.

Lapathum palustre minus.

Hydrolapathum minus.
 Kleiner wasser oder weiber Ampffer.
 Frequentius est maiore.

Lapathum fontale crispum.

Ποταμογενὲς ἐλάφουλον.
 Potamogeton crispum aut fimbriatum.

Fontalis crispa.
 Alga 2. Trag.
 Tribulus aquaticus minor, Clus P.

Brunnen Ampffer.
 Brausen Samkraut.
 Non nisi limpidarum & pigre

pigrè fluentium aquarum alumna.

Larix.

Λάριξ.

Larix Latinis.

Larga.

Lorchbaum.

Lerchenbaum.

Eximia proceritatis arbor, quæ sola inter conifera absq; folijs hyeme reperitur.

Eius fructus Cupressino minor est, squamaceus, Abietis strobilos refert prorsus, sola quantitate differens.

Abundant Larice Suedes in Baronatu Iegerdorffensi.

Cortex Pini modo siccatur, adstringit, ad cicatricem perducit: tritus ambustis medetur & Intertriginibus prodest.

Folia ex aceto Dentium dolores mitigant. Conuli dissecti ex aqua decocti infestis Podagricis iuuant.

Resina Lariigna.

Πηχυν Λαρινίον.

Lörchenharz.

Lorharz.

Termentin/ vulgò.

Terebinthina propemodum est similis, mellei coloris, lenta, contumax, nunquam durefcens. Calefacit,

emollit, aluum ducit, abstergit, aperit, prouocat, glutinat, attrahit, Renes & vesicam expurgat, calculos expellit.

Purificata prodest Tussientibus, Phthisicis, Asthmaticis; expurgat pectus, Articulorum dolores lenit, mouet vrinas, vlcera Renum & vesicæ sanat, Gonorrhææ succurrit.

Vlcera & recentia vulnera curat, Capillorum casum Palpebris illita prohibet.

Omnis generis vitiliginis, scabiem, Lichenes inuncta abstergit, auribus purulentis succurrit. In summa, potest omnia quæ Terebinthina.

Miscetur Emplastris, Magmatibus & Acopis.

Agaricus.

Άγαικόν.

Lörchen Schwam.

Fungus Laricis. Probatur mollis, albus, leuis, non cariosus.

Gustu initio dulcis, mox amarus est, acrimonia ac leuiculæ absterfionis particeps. Calefacit, digerit, incidit, abstergit, expurgat, obstructa liberat. Vis ei phlegmagoga, hoc est, pituitæ purgatrix, Stomacho aduersa,

uerfa, quæ Zingib. Galanga
corrigitur.

Laureola.

Χαμαδάφνη, Diosc.

Laurus pusilla, Lobel.

Chamælea germanica,
Dodon.

Chamædaphne, Clus. P.

Mezereon germanicum.

Piper rusticum.

Zeidelbast / Kellersbals.

Zeiland / Sieglig / sil.

Montibus & collibus syl-
uosis opacis multa fruticat.
Aprili & Martio floret; Au-
tumno bacca maturescunt.

Calefacit & sicc. vehe-
menter, vrit, pituitam ex-
trahit, vomitum ciet, Men-
sesq; ducit.

Cortex aduersus Quarta-
nam, Hydropem & Venena
per se cum saccharo vel li-
quore aliquo bibitur.

Corrigitur lacte vel aceto.

*Ledum Silesiacum
maius.*

Ledum folijs Rosmarini

2. Lob.

Rosmarinum sylv. siue Bo-
hemicum Mattioli. Lugdun.

Chamæpeuce Plinij; Cord.

Melissa Solitudinum.

Wilder Rosmarin.

Schabenkraut.

Heiden Bienkraut / Hart-
heide.

Gicht Thannen / Sew Tan-
nen.

Grantz / Sewgrantz /
Monticulis, quasi dicatur, suū
grando, per metathesin li-
terarum.

Fruticat & viret plurimis
vdis & desertis montium lo-
cis, vbi Iulio flores promit
candidos, odoratos, semen
paleaceum in capitulis Hy-
perici ferè minoribus conti-
netur.

Tota planta odorata est &
aspectu iucundo, præsertim
cum florib. Iunio onusta est.

Aromaticum spirat, saporis
amariusculi cum acrimonia
coniuncti.

Excalefacit, siccatur, atten-
nuat, aperit, roborat, con-
coquit, resoluit, digerit,
Menses prouocat, Articulus
roborat.

Prodest Articulorum con-
tractionibus, Sciaticæ & a-
quosis pedum tumoribus.

Additur infesib. ad Men-
ses mulierum eliciendos, a-
liosq; vteri morbos: lixiuio
ad inueteratos capitis do-
lores.

Cum Scrofularia in bal-
neis scabiem sanat. In ci-
stas, vestimenta à tineis &
blattis

blattis vt vindicet, reponit vulgus.

Rustici in stabulis substernunt iumentis & porcis, aduersus eorum scabiem & grandinem. Cymas cereuiſiæ nonnulli incoquunt ad inebriandum homines.

Folijs Apiarij aluearia perfricare solent ob odorem apibus gratum & amicum.

Ledum Silesiacum minus.

Rosmarinum syluestre minus, *Matriol.*

Rosmarinus syluestris *Ægyptos, Clus. P.*

Klein wilder Rosmarin.

Kleine Granze.

Rariùs occurrit iisdem natalitijs. Folia Rosmarini latiora pulchrè virentia inodora: flos ab altero diuersus, concauus, suauiter rubet, Maio & Iunio conspicuus.

Inodorum est, exiccantis & adstringentis facultatis. Neglecti vsus.

Lenticula palustris.

ῥανδὸς ὁ ἐν τῶν τελευτῶν, Diosc.

Lens lacustris.

Lenticularis, *Herbarior.*

Muscus palustris.

WasserLinsen.

EntenLinsen.

Seelinsen.

Innatat aquis ceu muscus, minimis & compressis folijs.

Humectat & refrigerat 2. quodammodo ordine. Glutinat, & puerorum Enterocelas sanat.

Compertum est recenter mederi inflammationibus, febribus pestiferis, oculis rubentibus, Palpebrarum phlegmoni & capitis doloribus.

Leucoium bulbosum vulgatius.

Acumbios bulbosum Theoph. siue Narcissus albus, *Thal.*

Leucoium bulbosum præcox maius, *Cl. P.*

Leuonarcissolirion pratense vernum paucioribus floribus, *Lobel.*

Weisse Mergblumen.

Sommerthierlein.

Wilde Veilichen.

Moss Veilichen.

Schnee Veilichen.

Schnee Gallen/*Sil.*

Niue dilapsa Martio & Aprili flos conspicitur ver annuncians, in pratis montium humidioribus & syluis.

Flores ad coronas puellis expetuntur. Ex vino decocti, aduersus Laterum dolores à feminis Hirsbergenſibus propinantur.

2

Lenco-

*Leucoium bulbosum
polyanthes.*

Leucoium bulbosum mi-
nus praecox pluribus florib.
Andere Sommerthierlein.
Tardius flores profert.

*Libanotis Theoph.
alba.*

Libanotis Theoph. ma-
ior, Lob.

Seseli Aethiopicum 2. Cl. P.

Seseli Aethiopicum vul-
gare Matt. Cam.

Ceruaria alba.

Saxosis & asperis nascitur
montosis in monte D. Geor-
gij ad Strigam vbi Sigillata
eruitur. Floret Iulio, Au-
tumno semen maturum.

Radix odorata est. Cale-
facit & siccit. Aperit, vri-
nam proritat, calculum fran-
git. Auxiliatur ruptis, con-
uulsis, ex alto delapsis. Ex
vino pota Menstrua pellit.

Libanotis Theoph. nigra.

Rosmarinum f. Libanotis
1. Theoph. folijs Apij pa-
lustris.

Seseli Peloponnesiacum &
Daucus 3. Fuchf.

Daucus Selinoides 2. Lob.

Radix Ceruaria nigra.

Saxifragia Venerum.

Alcizotis.

Schwarze Hirschwurtz/Sil.

Schwarze BergPeterlin.

Montosis asperis & pe-
trosis fruticat.

Oreoselino quodammo-
do affinis, nisi quod tota
maior; Folia latiora & cras-
siora, Radix crassior nigri-
cans, hirsuta & villosa coma:
Semen Anethino maius, a-
cre & aromaticum.

Radix cal. & sicc. aperit,
extenuat, pota venena pel-
lit per sudores, Moribusq;
venenosis auxiliatur, Stran-
guriā tollit, Renes expur-
gat, calculum comminuit &
Renes ab arenulis liberat.

Vulgo ad pecorum Mor-
bos nota.

Lilium montanum.

Κελύον πορφυρ.

Lilium sylvestre, Dod.

Lilium purpureum radi-
ce lutea.

Martagon Chymistis, Matt.
Goldwurtz.

Berg Lilgen.

Braunlilgen.

Amat montosa herbida,
colles & prata. Iulio floret.

Calefacit & siccit 2. gra-
du. Vrinam & Menses pro-
licit, Ictericā subuenit pota
& amuleto.

Impo-

Imposita Oedemata & durities emollit, maturat.

Lixiuo capillos flauos reddit, & defluentes replicat.

Lilium conuallium.

Καρδιόρυμος, Gesn.

Πίθος, Theoph.

Lilium conualliū vel verum Theoph. Lob.

Ephemerum non lethale, Fuchf.

Thal Lilgen/Springauff.

Sancken/Sautschen.

Zweyblat.

Circa Maij calendas cum floribus in montibus & eorum conuallibus conspicitur. Flores gustu amari, odoris eximij & perquam iucundi. Exiccant, calefaciūt, attenuant, digerunt, prouocant.

Cor iuuant & cerebrum, omnesq; principes facultates. Idcirco resolutis, comitialibus, conuulsis, vertiginosis, animi deliquio laborantibus auxilio sunt.

Venenis aduersantur: tormina sedant & Menstrua euocant.

Succus oculorum inflammationibus utilis. Aqua ex floribus cum Maluatico in vitreis organis elicitur præstantissima & maximi vsus

in conuulsionibus, Apoplexia, Paralyf, Syncope, vteri suffocatione, Cordis palpitatione, vertigine. Aegrè parturientibus certum auxilium prædicatur.

Lilium conuallium rubrum.

Lilium conuallium, floribus suauè rubentibus, Lob.

Leibfarben Thal Lilgen.

Interdum iisdem locis floribus rubentibus conspicitur, sed minus frequens.

Linaria.

Ὠνὸς Diosc. Aduers.

Linaria 1. Dod.

Osyris maior, Tabern.

Vrinaria.

Graven flachs.

Marien flachs.

Wald flachs.

Bröten flachs.

Cartharinen blumen.

Frequens in campestribus, agrorum aggeribus, dumetis, hortorum sepimentis.

Amara illi qualitas, calefaciens, siccans, aperiens & abstergens. Alium turbat, vrinas, Menses trahit.

Ex vino hausta vrinam retentam elicit, Hepatis obstructions soluit, Ictericam & Hydropicos iuuat.

Q 2

Cutim

Cutim & maculas faciei
exterget, leuigatq;

Sudores in balneis pellit;
in festu infantibus vrinam re-
tentam prouocat vulgato
experimento.

Succus vulnera, vlcera &
fistulas curat.

Linaria adulterina.

Σπειρίγλαρος.

Lithospermum syl. 2. Trag.

Passerina Linariæ folio.

Lingua passerina.

Späzenzunge.

Apricis nascitur.

Linum sylvestre.

Λίνον ἄγριον.

Linum sylu. Dod.

Linum sylvestre flore cœ-
ruleo.

Wild flachs.

In campestribus, incultis
locis & secus itinera Iunio &
Iulio floret.

Herba cum floribus deco-
cta & butyro recente illita,
tumores resoluit, & inflam-
mationes lenit, quinetiam
induratos emollit, addita
Althææ radice & gallina-
ceo adipe.

Linum sylu. perpusillum.

Chamælinum.

Linum sylu. 1. Clus.

Klein wilder flachs mit
weissen blümlein.

Ad margines pratorum
humidos Iunio flosculos
promit.

*Lithospermum legi-
timum.*

Λιθόσπερμον μικρόν, παρὰ τὸ ὁ-
μοιοῦν τὸ σπέρμα λίθοις.

Lithospermū minus, Dod.

Milium Solis, Officin.

Milium soler, id est, Mon-
tium.

Steinhirsche.

Waldhirsche.

Steinsamen.

Nascitur incultis, strigo-
sis, asperis & solitudinibus.

Semen calefacit & siccatur,
abstergit, aperit, & nonnihil
acrimoniz habet, vrinas
pellit, cum vino albo potum
vrinam deijcit, calculos fran-
git & stranguriam discutit.

Lithospermon nigrum.

Λιθόσπερμον ἄγριον.

Lithospermum sylu. ar-
uense vel nigrum Matt.

Anchusa degener facie
Milij Solis Lob.

Anchusa aruensis alba
Thal.

Schwarz Steinhirsche.

Inter legetes Maio floret.

Incul-

Incultis etiam & ruderatis
plerisque occurrit.

Semen Calculosis ex vino
propinatur.

Lolium.

Αἶψα Diosc.

Ζιζάνιον.

Triticum temulentum
Aduers.

Dollkraut/Donkraut *Sil.*

Taubforn/Dollforn.

Hordei & Auenæ vitium,
in quod pluuiosa æstate de-
generant.

Excalescit, siccatur, attenu-
atur, resoluit, abstergit, inebri-
atur, strumas discutit, ossa
extrahit. Ex aceto & sulphu-
re viuo varos, Lichenes &
Lepras sanat.

Lolium non solum pani
mixtum sed multo magis
Cereuisiæ additum & ferue-
factum tepore & temulento
veterno Cerebrum oppri-
mit & opacatur, reliquaque
membra torpida reddit. Ca-
piti dolorem, Oculis caligi-
nem adfert; quia vaporosos
humores in Cerebrum de-
fert.

Lonchitis lauis.

Lonchitis 2. femina Ta-
bern.

Lonchitis 2. *Neotericor.*

Λογχίτης λεία Diosc.

Asplenium sylvestre *Lug-
dun.*

Caterach maius.

Milzfarren *Sil.*

Wald Hirschzunge.

Gros Milzkraut.

Folia integra virent hye-
me humi procumbentia.

Opaca & humida occu-
pat montium loca.

Siccatur, adstringit cum
mediocri calore, vrinam
ciet.

Ex vino decocta & pota
morbo regio prodest, mea-
tus Iecinoris & Lienis ape-
rit, Calculos Renum & Ve-
sicæ comminuit, febris Quar-
tanæ auxilio est.

Atram bilem discutit &
sanguinem ex casu aut con-
tusione concretum à Corde
subtrahit.

Lonchitis aspera maior.

Λογχίτης τραχύεια siue 2. *Dod.*

παρα τῆς λανχίτης à lancea, quam
scabræ foliorum incisuræ re-
ferunt.

Lonchitis aspera *Mattiol.*

Lonchitis 2. mas *Tabern.*

Lanceolaris.

Spicant.

Gros Milzfarren.

In altissimis Suditorum
asperis & salientibus veluti

Q iij

am

am Kiesenberge: alibi minus occurrit.

Splenetica est. Ex aceto Lienes induratos sanat. Vulneribus mirum in modum prodest. Ea namq; glutinat & inflammationes in eis excitari non patitur.

Lonchitis aspera minor.

Lonchitis aspera Maranthæ Matt.

Lonchitis adulterina Tabern.

PseudoLonchitis aspera.

Klein Milzfärrlin.

Nascitur asperis & saxosis montibus.

Lunaria minor botrytis.

Lunaria minor Clus. P.

Lunaria racemosa Aduers.

Ruta Lunaria Tabern.

* *Humilis et egra non Zelantia.*

Monraute/ Monfraut.

Weisser Widerthon.

Der rechte Widerthon } Sil.

Leber Kautte.

In pratis nec non colliculis gramineis montium Maio conspicua: quæ breui perit.

Refrigerat & siccatur, gustu præfica & adstringens.

Egregia vulneraria est. Pota intrinsecus corporis sanat fracturas & dysenterias: extrinsecus illita magni ad

Puerorum Enterocelas commodi.

Albas vteri fluxiones supprimit.

Plebecula simplex ad quoduis fascinum abigendum superstitiosè celebrat.

Lunaria botrytis minor

πολύφυλλος.

Lunaria minor ramosa Clus.

Grosse vielblättrichte Leber Kautte.

Rarior inuentu. In horto meo inter gramina, vbi prior copiosè crescit, reperta fuit.

Lunaria græca perenni radice.

Lunaria longa Gesn.

Lunaria græca siliquis oblongioribus Thal.

Lunaria raphanitis s. Bulbonac radice rediniua Lob.

Viola lunaris 2. Tabern.

Monveil.

Waldveil. Sil.

Humidis & opacis montium saltibus perennat.

Flores fert Maio odoratos, succedunt siliquæ foliaceæ oblongiusculæ, continentes semen, quod abstergit & vrinas prouocat.

Lupu-

Lupulus spontaneus
mas.

Lupulus syluestris.

Lupus salictarius.

Wilder Hopffen sil.

Dorn Hopffen.

Vbiuis ad sepēs, dumeta
& margines pratorum hu-
mentium luxuriat.

Turiones primo vere a-
qua feruenti macerati & frī-
gida abluti, cum aceto & o-
leo communi, addito sale in
acetaria veniunt. Cichorij
sapore non ingrato, calore
temperato ad aluum emol-
liendam.

Lupulus flore & semine
calefacit, exiccat, extenuat,
aperit, abstergit, sanguinem
purgat.

Bibitur contra venena,
scabiem, luem gallicam, &
ceteros affectus, qui cutim
extimam inficiunt. Datur et-
iam contra febres ab infar-
ctu prouenientes.

Semen Lumbricos ven-
tris necat, vrinas prouocat
& menstrua educit.

Lupulus spontaneus ste-
rilis.

Lupus syluestris femina.

Wilder femel Hopffen.

Folia mare rotundiora,

nec tam profundis incisuris
dissecta, & iuxta radicem
potiss. sine incisuris spectan-
tur.

In sepibus & dumetis vt
prior nascitur.

Luteola.

Lutea Plin.

Lutum herba, Dod.

Pseudosruthium Matt.

Gelbefraut.

Sterckfraut.

Streichfraut.

Incultis secus itinera & a-
grorum margines prouenit.
Vbi inaruit, toto pallescit co-
lore.

Excalefacientis & siccan-
tis est facultatis. Contra ve-
nenosorum animalium i-
ctus & pestem commenda-
tur.

Lychnis sylv. pur-
purea.

Lychnis sylv. rubello flore

Lob.

Ocymastrum flore rubro

Mattiol.

Ocymoides purpureum.

Wilde rote Veilrößlin.

Roter Widerstoß.

Je lenger je freundlicher.

Herbidis & humidis

montium tractibus plurima
astra-

æstatis parte in Autumnum
flore.

Lychnis sylu. alba.

Λύχνης ἀγρία.

*Lychnis sylu. flore candi-
do Dod.*

Ocymastrum siue Ocy-
moides *Mattiol.*

Polygonatum Trag.

Wild Margenrößlin.

Weis Wiederstos.

Gliedefraut.

Nascitur prope septa & a-
grorum margines. Iunio &
Septembri flore.

Semen ex vino potum vi-
perarum morfibus mede-
tur.

*Lychnis sylu. alba noctu-
flora.*

Ocymoides noctiflorum
Cam.

*Lychnis sylvestris noctu-
florens.*

*Wild Nacht Margenröß-
lin.*

Flores ei candidi & simi-
les prædictæ Lychnidi; nisi
quòd huius flores circa cre-
pusculum aperti conspician-
tur magis quàm die.

*Lychnis sylu. candi-
da II.*

Papauer spumeum Lob.

Been album Monspeliën-
sium.

Herba articularis Tabern.

Μήκων ἀφρόδιν.

Saubenfropff.

Wandelkraut. } Sil.

Teschelkraut. }

In herbosis ac lætis colli-
bus multa.

Emollit fotu artus luxa-
tos & nervos stupidos.

Succus Ophthalmiam ca-
lidam tollit & dolores Ocu-
lorum mulcet.

Semen pituitam purgat,
Comitialibus datur. Sup-
posita Aëgris nescientibus
Crisin moliri vulgus credit.

Lychnis segetum.

Μελανθιον ἐκ τῶν περὶ Hippoc.

PseudoMelanthium Lobel.

Githago Trag.

Nigellastrum Dod. & Fuchf.

BornKosen.

BornNegelin.

BornKaden.

Nascitur in aruis inter se-
getes, Maio & Iunio cum flo-
re viget.

Semen excalefacit, siccatur,
abstergit.

Herba cum stercore Co-
lumbino & semine Lini vino
permixta, strumas digerit,
aliosq; duos tumores ma-
turatur ac resoluit.

Lyfina-

*Lyfimachia purpurea
spicata.*

Λυσιμαχία à Lyfimacho re-
ge inuentore.

Lyfimachia purpurea for-
tè Pliniana *Aduers.*

PseudoLyfimachium pur-
pureum 2. *Dodon.*

Corneola.

Weidenfraut.

Braun geârter Weiderich.

Occurrit cum flore Iulio
in riualis pigrè fluentibus,
& paludinosi lacunis.

Saporis est acerbi & au-
steri, frigida & sicca natura.
Adstringit, refrigerat, cohi-
bet.

Pota ad omnes fluxiones
sanguinis narium, Intestino-
rum, vteri commodissimum
auxilium: Serpentibus &
Muscis aduersatur, easq; ni-
dore fugat.

Flores decoquantur in a-
qua ad faucium inflamma-
tiones.

*Lyfimachia speciosa lati-
folia.*

Lyfimachia siliquosa lati-
folia maior.

Chamænerion seu 5. spe-
cies Lyfimachia *Gesn.*

Antoniana siue S. Anto-
nij herba maxima.

An *ὄραγμα* Diosc?

Eberfraut *Sil.*

Sewerfraut.

Humidis montosis ad
pratorum & agrorum mar-
gines in dumetis fruticat,
integra æstate Nerij purpu-
reos exhibens flores ex qua-
tuor latiusculis folijs purpu-
reis & totidem angustis ob-
longis intermedijs intense
rubentibus constantes, se-
mine in siliquis oblongis
tandem fatiscentibus cum
pappo auolante: Radice lon-
ga, albida, subter humum
reptante sese propagans.

Ex diuersis constat parti-
bus, nonnullis euidenter a-
stringentibus, alijs verò mo-
dicè abstergentibus.

*Lyfimachia siliquosa
palustris.*

Braun Brunnen Weide-
rich.

Rapunzel vulgo.

Nascitur in palustribus &
fonticulis montium cum A-
nagallide aquatica.

Vere primo ad acetaria
colligitur.

Iulio & Augusto flores ex-
eunt dilutè purpurei, post-
modum semine cum pappo
auolante.

R

Lyfima-

*Lysimachia palustris roseo
flore.*

Rosen Weiderich.

Caulis digitum crassus
duorum, quandoque trium
Cubitorum altitudinem as-
surgit ramosus: flores Angu-
sto & Septembri pulcri, ro-
sei, ex quatuor foliolis con-
stantes. In filiquis oblongis
semen fert.

Ad riuiolos aquarum iux-
ta Fanum Bulconis, alibi non
item.

*Lysimachia filiquosa
minor.*

PseudoLysimachia pur-
purea i. Dodon.

Delphinium Dioscor. Lug-
dunens. à foliorum figura Del-
phinem representante.

Salicaria cornuta.

Filius ante patrem, quod
filiqua semen continens an-
te enatum florem appareat.

E'maciov Th. l.

Braun Schotten Weide-
rich.

Gehörnter Weiderich.

Iisdem natalibus gaudet,
sed multò vberiore & varia-
to prouentu oritur.

Lysimachia lutea.

Αυγάριον seu λεύκον Diosc.

Geeler Weiderich.

Wurzel.

Marginibus & ripis mi-
nus vdis atq; merfis, Iunio
& Iulio flores gignit.

Gustu adstringit & siccat,
vlcera glutinat.

Pota omnes sanguinis re-
iectiones supprimit & dy-
sentericis auxiliatur.

Suffitu acerrimum nido-
rem redolet. Eapropter Ser-
pentes & venenata fugat, &
Muscas in conclauibus in-
terimit.

Succus in pello abundan-
tiam Mensium supprimit.

Flores capillis flauitiem
conciliant.

Lysimachia galericulata.

Lysimachia flore cœruleo.

Lysimachia Siteritidi con-
gener 3. Thal.

Gratiola cœrulea.

Tertionaria.

Blauer Augentrost/

Stechenfraut.

In fossis circa piscinas, vbi
effluunt aquæ, & alijs hume-
ctis frequens. Aestate flores
exerunt. Amara valde est, ca-
lida, sicca, aperiendi vi præ-
dita.

Ex vino decocta Tertianas
sanare experimento constat.

Malus

*Malua sylu. pumila
albo flore.*

Μαλάχη ἀρχία, Diosc.
Malua sylu. repens pu-
mila, *Aduers.*

Malua, *Officin.*
Bleine weisse Pappeln.
Basen Pappeln.
Bäslinfrant.

Notissima est prope ru-
dera, incultis urbium & pa-
gorum delectatur.

Durat tota æstate.

Digerentis paululum &
emollientis est facultatis.
Calidæ & humidæ naturæ.

Tenera folia in iusculo
pingui aluum emolliunt &
vesicam exulceratâ iuuant.

In summa Thoraci, Pul-
monibus, Vesicæ, Renibus,
Intestinis mirè prodest, ne-
dum folio, sed & flore & ra-
dice.

Additur Clysteribus Al-
uum lubricantibus. Folia &
flores recentia lacti caprillo
incocta & cataplasmatibus in-
star, Collo extrinsecus cali-
dè apposita, Anginæ ex acri
destillatione magnum præ-
sidium.

Malua sylu. procerior.

Μαλάχη χιρταία.

Ἰππομαλάχη.

Malua sylu. recta, *Cordi.*

Malua syluestris proce-
rior vulgaris *Aduers.*

Ros Pappeln.

S. Johannis Pappeln.

Wilde rothe Pappeln/*sil.*

Vbiq; viarum & arearum
prope vrbes luxuriat, Iunio
& Iulio floret.

Calorem quendam mo-
deratum ac repidum habet,
leuiter mollit ac discutit.

Decocta omnibus lethali-
bus venenis auxiliatur, la-
pides conterit, somnum
conciliat, facilemq; partum
præstat.

In sorbitionibus Phthysicis
utilis: illita, apum, vesparum
ictibus medetur, ac conti-
nuò dolorem mulcet.

Additur in fessibus, cly-
steribus, fotubus ad calcu-
lum Renum & Vesicæ præ-
scriptis.

*Malua sylu. Alcea
dicta.*

Ἀλκία Diosc. παρὰ τὴν ἀλκίαν
à robore, quod firmiter dys-
entericæ & ruptis medeatur.

Alcea.

Alcea vulgaris, *Aduersar.*

Siegmarskraut.

Rothe Pappeln.

Gertz Leuchre.

R 2

Ruri

Ruri nota incultis campe-
stribus, agrorum scrobium-
que marginibus iuxta vias,
sepēs & semitas.

Floret Iunio & Augusto.

Minus mucaginis dat,
magis digerit, vim Empla-
sticam obtinet.

Dysenteria, aluo citā, ru-
ptis & conuulsis auxiliatur.

*Malua sylu. seu Al-
cea querna.*

Dens Leonis.

Zugen Pappeln.

Fälts.

Eadem cum priori, loco
natali solummodo differens,
quod sub Quercubus nasci-
tur. Oculorum nebulas &
caligines discutit.

Malus sylu. maior.

Malée à zéa.

Gros wilder Apffelbaum.

Holtz Apffelbaum.

Ex cortice mediano lu-
teo, addito Alumine, deco-
quitur color flauus, quo pi-
ctores vtuntur.

Malus sylu. minor.

Klein wald Apffelbaum.

Sew Apffelbaum/vulgò.

Locis campestribus, syluis
& collibus vbiq; nascitur.

Mala agrestia.

Mälle à zéa.

Äzebumla, Diosc.

Holtz äpfel.

Wald äpfel.

Sew äpfel.

Acerbi sunt & adstringen-
tis saporis. Refrigerant, sic-
cant, cohibent. Frigidum
enim habent succum, terreū
omniñò & flatulentum.

Cœliacis ac Dysentericis
profunt.

Aqua ad eodē vñs de-
stillatur.

Rustica gens è tufis & a-
qua perfusis, expressis po-
tum conficiunt, quem Apffel-
trancē vocant.

Marrubium candidum.

Πεδάρον, Diosc.

Prasium, Offic.

Marrubium album seu fe-
mina.

Weisser Andorn.

Gottes verges/

Helffe fraut/ sil.

Wilder Taurant/

Oritur propter ædificio-
rum ruinas & rudera. In a-
reis pagorum notum.

Calefacit gradu 2. siccāt
3. gustu amarum est & odo-
ratum, Aperit, digerit, ab-
stergit.

Iteur

Iecur ac Lienem obstru-
ctione liberat, Thoracē Pul-
monesq; expurgat, Menfes
prouocat, Morbum regium
discutit, Laterum dolores
lenit.

His qui venena hauserunt,
difficile parturientibus mu-
lieribus, & à partu non pur-
gatis: item ruptis, conuulsis
& neruorum contractioni-
bus salutare.

Balnea inde fiunt contra
malas scabies, porrigines ac
papulas sanant.

Marrubium nigrum.

Ρανδάκη, Diosc.

μέλαν σφόδρον.

Marrubium spurium.

Marrubiū foetidum, Offic.

Schwarz Andorn.

Stinckender Andorn.

Secus parietes & sepes oc-
currit, vmbrosis locis.

Tota foetida est. Amara,
acris & absterforiæ faculta-
tis. Aestate floret.

Vis eius efficax aduersus
Canis rabidi morsus, folijs
ex sale illitis.

Lixiuum ex herba vlcera
capitis puerorum sanat.

*Marrubium aqua-
ricum.*

Marrubium aquaticum

vulgo, *Aduers.*

Marrubium aquatile, *Dod.*

Scordium Plinianum, *Ta-
bern.*

Sideritis r. seu Heraclea
Matt. *Cam.*

Weisser Andorn.

Glied fraut.

Viget & floret astituis
mentib. ad riuiolorum mar-
gines & secus fossas.

Odorata est. Refrigerat
& vnā validè adstringit.

Succus nigricante colore
quauis inficit, adeò pertina-
citer inharens, vt elui aut
abstergi nequeat, adeò vt
telæ lineæ hoc infectæ cum
perpuò retineant.

Matricaria.

Παρθέριον, Diosc. *Mattiol.*

Arthemisiæ ramosæ 2. spe-
cies, *Fuch.*

Arthemisia tenuifolia, *Ta-
bern.*

Mettram/Metter/*Sil.*

Mutterfraut/Sieberfraut.

Locis gaudet ruderatis,
secus muros veteres, & hor-
torū margines hyeme viret.

Gustu constat perquam a-
maro, odoris ingrati. Ex-
calescit insigniter, siccatur 2.
aperit, penetrat, abstergit,
resoluit.

Bilem & pituitam trahit

R 3 cum

cum Malsa pota. Mentes & secundas ciet & mortuos fœtus educit; suffocationi vteri medetur. Melancholicos, Colicos & Nephriticos iuvat. Erysipelatibus & inflammationibus cum flore vtiliter imponitur.

Rustici folia tenella recentia cum sale ieiuno stomacho deuorare solent, aduersus nauseam & ἀνοήϊαν vetriculi, Colicosq; dolores.

Melampyron purpureum.

Triticum vaccinum, Trag. Parietaria sylu. coma dilute rubescence.

Μελάνθρον, Theophr.

Rühweizen.

Wachtelweizen.

S. Petersblum.

Floret Maio & Iunio inter segetes.

Vitium est Tritici & comes importuna; vaccis pabulum gratum & innocuum.

Melampyron purpureo-violaceum.

Triticum vaccinum 2. Parietaria sylu. cœrulea coma s. 2. Cl. P.

Blauzeel Tag vnd Nacht.

Ringelscheis vulgò corru-

ptè, potius dicendum Rinderweitz.

In syluis & aggerib. montosis Iunio & Iulio frequentissimum.

Sapore est subdulci & nonnihil acri, simulque adstrictionisalicuius particeps. Vlcera sanat & liuores discutit.

Melampyron luteum.

Κερατίζον, Diosc. Lobel.

Melampyron 2. Thalij.

Triticum vaccinum 3.

Milium syluaticum, Tab.

Parietaria sylu. flore luteo seu 2. Cl. P.

Waldhirsche.

Wild Tag vnd Nacht.

Abundat in syluosis collibus, apricis ac arboribus destitutis. Iulio floret.

Sapor acris ac vehemens. Reperitur nonnunquam flore candido.

Melilotus germanica lutea.

Μελίλωτος Offic. à fragran- te odore, vel colore Melleo.

Λάτος ἀγρία, Diosc.

Melilotus vulgaris.

Trifolium odoratū, Dodon.

Sertula regia.

Teutscher gelber Steinflee.

Gemeiner Steinflee.

Geeler

Geeler Blee/ sil.

Floret tota æstate circa aruorum margines nec non inter segetes.

Flos luteus siccus, odoratus, exiguam amaritudinem gustu refert habens & quiddam adstringens: sed & discentit & maturat. Emollit, digerit tantillo calore peptico naturæ amico, & adstrictione moderata. Hepatistollit obstructions ex vino decocta, cum Arthemisia & Chamamelo vterinos tollit dolores. Pleureticos iuuat. Apes floribus delectantur.

Melilotus germanica alba.

Melilotus alba sine 2. Dod.

Melilotus maior candida, Trag.

Weisser Steinflee.

Weisskraut/ sil.

Palsia in agrorum lapidosissimis limitibus, Iulio, Augusto & Septembri floret.

Calefacit, siccatur, abstergit cum leni adstrictione, nonnullæ amaritudinis particeps, ac simul digerit.

Albos mulierum Menses infestis & potu flores sistere experientia mulierculæ obseruarunt.

Mentha sylu. I.

¹Hieracius æger, Diosc.

Mentha caballina folio rotundiore.

Menthastrum, Trag.

Mentha alba, Officin.

Wilde Mânze.

Wilder Balsam.

Ros Mânze.

Vda & scrobes vrbium festatur.

Sapore est amaro, acri & adstringente.

Excalfacit & siccatur in prin. tertij gradus: attenuat, adstringit, aperit.

Auxiliatur pota regio morbo affectis, anhelosis & agrè spirantibus, mulcet ventris dolores, qui à flatibus oriuntur. Valet aduersus venenosorum ictus.

Suffusa, feminas à partu purgat.

Mentha sylu. II.

Mentha equina acutioribus folijs.

Menthastrum, Lobel.

Menthastrifolia aquat. hirsuta Mentha.

Wilde Brause Mânze.

Spizige Rosmânze.

Fisch Mânze.

Humidis delectatur locis ad fluuiorum ripas. Priori assimi-

assimilatur: verum longè
altius fruticat folijs longio-
ribus.

Grauem odorem exhalat.

Mentha sylu. III.

Σισυμβριον, Diosc.

Mentha aquatica.

Sisymbrium, Dod.

*Mentha aquatica seu Si-
symbria rubro folio & flore
nigræ Mentha, Lebel.*

Balsamine palustris:

Bach Mûntze.

Fisch Mûntze.

Wasser Poley / $\frac{1}{2}$ sil.

Ros Poley / $\frac{1}{2}$ sil.

Alumna humentium ac
rignorum; secus aquas la-
bentes & piscinas multa. Ju-
lio floret.

Tenuium est partium, di-
gerentis, excalescentis, ex-
iccantis temperaturæ.

Mouet vrinas & calculos
pellit cum vino pota. Vomi-
tiones, singultus, tormina,
stomachi dissolutiones co-
hibet.

Folia in capitis dolore
fronti aut temporibus illi-
nuntur, item contra Vespa-
rum Apumq; ictus.

Lentigines & Cutis à So-
le nigritiem & asperitatem
exerit illita.

Mercurialis syluati-

*ca $\frac{1}{2}$ mas
 $\frac{1}{2}$ semina.*

Ανθρακωδης, Diosc.

Κυνοκράμβη, Diosc.

*Mercurialis radice redi-
uiua.*

*Cynocrambe vel Mercu-
rialis sylu. Mattioli. & Dod.*

Castrangula, Ital.

Wald Bingelfraut.

Gundeköl / Gundekraut.

Humidis & opacis mon-
tium recessibus passim ob-
uia. Floret Aprili & Maio.
Radix oblonga humi sparsa
perennis est. In cibo oleris
modo sumta gratior quàm
communis videtur, & aluum
benè soluit. Ius decocti bi-
lem, pituitam, aquas & Me-
lancholicos humores deiecit.

Colligitur Maio ad Cly-
sterũ vsum, deficiente satius.

*Meum Silesiacum al-
pinum.*

*Meum Silesiacum folio
Cicutæ, Camer.*

Meum Riphæum.

Meum Cicutarium.

Bärwurz.

Wilde Bärwurz.

Herbidis iugis Riphæorũ
montiũ delectatur; quamuis
& ex semine in hortis feritur.

Radi-

Radices oblongæ, digitum crassæ; folia Cicutæ, vmbella in caule cubitali candida.

Amara est radix cum partium tenuitate, aperit, attenuat, prouocat urinas & Menstrua. Vulgus pro Meo vero vititur ad Matricis affectus.

Meum Silesiacum palustre.

Θυσέλιον.

Thyselinum Plin. Lobel.

Oelsinichium Cord.

Apium sylu. lacteo succo turgens C. B.

Meum Batani.

Cuminum Alnorum.

Wilder Bertram.

Oelnich/ Oelnick.

Secus fossas siue aquarum ductus iuxta Alnorum truncos territorij Hirsbergensis frequens. Iunio ac Iulio vmbellam gerit.

Radix amara vehementi acrimonia fauces ferit, naturæ calefacientis & siccantis. Incidit, penetrat, resoluit crassos & viscidos Pectoris humores. Eapropter Asthmaticos & suspiriosos iuuat.

Commanducata multam ex ore pituitam elicit, & Dentium dolores sopit.

Medetur contagio Pestilentia.

Millefolium terrestre album.

Στεφανός ὁ χαλκιδόνος Diosc.

Millefolium maius.

Militaris Aduers.

Millefolium Officin.

Schaffarwi.

Karwekraut.

Pratorum & agrorum marginibus plusquam notissimum. A Maio in multam ætatem floret.

Siccatur, adstringit, consolidat recentia vulnera.

Herba recens tusa pubiq; illita Mensium abundantiam compefcit.

Ad vetera & recentia vulnera, profluentem sanguinem, & fistulas etiam eximij & peruulgati vsus.

Vmbella candida ex lacte caprillo vel propria aqua pota Gonorrhœam in viris, in feminis alba vteri excrementa cohibet.

Millefolium terrestre purpureum.

Millefolium purpureum Tabern.

Millefolium terrestre purpureis floribus Lob.

S

Rote

Rote Schaffarwi.

Purpurrote Schafripp.

Flores dilute rubent, passim inter segetes.

Valet potum ad omnes sanguinis reiectiones commodeq; dysentericis infunditur.

Aqua stillatitia contra pestilentiam utilis.

Millefolium palustre I.

Eleonorus volderos.

Myriophyllum Matt. Camer.

Myriophyllum aut Maratrophyllo palustre Lobel.

Foeniculum aquaticum 1. Tabern.

Wasser Fenchel.

Wasser gras.

Palustris est & aquis non fluitantibus familiaris.

Desiccatoria est facultatis, ut vulnera glutinet atq; recentia ab inflammatione vindicet.

Millefolium palustre II.

Myriophyllum 2. Mattioli.

Myriophyllum Equisetifolium palustre Lobel.

Viola palustris.

Wasser Veil.

In aquis tardius fluentibus stabulatur. Iunio flos prodit.

Refrigerantis & siccantis naturæ.

Millefolium palustre

III.

Millefolium maratrophyllo 3 flore & semine Ranunculi aquatici Hepaticæ facie Lobel.

Foeniculum aquaticum 3. Tabern.

Queisflachß.

Wasserflachß.

Ad ripas Quissi fl. & in piscinis frequens, flos ei candidus.

Caustica est facultatis, & escharoticon.

Millefolium palustre IV.

seu spicatum.

Millefolium pennatū aquaticum spicatum C. B.

Alga 3. Trag.

Wasser Sternkraut.

Teichfenchel.

E radice fibrosa coliculi concavi Hippuridis nascuntur. Folia e geniculis æquali intervallo quatuor, Corruæ seu Foeniculi diuisa, Stellaris instar caulem ambiunt, ex fusco virentia & in aqua fluitantia. Iulio & Augusto extra aquam iuli prominent digitum longi, rubentes, flore lu-

re luteolo paleaceo. In piscinis pagi Seiffersdorff ad Quissum fluuium.

Mollugo I.

Mollugo vulgarior Herbar. Lobel.

Galium album maius latifolium.

Gros Stern Negerfraut. Gliedefraut.

In syluis apricis & secus fruteta ac margines pratorum.

Huius decocto per fotum roborari articulos vulgus credit.

Mollugo II.

Mollugo minor.

Galium album minus Tabern.

Klein weis Negerfraut.

In pratis humidioribus.

Mollugo III.

Mollugo montana Lugdunens.

Gros Berg Negerfraut.

Montosis asperis occurrit.

Monophyllon.

Vnifolium.

Gramen Parnassi Recentioribus.

Einblat.

Nulli opaco luco vel nemori non nascitur.

Per Maium promit flosculos albidos, odoros, vnde acinuli rotundi, rubelli, subdulces oriuntur.

Gustu est amaro & ingrato; sed facultate ad Nervorum farctus eximia.

Herba & radix tusa vulneribus utilis. Pulvis siccus aduersus Bubones pestilentes efficax pondere 3 j. cum aceto & vino. Liquor stillatitius Infantibus Epilepsia correptis non contemnendum remedium.

Morsus Rana.

Viola palustris.

Nymphæa alba minor Lugdun.

Froschbiß.

Grosse Wasser Linsen.

Torpentibus aquis superstat Lenticulæ similis, rotundo folio, intermicantibus luteis flosculis, crebris radicum staminibus longius se porrigentibus in fundum. Gustu constat Nymphææ aut Lenticulæ palustris earundemq; virium.

Muscus Arborum.

Βέβος, αρδαγγιον Diosc.

Muscus Arborum villosus.

S 2

Muscus

Musculus quernus Lob.
Lanugo seu villi Arborum.

Baum Moos.

Baumgemies.

Nascitur in Quercu, Larice, Abiete, Picea, Iunipero, Pinastro, Populo, Pyro, Pomo etc.

Vnus in hoc genere magis tenuis, crassior alter: quidam breuior, prolixior alius: subcandido colore ut plurimum omnes candescentes: tamen quandoque & niger quidam est, sed minor & tenuior.

Colligitur vere albus, odoratus, Quernus, Lariceus, seu Abietinus ad pulueres odoratos, quos Cyprios vocant, parandos.

Refrigerat, adstringit, digerit, somnum inducit, ventriculum roborat, vomitiones & aluum cohibet. Grauidis abortum præcauet.

Musculus Pulmonarius.

Pulmonaria fungosa Lugdunens.

Pulmonaria Officin. Dodon.

Lichen arboreus.

Lungenkraut.

Lungen Moos.

Grosse Baumflechten.

Prouenit in Quercuum, Fagorum, Picearum aliarumque syluestrium arborum caudicibus, opacis præsertim syluis.

Laudatur Quernus, qui refrigerat, adstringit, siccatur, abstergit, vulnera glutinat.

Valet ad tabem Pectoris & Pulmonis vlcera & cruenta sputa. Ad vulnera etiam & Pudendorum vlcera & ad utrumque muliebrem profluuium, dysenteriam & biliosos vomitus.

Musculus Sabinaeformis.

Sabina Imperitorum Matthiol.

Chamaecyparissus Tabern. Selago 1. seu Pliniana Thal.

Wald Seuenbaum. Trag.

Wilder Widerthon Sil.

Wald Cypress.

In syluis montium ad fontes Quisii fl. humidis & umbratis reperitur.

Contra Oculorum vitia suffitu prodesse Druidæ Galorum prodiderunt,

Musculus clauatus.

Musculus terrestris seu Lycopodium Dodon.

Lycopodium Tabern.

Musculus

Musculus reptilis seu scanfili-
lis Thal.

Selago 2. Eidem.

Seilfraut.

Schlangen Moos.

Gürtelfraut.

Braenfuß Sil.

Iunio iuli vigent in syluis,
apricis, desertis, sabulosis &
inuijs locis.

Ex vino potus vrina stilli-
cidia discutit, frangit educit-
que calculos Renum.

Aqua decoct. inflamma-
tiones & calidas Podagras
fotu mulcet.

Vinum pendulum seu flu-
tuans, quod iam lentorem
contraxit, in vase suspensus
integritati restituit.

*Musculus clauatus al-
pinus.*

Kleiner Braenfuß.

In syluis montium Ri-
phæorum.

Iulio fert iulos vt prior,
sed minores.

*Musculus ramosus flo-
ridus.*

Blüender Moos.

*Musculus terrestris vul-
garis.*

Erd Moos.

Moos.

Vbiuis notus.

*Musculus terrestris mi-
nor.*

Musculus terrestris denti-
culatus Lobel.

Kleiner Erd Moos.

*Musculus terrestris denti-
culatus 2.*

Musculus terrestris repens
Clus. H.

Kriechender Erd Moos.

*Musculus saxatilis al-
pinus.*

Selago 3. Thal.

Myrmaw Sil.

Radix tenuis, fibrosa, do-
drantales aliquot thyrsulos
mediocres emittit rectos,
prope radicem angustius fi-
bi cohærentes, superius verò
latius à se inuicem disce-
dentes, in summo plerunq;
diuicatos, foliolis Musci
clauati vndiquaq; densis ob-
uestitos virentibus. Ab infi-
mo coliculo ad summum vs-
que circumcirca inter folio-
la emicant flosculi luteoli bi-
folij, remittentes minutissi-
mum paleaceum semen. Gi-
gantæorum montium rupi-
bus & saxis adhæret Musci
instar.

S 3

Odoris

Odoris & saporis expers.
Hellebori instar vehementer purgat tam per aluum quam per vomitum.

Rustici alpini, suspicione hausti veneni, eius decocto vtuntur.

Muscus saxatilis Hepaticus I.

Vide Hepatica fontana.

Muscus saxatilis Hepaticus II. seu purpureus.

Lichenis aliud genus, Thal.

Βέβρον seu αλδύχων, Dod.

Leberfrant / Sil.

Steinflechten.

Colore differt. Alius nigricat, alius flauentior, alius cinereus magis, candidus alius, alius subniger, alius tandem subruher Hepatis colore.

Nascitur aut humi, aut saxis adhæret, aut truncis arborum putridis, nonnunquam & in Ericetis.

Subrubro vulgus pro Lichene vero, in Hepatis affectibus & nothis febribus vtitur.

Muscus montanus Corallinaformis.

Muscus Corallinus seu Co-

rallina montana, Tabern.

Berg Corallen Moos.

Corallinam facie, colore & duritie refert. In summis Suditorum iugis roridas petras lambit.

Muscus filicinus.

Garren Moos.

Muscus lapideus.

Stein Moos.

Supra saxa nascitur.

Ad Calculos frangendos valet.

Muscus Tegularum.

Siegel Moos.

Hepatis obstructions aperit & Ictericis potu medetur.

Muscus Crani humani.

Todten Kopff Moos.

Birnschädel Moos.

Siccandi vi pollet. Ad immodicos sanguinis fluores compescendos certum remedium.

Myrrhis montana.

Cerefolium syluestre.

Bergkörffel.

Ad riuulos montium herbidis & pratensibus radice perennat. Flores fine Maij & initio Iunij in umbella suau-

suauiter rubei ; folia Cere-
folij Hispanici odorata , a-
mara nonnihil & tenuium
partium.

Napellus maior.

A ^{ἰσχυρότερος.}
Napellus vulgaris, Cl. P.
Napellus verus cœruleus,
Aduers.

Aconitū Lycoctonon cœ-
ruleum, *Gesn.*

Vulparia, vulpicida.

fuchswurtz.

Würgling / Siegen Tod.

Eisenhüthn.

Blawfappenblumen.

Luxuriat vbertim in ac-
cliuibus Alpium saltubus læ-
tis & herbidis. Augusto flo-
ret. Venenum est pernicio-
sum & toto genere corpori
nostro aduersatur.

Capras enecat, si ab ijs de-
uoretur. Cuius antipharma-
cum est butyrum simplex vel
cum Sigillata, quod mon-
tium incolæ optimè norunt.

Radix Napiformis recens
cum squama Aeris commi-
xta panaricum, vulgò den
Wurm curat, Rusticorum
experimento.

Napellus minor.

Napellus angustifolius.

Aconitum lycoctonon cœ-

ruleum paruum, *Dodon.*

Blein fuchs wurtz.

In saltubus montosis ad
Boberum fluuium.

Nasturtium aquaticum.

Kap Saurw.

Σισυμβριον ἑνεον, Diosc.

Sisymbrium aquaticum,
Mattiol.

Cratœæ Sion Erucæfo-
lium, *Lobel.*

Sium vulgare *Mattiol.*

Lugdun.

Nasturtiaria.

Brunnenfresse.

Wasserfresse.

Vbiq; circa riuulos fon-
ticulosq; limpidos fruticat.

Per totam hyemem ferè
ex montanis ad epulas in-
fertur & acetariorum locum
explet. Minus acre est quàm
Nasturtium.

Expurgat Hepar, prodest
Spleneticis, Hydropicis, cal-
culosis & febricitantibus nō
inutile.

*Nasturtium aquaticum
minus.*

Cratœæ Sion minus, *Ad-
uers.*

Bitter Brunnfresse / Hirs-
berg.

In riguis, aquosis & pra-
tis humidioribus.

Plus

Plus amaredinis obtinet,
palato minus gratum. Re-
cens cum Pyrethro ex aceto
decoctum in Scorbuto seu
Stomacace haud contem-
nendi vsus.

Nasturtium pratense.

Σιτρουγεον ἑτερον, Diosc.

Cardamine pratensis.

Hyberis, *Fuchf.*

Iberis seu Cardamantice

Nasturtij folio, *Thal.*

Wiesenfresse.

Wildefresse.

Gauchblume.

Prouenit in pratis, hortis
alijsque riguis & humectis
locis.

Imbecillius est priori. Nā
minus calefacit. Huius in
flore quadruplex differentia
obseruatur. Lacteus enim
est, purpureus, simplex &
plenus. In riguis prope
Hirsbergam.

*Nasturtium hyemale la-
tifolium.*

Κυδοβαν, Diosc.

Accipitrina latifolia.

Pseudobunias, *Aduersf.*

Bunium adulterinum.

Barbarea, *Dod.*

Scopa regia seu Sideritis
latissima, *Fuchf.*

Winterfresse.

Schnödsenff.

Gabichsfrant / Sil.

Arvis delectatur humidis,
& veruactis depressioribus:
glareosis etiam ad ripā Bo-
beri, Iulio floret, Septembri
semine prægnans.

Gustanti primū est sub-
acris & amara, dein adstrin-
git. Calefacit & siccatur, va-
lenter extergit, Nasturtio fa-
cultate similis.

Vulneribus medetur &
putridis gingiuarum vlce-
ribus.

Semen admodum acre te-
nuiumq; partium, vrinas e-
uocat, ac coherentes calcu-
losas arenulas dissoluit ac
expellit.

Nasturtium rugiofolium.

Thaliætrum *Dod. Lugdun.*
& *Tabern.*

Absinthium Seriphium,
Mattiol.

Sophia Chirurgorum, *Lob.*

Accipitrina tenuifolia,

Casalp.

Wormfrant.

Wellsähmen.

Gabichsfrant / Sil.

Circa loca habitata Iunio
floret.

Odoris & saporis ingrati.
Calefacit mediocriter, ad-
iuncta refrigerante, siccante ad

te adstringenteq; facultate.
Necat semen lumbricos,
sistit aluum. Ad dysente-
riam & alui fluores vulgo
notum remedium.

Nasturtium uiarum.

Ἰβερὶς Καρδαμαντῆ.

Ἀνεμόδεσμος.

Iberis Matt. Dodon.

Iberis Cardamantica, Lob.

Wegefresse / *sil.*

Klein Besenfraut.

Secus itinera agrorumq;
incultas extremitates.

Calefacit 4. recessu, mi-
nus tamen siccatur.

Radix contusa Sciaticæ
medetur.

Nasturtium montanum.

Iberis montana.

Bergfresse.

Integra prata Maio sæpe
cooperit.

Nasturtium alpinum.

Cardamine alpina, Tab.

Nasturtium petrum.

Bergfresse.

Steinfresse.

Petrosis & humidis Sudi-
torum iugis.

Radix fibrosa, capillaris,
coliculi tenues, dodrantes:
flosculi candidi: semen in
capsulis minutissimum.

Nigella arvensis.

Μελάνθιον siue γιθ, Diosc.

Melanthium flore maiore.

Melanthium sylv. Lob.

Melanthium agreste, Tab.

Wilder schwarzer Kümcl.

Grosse Ledichblume.

Oritur in campis inter se-
getes.

Catarrhos discutit, Den-
tium dolores lenit, nidore
Serpentes fugat.

Ad omnia efficax perinde
ac satiu habetur.

Nummularia.

Centimorbia, Aduers.

Hirudinaria.

Serpentina minor.

Egelkraut.

Pfennigkraut.

Schlangenkraut.

In scrobium ripis & vligi-
nosis aggeribus frequenter
latitat.

Glutinandi vi prædita est.

Ad vlcera oris & Stoma-
cacen coquitur in lacte ca-
prillo.

Ad vulnerarias potiones
à Chirurgis adhibetur.

Nymphaea candida.

Νυμφαία, Diosc.

Nenuphar album, Officin.

Heraclia, Plin.

Weisse Seeblumen.

Weisse SeeRosen.

τ

Weisse

Weisse Seckänlin / Tollil-
gen / *Sil.*

Stagnantium & residuum
aquarum incola.

Colliguntur Iunio & Iu-
lio flores ad Medicos vsus.

Flores refrigerant, hume-
stant. Ad capitis & Hepa-
tis calidiores affectus com-
mendantur. Radix vino ni-
gro decocta, potu abundan-
tiam Mensium efficaci &
certo remedio sistit.

Nymphaea lutea.

Νυμφαία ἄνη, *Diosc.* quod
vim genitalem conseruet in-
hibendo Venerem & afflu-
entiam genituræ.

Nenuphar, siue Papauer
palustre, *Offic.*

Geele Seckblumen.

Geele Seckänlin / *2 Sil.*

Geele Meyer Rosen / *5 Sil.*

Nuspiam nisi in aquis le-
niter labentibus, paludibus
& amplioribus fosis.

Flores lucent Maio & Iu-
nio odorati.

Desiccant Radix & semen
citra omnem morsum: non-
nihil etiam abstergunt.

Radix sicca cum vino po-
ta singulari remedio Men-
sium abundantiam sistit.

Coeliacis & Dysentericis
auxiliatur, Lienem absorbit.

Renū & vesicæ calidis mor-
bis medetur.

Folia Renibus admota Se-
minis profluuium seu Go-
norrhœam sistunt.

Onobrychis.

Onobrychis, Dodon.

Polygala vera, *Dalech.*

Polygala Rhetica, *Gesn.*

Caput gallinaceum, *Bel-
garum.*

Sanenkopff.

Wild Hopffenfraut.

Apricis & aridis ad via-
rum margines. Rarefacien-
di & digerendi vim obtinet.

Ononis spinosa.

'Ouaris siue 'Auaris *Diosc.* qua-
si Asinaria seu inutilis no-
xiaque.

Anonis Matt. *Fuchs.*

Acutella.

Resta bonis, *Offic.*

Stallfraut.

Samhechel.

Nascitur incultis agris se-
cus vias: floret Iulio & Au-
gusto.

Radix calefac. ordine 3.
Abstergit, incidit, extenuat,
vrinas prouocat & lapides
confringit.

Decoctum eius potū Hæ-
morrhoidas sanat.

Ono-

Ononis sine spinis.

Ononis 3. nō spinosa purpurea, *Tabern.*

Purpurbraun Stallfraut.

Ruhſcheiſſe / ob tætozem vulgo.

Pæſſim perenni radice in aggeribus ſecus itinera fructuat.

Tota videtur pinguis & hirsuta folijs maioribus & tantillum crenatis. Flores purpurei Piſi, Iulio & Auguſto grauiter olent & hircum ſpirant.

Radix Calculoſis vtilis.

Ononis lutea.

Anonis mitior flore luteo, *Cluſ. P.*

Ononis 4. ſine ſpina, lutea, *Tabern.*

Natrix *Plin. Herbar. Lob.*

Gel Stallfraut.

Aliquando reperitur luteo flore, ſed minus frequēs.

Ophiogloſſum.

Ὠφίγγλωσσος.

Lingua vulneraria, *Cord.*

Echiogloſſum.

Wäſterzünplin.

Einblatt oder rechter Wiesderthon mit Zünplin / *Sil.*

Præſimon oſis Maio & Iunio occurrit inter gramina.

Sapor herbæ ſubdulcis, modicè tenuis & aliquantulum glutinofus. Radix paulatim amareſcit & ſubacris eſt. Vulneraria eſt.

Succus illitus apum iſtibus auxiliatur.

Orchis I.

Orchis maximis bulbis.

Orchis 1. noſtra maior, *Lobel.*

Cynoforchis prior, *Dodon.*

Orchis, *Offic.*

Knabenfraut.

Bulbi Iuglandis magnitudine ſunt, candidi, ſucco viſcido albo turgent

Circa Poidebrad Boemix in monticulo VVoſskobr: Maio floret.

Abundat humiditate excrementitia & flatuoſa, ſapore ſubdulci.

Bulbus ex vino potus cum modico Piperis, Impotentes & frigidos mirifice iuuat.

Condiuntur pro Heſticis & rabid ſ.

Orchis II.

Orchis diphylla flore albo.

Hermaphroditica 2. Corn. *Gem. Lob. I.*

Teſticulus leucanthemus, *Matth.*

Teſticulus bifolius, *Cord.*

T 2

Saty-

Satyrion Diosc. *Fuchf.* à Satyrorum lasciuia & libidine. Crengblum.

Weis Knabenfraut.

Stendelwurz mit weissen blumen.

Weisser Guckuck / *Sil.*

Copiosè in pratis montium siccioribus & alijs apicis Ericetis prouenit.

Flores Iunio, Iulio spicati candidi auiculæ volantis figura prominent, suauissimi odoris. Calefaciunt & humectant, gustu dulces, excrementitij & flatulenti: Venerem excitant. Saccharo conseruantur Hecticis, exhaustis, Phthisicis salubres. Impotentes additis aromatibus mirificè recreant.

Orchis III.

Orchis triphylla.

Satyrion trifolium, *Fuchf.*

A priori numero foliorum solummodo discernitur.

Orchis IV.

Orchis lutea.

Testicul⁹ Muscarius 3. *Tab.*

Knabenfraut mit gelben blumen.

Gelblichter Guckuck.

Iunij initio flores sublu- teos erigit pratis montosis aridioribus.

Folia vt plurimum secundum caulem habet quaternaria: Radices bulbosæ, teretes, oblongæ.

Orchis V.

Orchis minima.

Orchis spiralis minor, *Lob.*

Testiculus minor odoratus, *Tabern.*

Satyrion exiguum & 7.

Trag.

Standhart.

Mariendrehen.

Klein wolriechend Knabenfraut.

Æditis nascitur campis iisque subcaluis, veluti in Probsthan sub acuto monte.

Flosculi Augusto coliculi palmarem, tenuem inuoluti clauiculatim ambiunt odorati, candidi; bulbi longiusculi bini subsunt.

Orchis VI.

Testiculus odoratus maior, *Dod.*

Tetrorchis vel Triorchis alba spiralis vel autumnalis, *Lobel.*

Gros wolriechend Knabenfraut.

Iisdem fruitur natalitijs.

Ei per omnia assimilis, nisi quod tota maior sit & bulbis oblongis, ternis, aliquan-

quando quatuor donetur.

Orchis dactylitis palustris 1.

Orchis dactylitis palustris polyphyllos.

Serapias palustris latifolia, *Lobel.*

Satyrion basilicum foliosum, *Dod.*

Palma Christi palustris 3. *Tabern.*

Wasser Sendelwurz.

Roter Guckuck / vulgò.

Adeò multis secundum caulem folijs abundat, vt etiam inter ipsos flores rubentes sed tamè minora exeant.

Maio pratis humidioribus frequens.

Orchis dactylitis palustris II.

Serapias palustris 2. leptophylla, *Lobel.*

Palma Christi palustris 1. *Tabern.*

Gesprenge Anabenfraut.

Folia sunt maculosa, inter quæ emicant flosculi rubentes.

Orchis dactylitis palustris III.

Palma Christi palustris 2. *Tabern.*

Cynosorchis palustris læ-

uifolio & angusto, *Cornel. Gemma.*

Schmalblettericht Knabenfraut.

Pratis altioribus montiū Maio & Iunio floret. Radix vtraq; quaternis digitis distinguitur: folia angustiora vt plurimum terna.

Orchis dactylitis montana I.

Palma Christi & *Serapias maius læuifolium*, *Lobel.*

Satyrion basilicum mas., *Dodon.*

Palma Christi 1. *Mattiol.*

Sendelwurz *Mennlin.*

Iunio & Iulio montosis occurrit pratis.

Orchis dactylitis montana II.

Palma Christi minor mas., *Tabern.*

Palma Christi minor rubello nitente flore.

Palma angustifolia nullis inspersis punctulis, *Lobel.*

Satyrion basilicum mas.

Klein Sendelwurz *Mennlin.*

Iisdem locis.

Orchis dactylitis montana III.

Palma Christi maculata
T 3 mon-

in montana Tabern.

Scrapias candido flore
montana maculatis folijs
Lobel

Gendelwurtz mit weissen
blumen.

Creuzblum.

Flores candidi, sed macu-
lis purpureis aspersi, nonni-
hil odorati.

*Orchis dactylitis monta-
na* L. P.

Satyrium alpinum angu-
stifolium minus odoratius.

Wolriechend Alpen Gen-
delwurtz.

Folia ei oblonga porra-
cea: flores dilute purpura-
cunt, suauiter odorati in co-
liculis palmaribus.

Nonnisi in summis Sudj-
toru herbidis iugis Augusto
reperitur, veluti vber den
Schnee gruben.

Origanum vulgare.

Огіѣво аѣво, що то огіѣво
yávo quod acuet & illustret
Oculorum aciem.

Origanum sylu. purpure-
um & albo flore.

Origanum siue Onitis
maior Lobel.

Dosten / rote Dosten.
Wolgemuß.

In cultis & apricis monto-
sis nascitur.

Odoratum est & gustu
subacre. Excalefacit, siccat,
aperit, digerit, incidit, re-
soluit. Expectorat: prodest
obstructionibus Pulmonum,
Hepatis, Matricis & Lienis.
Ictericis medetur.

Pulvis sumtus frequenter
Lac Mulieribus anget & In-
fantibus quoq; prodest.

Scabiem, Pruriginem, Pso-
ras in balneis curat.

Additur Cereuisia, & in
dolum suspenditur, ne faci-
le ace scat.

Ornithogalon vernum.

Ornithogalon Pannoni-
cum flore luteo Cl. P.

Silybichium Cord.

Bulbus sylvestris Dodon.

Cepula stellata.

Feldzwiebel.

Ackerzwiebel.

Floret vere, & breui tem-
pore exarescit, inter Fu ma-
rias bulbosas passim lætatur.
In agris etiam trumentarijs.

Radix ad vlcera manan-
tia & depascencia vtilis.
Convulsionibus. Infantium
ex lacte instillatur.

Orobanche.

Огобѣзъ Diefcor.

150770-

Αροβόλας.

Sommerwurtz.

Schmerkraut.

Nascitur in segetibus inter Legumina. Etiam in syluis sub Fagis. Maio & Iunio floret.

Frigida est & humida natura.

Orobis sylvaticus vernus.

Orobis Pannonicus 1.

Clus. P.

Astragalus sylv. vernus.

Arachus latifolius Dod.

Wald Eruen / Wald Wiesen Sil.

In syluis Aprili floret veris nuncius.

Maio & Iunio semen maturascit, quod amaricat & calidiusculum est, absterforia facultatis.

Oxyacantha.

Οξύανθα Diosc. Lobel.

Spina appendix Plin. Gesn.

Pyracantha Cordi.

Cynosbatus Trag.

Sorbus aculeata Nonnull.

Christdorn / Weißdorn.

Mäldorn / Mälbaum.

Bagedorn.

In syluis, sepibus & fruticibus notissima.

Fructus adstringit, roborat, prohibet.

Bacca denorata alui & feminarum sistunt profluua.

Nuclei triti poti Calculos imminuunt.

Radix illita aculeos & spicula extrahit. Lignum tenax, densum à fabris ferrarijs ad manubria Malleorum expetitur.

Aqua ex floribus destillatur Pleureticis utilis.

Panax Heracleum.

PAnaces Heracleum vel

Sphondylium 2. Dodon.

Branca vrsina alpina.

Πάναξ ἡράκλειον.

Πάνακες q. ἄνους πάντων 1. medela omnium morborum.

Grosse Berg Bärenflaw.

In montibus herbidis locis fruticat.

Papauer erraticum maius seu 1.

Μήκων ῥόας Diosc. πικρὰ τὸ ἔνν.

Papauer erraticum finidum Mattiol.

Papauer Rhœas seu caduco flore puniceo Aduers.

Papauer rubrum Officin.

Kote Kornblumen Sil.

Feld Mohn.

Klapper Rosen.

Belle colorati flores Maio ac Iunio pulchritudine venusta-

multateque quandam gratiam conciliant.

Refrigerant & soporem inducunt Flores. Ex Scabiosa, Cardui benedicti, aut Cerefolij aqua contra Laterum dolores & sanguinis sputum vtiliter bibuntur.

Syrupus è succo pulcerimus coquitur in calidis defluxionibus & Pleuresi vtilissimus: somnum conciliat & tussim ex acri destillatione mulcet.

Folia Igni sacro medentur.

Papauer erraticum minus seu I I.

Αργεμόνη Dioscor.

Argemone capitulo torulis carinato *Lobel.*

Argemone *Lacuna.*

Kleine Blapperrose.

Maior floret inter segetes.

Vis huic absterforia & digerens. Folia illita inflammationes compescunt. Succus argemonas & nubeculas Oculis dispellit.

Papauer erraticum I I I.

Papauer fluidum 3. capitulis longioribus *Lobel.*

Argemone capitulo longiore.

Acker Mohen mit langen Haupteln.

Iisdem natalibus gaudet.

Parietaria.

Ἐλξίν Diosc. Aduers.

Παρήσιον Gal.

Vitriola seu Perdicium

Cels.

Muralis herba *Plin.*

Vrceolaris *Scribon.*

Tag vnd Nacht.

S. Peterskraut.

Glasckraut.

Tröffkraut.

In Muris & parietibus mulcidis oritur.

Sola radix hyeme restat.

Gustu est abstergente, nitroso, bliteo. Abstergit, leniter confringit cum humiditate subfrigida. Iecinoris, Lienis & Renum obstructiones tollit, internos meatus & Matricis præcipuè vitia expurgat.

In Balneo curat scabiem serpentem Infantium, vnde macrescunt, dic *Megeray.*

Additur commodè Emetatibus in Colica, Renum & vteri affectibus.

Parietaria sylvestris.

Sideritis pratensis rubra

Lugdunens.

Euphrasia 2. *Dodon.*

Erico-

Ericoides rubrum *Thal.*

Odontites *Plin. Tabern.*

Triticum vaccinum flore
purpureo.

Wild Tag und Nacht *Sil.*

Brauner Augentrost.

Vliginosis non aridis pro-
uenit locis. In agris segete
demessa, pagorumq; areis
Iulio & aliquot post mensi-
bus cum flore viget.

Gustu amara est & tenui-
um partium, Abstergendi
vi pollet.

Vulgus herbam tritam in
calceos conijcit singulari
experimento immodicos
Menses reprimentem.

*Pastinaca sylvestris la-
tifolia.*

Elaphoboscum errati-
cum.

Sisarum erraticum.

Branca Leonina.

Wild Morellen.

Girtz Marillen.

Kauher Gierisch *Sil.*

Folia obtinet Pastinacæ,
seu potius Angelicæ errati-
cæ, magis nigricantia, tan-
tillum hirsuta, odore ferè
Mirrhidis: cuius & semen æ-
mulatur oblongum, nigri-
cans, splendens, sed minus,
Septembri maturescens. Ra-

dix in fibras diuaticatur
crassas, saporis & odoris aro-
matici.

Luxuriat restibili prouen-
tu ad margines & sepes hor-
torum.

Gustu amara est & odo-
rata cum leuicula adstricti-
one.

*Pastinaca sylu. tenui-
folia.*

Δάκτυλος ἀγριος.

Daucus vulgaris *Clus. P.*

Daucus *Offic.*

Carotta sylvestris *Vulgi.*

Nidus Avis.

Wilde Möhren.

Vogels Nest.

In campestribus, locis in-
cultis, collibus amœnis &
aggeribus secus itinera fre-
quens.

Augusto semen legitur:
flore lunio.

Semen ad omnia poten-
tius satiuæ.

Calefacit, siccat, aperit,
attenuat, vrinas mouet &
Menses prouocat.

Confert ijs, quos vrinæ
difficultas torquet, aut late-
ralis dolor excruciat, aut
quibus aqua Cutim subiuit.
Aduersus Ventriculi & Coli
dolores vtile.

In vertigine & Cephalal-
gia

gia vulgi vsitatum remedium.

Periclymenum rectum.

Periclymenum Allobrogum seu Periclymenon rectum *Aduers.*

Xylosteum *Dod.*

Orcheocarpus *Cord.*

Beinhölzlin.

Hunds Kirschen } *Sil.*

Teuffels Kirschen }

Passim in Conuallibus montium altissimorum syluosis occurrit.

Ligni materies candidissima ossium duritiem æquat.

Persicaria minor acris.

Ῥοπέριος *Diosc.*

Persicaria mordax.

Pulicaria mascula *Brunfels.*

Wasser Pfeffer.

Mückenfraut.

Glöckfraut.

Brennender Kottich *Sil.*

In scrobibus aquâ stillantibus & herbidis vdis ad vrbes & Pagos nihil vulgatius.

Gustu acris & feruida linguam vellicans. Incidit, extenuat, aperit, resoluit, discutit, exulcerat.

Tumores veteres duritiæsq; discutit & sugillata de-

let. Vulnera & vlcera mirificè purgat.

Herba recens carnibus apposita, eas à tinea & vermicibus vindicat.

Cubiculis inspergitur ad pulices enecandos.

Persicaria maior mitis.

Persicaria mitis maculosa *Aduers.*

Persicaria maculata *Thal.*

Pulicaria femina.

Glöckfraut.

Kottich.

Glecken Kottich.

Nascitur humecto solo in hortis, agris fructiferis. Iulio & Augusto florer.

Temperiem habet frigidam & nonnihil siccam.

Inflammationibus incipientibus & recentibus vulneribus prodest impolita.

Persicaria pusilla repens.

Persicaria pumila *Tabern.*

Klein liegender Kottich.

Iisdem locis nascitur.

Peruinca.

Clematis daphnoides *Lebel.*

Vinca peruinca.

Viola Mortuorum.

Κλήματις δαφνοειδὴς *Diosc.* ἐπὶ τῶν κλημάτων à sarmentis seu malleo-

malleolis vitis.)

Syngrün/ Ingrün.

Wintergrün.

Beerwinckel Sil.

Secus mœnia oppidorum
& urbium, nec non in syluis,
vmbrosis locis oritur. Vere
flore. Refrigerat, adstrin-
git, siccatur. Vulneraria est.
Contra Pecorum veneficia
vetulis nota.

Petasites Herbariorum.

Παρασίτης Diosc. *ἄγ. τὸ wild-
ov.*

Βήχον μέγα.

Εὐραδύναμος.

Petasites flore purpureo.

Tussilago maior Mattiol.

Radix pestilentialis.

Neunfrastwurz }

Schweißwurz } Sil.

Pestilenzwurz.

In pratis rignis, ad riuu-
lorum margines. Aprili flo-
res ostentat purpureos, qui
Maio succrescentibus folijs
absq; semine pereunt. Ra-
dix calefacit, siccatur 2^o. gra-
du; attenuat, incidit, abster-
git. Amara gustu & ingrati
odoris. Pestilentibus febri-
bus malignisque publicè
grassantib. plurimùm com-
mendatur. Vteri præfocati-
ones tollit, lumbricos Ven-
tris interimit, Pectorisq; af-

fectibus haud inconueniens.

Folia eius grandia Caput
à Solis æstu vice galeri de-
fendere possunt: recentia
manantibus & erodentibus
vulneribus vtiliter impo-
nuntur.

Petasites alpina.

Εὐραδύναμος ἀγρος.

Petasites maior alpina flo-
re albo.

Petasites alba siue femina.

Wilde Neunfrast.

Montibus altioribus humi-
dis & vmbrosis familiaris.
Flores sublutei Aprili &
Maij initio conspicui.

Amara est radix acrimo-
nia linguam feriens.

Myrrham nonnihil sapo-
re refert. Earundem cum
priori virium.

Phyllitis.

Φυλλίτις ἢ ἀπὸ λίνου Diosc.

Foliola.

Lingua ceruina.

Scolopendrium vulgò Of-
ficin.

Hirschzunge.

Hirschzungenkraut.

Ad Carpathum Marco-
mannorumque montes vm-
brosis vdisque saxis quouis
Anni tempore viret. In Ri-
phæis non item, nisi in Acu-
to mon-

to monte & parietinis puteorum.

Sapore est exiccante non ingrato & acerbo subadstringente.

Lienibus medetur. Diarrhœas, Dysenteriam & alui profluuia pota iuuat.

In vino Serpentium moribus auxiliatur & gargari-
zatu Columellam prolapsam erigit.

Aqua destillata ad febres pestilentes magnam opem fert.

Picea.

Πίνος, Dod.

Πεύων, Diosc.

Πίνος ἀγρία, Teoph. Nonn.

Abies 1. & rubra, Trag.

Abies femina, Bellon.

Fichtenbaum/ Fichte.

Rote Tanne.

Piceâ perpetuò virent Sudeti montes.

Materies ad ædium fabricas, vasa Cereuisiaria & alia domestica vtensilia aptissima habetur.

Cortex siccatur, adstringit Pini modo. Coriarijs expetit ad densanda coria, vulgo Lanh/ Looh.

Folia trita illita potenter inflammationes leniunt.

Picea Resina.

Ῥητίνη ἔνεα.

Ῥητίνη πικρὴ, Gal.

Harz.

Fichtenharz.

Epicea sponte vel vuln-
rata exit, mox concrescens.
Hæc decocta donec perdito
natiuo odore friabilis & ari-
da redditur, vocatur Resina
cocta.

Pix fricta.

Geschmelzet Harz.

Weis Harz.

Eligitur ad vsum Medicû
candida, pura, sordium &
adustionis expers.

Sapore est amariuscyla &
subacris. Calefacit, siccatur,
mollit, discutit, expurgat:
tenuium partium.

Malagmatis Acopisq; mi-
scetur. Vnguentis & empla-
stris commodè additur.

Cereuisiæ Hordeacæ Nô-
nulli incoquunt, vt ei gratio-
rem saporem concilient.

Pix nigra.

Ῥητίνη ἔνεα, Diosc.

Ῥητίνη πικρὴ.

Pix secundò decocta.

Pech/ schwarz Pech.

Fit ex Resina Piceæ & Pi-
ni sylvestris.

Frequens eius vsus ad do-
lia Cereuisiaria incrustanda.

Probatur nigra, pura,
pin-

pinguis, odorata. Excalefacit, siccatur. Malactica est, durities emollit, pus promouet, tubercula panosq; discutit, vlcera caua replet, vulnerarijs commodè permiscetur.

Pilosella maior.

Mais &c., Diosc.

Pilosella repens hirsuta,
C. B.

Auricula Muris maior.

Neusöhrlin.

Gros Nagelfraut.

Montibus & aggeribus
herbidis nota.

Aliquantulum est calida & resiccans, adstrictoria facultatis particeps cum quadam tenuitate. Adstringit, abstergit, incidit, glutinat, cohibet, siccatur.

Valet ad Dysenterias, alui profluua, Lienis tumores, Calculum, Mammarum tumores pota seu admota.

In puluere ex vino rubro aut aqua consolidæ maioris sumta integrè sanat Enterocelas.

Pilosella minor.

Pilosella vulgaris.

Auricula muris vulgarior.

Blein Neusöhrlin.

Nagelfraut.

Asperis, sabulosis & pratis siccioribus, vbiuis ferè cognita.

Ex vino Hepatis infarctus tollit, Icterus extrahit, Renes purgat & Calculum deijcit. Efficaci aduersus Ramicem commendatur remedio.

Vulneraria est, & à Chirurgis ad vnguenta & Emplastra requiritur.

Additur frequenter Balneis in Icteria, calculo & vteri vitij.

Pilosella alpina.

Berg Neusöhrlin.

Folia habet maiori ferè similia, nisi quod sint longiora, molliora & hirsutiora.

In montibus altis, herbis occurrit.

Pimpinella maior.

Saxifragia magna, Dod.

Saxifragia vulgaris maior, Clus. P.

Bimpinella.

Grosse Bibinell.

Ros Bibinell.

Stein Peterlin.

In pratis & pomærijs saxosis herbido solo oritur. Iulio & Augusto floret.

Minus acris est & seruet, quàm Minor.

V 3

Cale-

Calefacit, siccatur, attenuat, dissolvit, urinas movet, venenis resistit, sudores provocat: Iecinoris Lienisque obstructions aperit: flatus discutit.

Præstat ad pectoris, intestinorum, vteri & vesicæ incommoda, ad casum & stranguriam, quam subleuat.

*Pimpinella maior
splendens.*

Gleissende Bibinelle.
Folia ex atro virentia splendent. Rarior est vulgari, at eiusdem usus.

Pimpinella minor.

Pimpinella simplic. Offic.
Lobel.

Petrifindula.
Saxifragia hircina.
Tragoselinum minus.
Kleine Bibinell.
Bocks Peterlin.

Asperis & saxosis montium delectatur locis.

Sapor manifestè arguit acriorem & validiorem Majori vim & efficaciam.

Calefac. & siccatur 3. ordine. Usus eius frequens ad sudores eliciendos, tormina ventris, calculum & Menstruorum retentionem.

Ictericis, Hydropicis, &

ijs qui angustia Præcordiorum ex scabie percussa sentiunt, eximium præsidium.

*Pimpinella minor
crispa.*

Bipinella seu Saxifragia minor, Lob.

Pimpinella petraea seu saxatilis.

Tragoselinum petraeum.

Saxifragia parva, Diosc.

Branspe Bibinell.

Stein Bibinell.

Folia ei sunt minutissime dissecta ac serrata carui instar.

Petrosis & arenosis delectatur.

Iisdem cum priori pollet viribus.

Pinafter.

Pinus sylu. Mattioli.

Piceaster, Pet. Bellon.

Zyfer / Zyferholz.

Wild Fichtenbaum.

Vulgatæ notitiæ arbor, qua montosis & cliuosis integræ sylvæ conuestiuntur.

Strobilos domesticis minores ferunt.

Cortex siccior est domestica, ut & Resina calidior.

Succus conorum recentiorum vuluam angustiorē reddit infusus & Mammæ in virgi-

virginibus nimis extuberantes cohibet.

Coni recentes decocti in infessu vesicæ & vteri vlcera sanant.

Ex Pinastro vi ignium Pix excoquitur.

Teda, $\Delta\alpha$, Ryn/ Rynholtz vulgò, pinguisima est pinastri materia: inde faces fiunt & fuligo ad atramenti librarij confectionem.

Teda in aceto decocta collutu dentium dolores sopit. Emplastris addita Anthracibus pestilentialib. percommoda.

Pinaster alpin. repens.

Pinus humilis alpina.

Pinaster pumilio.

Pinus sylu. repens, *Mattiol.*

$\Pi\acute{\iota}\nu\varsigma \alpha\acute{\iota}\sigma\acute{\epsilon}\lambda\epsilon\chi\omicron\varsigma.$

Klein Alpen Byfer:

Caudicem nullum edit, sed humo tenus ramos à radice fundit, qui longo tractu repunt.

Non nisi summis montium iugis obuiam: ubi sæpe longissima & ampla spacia occupat.

Pisum sylu. perenne.

Pisum sylu. *Aduers.*

Pisum syluestre pannonicum.

Wild Erbsen.

Sarmgicht kraut.

Inter laxa montosis & asperis Iulio floret. Grana deuorata mederi Colicæ creduntur.

Pisum syluestre I I.

Pisum minus alterum.

Klein Wilde Erbsen.

Semen auicularum cibus.

Plantago maior.

$\text{Ἀγρόγλασσον, Diosc. ἀπὸ τῆς τοῦ ἀγροῦ γλάσσης.}$

$\text{Ἀγρόγλασσον πολυώκον.}$

Plantago maior latifolia,

Aduersar.

Plantago rubra, *Trag.*

Arnoglossa, *Lob.*

Plantago septineruia.

Grosser Wegericht.

Roter Wegericht.

Breiter Wegericht.

Plurima humidis locis, in aruis, hortis, secus itinera & sepes. Iunio floret, semen Augusto dat.

Mistæ est temperaturæ. Habet enim quiddam aqueum frigidum; quiddam verò & austerum, quod terreum & siccum.

Refrigerat & desiccatur ordine 2.

Olus coctum estur, Dysentericis & coeliacis benefacit, Comi-

Comitiales & Asthmaticos iuuat. Cum lente Alicæue sorbitione stomachum roborat, & hydropicis, qui Leucophlegmatia laborant, prodest.

Vulneraria est herba, vulnera & fistulas sanat. Succus aurium doloribus & Lippitudinibus oculorum utilissimè instillatur.

Gingiuus sanguinolentis & sanguinem reiicientibus potus confert; phthisicis & tabidis salubris.

Radix crassiorum est partium, minus refrigerat, siccatur & nonnihil abstergit.

Dentium dolores mulcet collutione & commanducatione. Iecoris obstructions tollit, Renum & Vesicæ vulnera sanat.

Semen siccioris est facultatis & minus frigida, subtiliumq; partium. Alui fluxus, Dysenterias, & vteri Hæmorrhagiam sistit.

Liquor stillatitius calidas Podagras in primo impetu mirifice lenit: Hydropicis utiliter bibitur.

Plantago media.

*Αγρόπωσον μέσον.

Plantago maior incana, Aduers.

Plantago latifolia, Trag.
Plantago quinqueruia.
Mittel Wegericht.

Wegebreit/ Wegetritt.

In hortis & secus vias ut prior, nascitur, eiusdem facultatis.

Morsibus Canis, ambustis, inflammationibus, calidis Podagris folia conueniunt. Tusa addito Salis modico, Luxatis dolores & tumores tollunt.

Plantago minor.

*Αγρόπωσον μικρόν, πενταδεν-
τον.

Plantago longifolia vulgò lanceolata.

Plantago quinqueruia seu Lanceola Aduers.

Spitzer Wegerich.

Bleiner Wegebreit.

Hunds Ripp.

Floret initio æstatis, semen Augusto legitur.

Locis incultis & vijs vulgo nota.

Siccior est & commendatiore dote ad vulnerarias potiones, vnguenta & Hernias, etiam vulgi experimento.

Plantago aquatica.

Plantago palustris.

Plantago aquatica folijs
Betz

Betæ aut Plantaginis Galij
albi flore Lobel.

Wasser Wegerich.

Groschfraut Sil.

Grosch Wegerich.

Piscinis, fosis alijsq; stagnantibus perquam familiaris.

Refrigerat & siccatur, non prorsus caloris expers, cum aliquantulum acris abstergendi vim habeat. Proci-dentia curat, rubentem Podagram, Capitis dolorem à calida causa mulcet, cruento sputo vrineq; medetur.

Radices in vino decoctæ, ijs qui Calculo Renum & Vesicæ molestantur solatio sunt.

Plantago aquatica minor.

Plantago aquatica angustifolia humilis.

Klein Wasser Wegerich.

Vdis reperitur.

Polygala cæruleo flore.

Polygala Recentiorum Lob.

Flos Ambarualis Dod. Tr.

Πολύγαλον, παρὰ τὸ αὐξάνειν γάλα.

Wasserzünglin }
Wasserblümlin } Sil.

Ramseln.

Gros Creutzblümlin.

Nusquam non in pratis alijsq; campestribus herbis Maio, Iunio, Iulio occurrit.

Pota seu in sorbitionibus sumta Lactis vbertatem reuocare fama est.

Tusa imposita inflammationes & tumores lenit.

Polygala rubris floribus.

Polygala incarnata.

Polygala flore purpureo.

Leibfarben Wasserblümlin.

Polygala albis floribus.

Polygalon floribus candidis. Trag.

Polygala maior alba, Tabern.

Grosse weisse Wasserblümlin.

Polygala repens.

Polygala repens Nuphorum.

Kriechend Wasserblümlin.

Polygala Mattioli.

Polygala, Mattioli.

Kleine geel Bergwicken.

Planta est pusilla flosculis luteis Trifolij corniculati, sed multò minoribus: semen in filiquulis.

X

Aesta-

Aestate flōret apricis & incultis locis circa Scharzlarium.

Gustus est adstringentis.

Polygonatum latifolium.

Polygonatum Lob. Dod.

Sigillum Solomonis platyphyllum.

Πολυχνητον Diosc. ἐπὶ πολλῶν γονάτων, à frequentibus geniculis & internodijs seu articulis radice.

Gelenckwurtz.

Weißwurtz.

Schminckwurtz.

Nascitur in montibus, collibus & sylvis.

Maiō & Iunio flōret, Augusto baccae conspiciuntur.

Mistam habet facultatem. Adstrictionis enim pariter & acrimoniae & amaritudinis particeps, & indicibilis cuiusdam insuauitatis.

Radix vulneraria est, Vulneribus illinitur efficaciter, naeuos & maculas extergit.

Feminae eā ad fucos vuntur.

Additur Emplastris Herniarijs.

Polygonatum angustifolium.

Polygonatum tenuifolium, Cordi.

Polygonatum minus Rubiae folijs, Lobel.

Polygonatum vulgatius Matt. Camer.

Serpentaria, à versicoloribus Serpentum maculis, quibus caulis respersus est.

Weißwurtz weiblin.

Schlangentraut/ } Sil.

Wilder Dreyoeker/ }

Frequentius est latifolio in montibus herbidis & collibus syluosis.

Caules ad duorum cubitorum altitudinē assurgunt, qui variegati coloribus instar Dracontij maioris baccae rubras Augusto ostendunt. Ad rupturas commendatur & venenis resistit.

Aqua destill. faciem exornat, & maculas cutis abstergit.

Polygonatum III. latifolium Cl. P.

Polygonatum latifolium ramosum.

Laurus Alexandrina, Matt.

Cornus Silesiaca humilis.

Δάφνη Ἀλεξανδρεία Diosc.

Nonn.

Schwalbenwurtz.

Filztraut.

Sapffentraut.

Radix exilis, fulua, villosa, plurimis crassiusculis fibris

bris veluti intertexta: fructus Corni oblongi primum virentes, dein Augusto rubescunt multa grana albicantia claudentes. Iulio flosculos promit stellatos palentes.

Humidis & vmbrosis Suditorum locis.

Radix contra venena efficac, Lue Venerea affectis utilis. Regium morbum difficutit pota.

Polygonum maius.

Polygonum mas vulgare, Aduers.

Corrigiola, Centumnodia.

Herba sanguinalis.

Πολύγονον μέγαν, Diosc.

Sāhngraß/ Sil.

Weggras/ Wegtritt.

Blutkraut.

Hoc nihil contemptius ac vulgatus habent compita & rura.

Iunio prorumpit, æstate floret, autumno semine prægnat.

Adstringit mediocriter cū frigido aqueo. Siccat, repellit, sistit omnes fluxus, vrinam ducit, glutinat, venenis medetur, calculum per vrinam ducit. In fluxu Sanguinis cum vino stiptico remedium præstantissimum.

Polygonum minus.

Polygonum minus polycarpum, Tabern.

Centinodia minor.

Multinodia minor.

Ruella.

Klein Wegetrit.

Knauel.

Klein Knödrich/ Sil.

Sabulosus & aridis passim obuium.

Gustu dulce est. Omnem calorem temperat, sistit fluores alui, Dysenteriam, Meneses nimium fluentes, hæmorrhagiam Narium, pellit calculum, arenulas & vrinam.

Ex aceto coctum vapore eius ori immisso vermiculos dentium enecat, Plebeculæ experimento.

Polygonum folijs rubentibus.

Polygonum rubrum.

Roter Wegetrit.

Rot Sāhngraß/ Sil.

Blutkraut.

Vias & margines agrorum occupat.

Polygonum Coccigerum.

Polygonum Polonicum.

Polygonum minus alterū.

Herba Cancri.

Blutkraut.

✕ ij

Brebas

Brebskraut.

S. Johannis blut.

Radiculis adnascuntur vesiculæ succo rubro turgentes, quæ ut plurimum circa solstitium deprehenduntur, Sole ingrediente Cancrum.

In Polonia frequentius: succus colligitur ad tinctorum usum.

Polypodium.

Πολυπόδιον Diosc.

Filicula.

Steinwurz.

Steinlackritze.

Engelsüffe.

Abundat opacis sylvis & montibus ad radices Quercuum, Fagi, ad petras item muscidas. Præcellit quernum.

Radix dulcis est simul & austera sicca & modicè calidæ naturæ. Purgandi vim habet. Bilem atram & pituitam detrahit.

Additur medicamentis ad Quartanam, Melancholiam & grauiâ Insomnia. Asthmaticis, tussientibus, Hepatis & Lienis obstructionibus conueniens.

Puluis naribus inditus Polypum morbum consumit.

Trita luxatis efficaciter illinitur & aduersus rimas,

quæ inter digitos Manuum & pedum sunt, cum Melle illinitur.

Polytrichon maius.

Polytrichon Apulei Fuchf.

Polytrichum aureum maius Lugdunens.

Adiantum chrysostichon Herbar.

Muscus capillaris Dod.

Gulden Widerthon.

Venushaar.

Wolffegerste Sil.

In altiss. sylvis. è muscosis & antiquis quæ corruerunt arboribus profilit.

In calore & frigore videtur symmetrum, siccum verò aliquantulum.

Potum excreationibus viscosorum & crassorum humorum è Thorace Pulmonibusque conducit. Lapidem frangit, vrinas ducit, Morbo regio correptis & Lienosis auxiliatur.

Strumas discutit.

Lixiuio inditur, ut Capillis conciliet aureum colorem.

Superstitiosè aduersus veneficia commendatur ab Agyptis & vetulis.

Polytrichon medium.

Adian-

Adiantum ἀφύλλον medi-
um Thal.

Mittelgülden Widerthon.
Eadem occupat loca.

Polytrichon minus.

Polytricum aureum mi-
nus Lugdun.

Adiantum aureum mi-
nus Tabern.

Adiantum ἀφύλλον minus
Thal.

Klein gülden Widerthon.

Prædictis omnino simile,
nisi quod breuissimo & sub-
tilissimo protuberet capi-
tulo.

Plerumq; humidis & roru-
lentis saxis adnascitur, in
syluis humectis & viginosis
pratis. Eiusdem vsus.

Populus alba.

Ἀέχνη Dioscor.

Populus alba latifolia Lob.

Arbor admirans vulgo, ob
folium bicolor, supernè can-
dicans, inferiore parte vi-
ride.

Weis Pappelbaum.

Wunderbaum.

Papierbaum.

Weisse Pappelweiden.

Non admodum frequens.
Loca amat viginosa & hu-
mida.

Vim habet humectandi

& siccandi.

Folia decocta, potu tor-
minibus ventris medentur.
Ambusta sanant imposita.

Populus nigra.

Ἀγέεγς. Diosc.

Populus vulgaris Trag.

Albarus Pet. Cresc.

Pappelbaum.

Pappelweide.

Schwarz Pappelweide.

Plantatur & spontè luxu-
riat secus amnes in arcis pa-
gorum & pratis.

Rami ab Agriculis Octo-
bri decerpti exiccantur cum
folijs, ad pabulum hyemale
Capris & Ouibus.

Folia & flores digerunt,
resoluunt, attenuant. Ex
aceto illita Podagricos iu-
uant.

Populi gemma.

Στέγμα, πύλα.

Oculi Populi.

Pappelknospen.

Colliguntur post Aequi-
noctium vernum ad vn-
guenti Populnei confectio-
nem.

Calefaciunt, humectant,
siccant cum partium tenui-
tate: molliunt, digerunt, re-
soluunt.

Acopis & Malagmatis
X 3 com-

commodè miscentur. Con-
tusa cum butyro recenti in-
fulso insolata & illita, ca-
pillis nitorem conciliant.

Populus Libyca.

Κεραϊς Theophr.

Populus alpina Mattiol.

Populus montana Gaz.

Arbor tremula.

Aspe/ Eichenbaum.

Lybischer Pappelpaum.

Sitter Pappel.

Amat aquosos & humi-
dos montium ac sylvarum
tractus.

Nucamenta Aprili colle-
cta aceto macerata contra
Hæmorrhagiam, aut con-
uenienti medicamento im-
buta Naribus induntur.

Ligni materies candidis-
sima & leuissima à tornioni-
bus expetitur.

Porrum alpinum.

Porrum iuncifolium ma-
ius.

Porrum sectium maius.

Cepa se&ilis alpina.

Bergzwibeln Sil.

Lauchzwibel.

Bergschneitlauch.

In conualibus Oupæ &
Mumelæ, Im Alpen vnd
Mumelgrunde & ad lacum
maiorem.

Iisdem pollet viribus vt
Porrum sectium, Hyemis
ac frigoris patiens. Iulio
flore.

Porrum agreste.

Ἀμπελόπρασον Diosc.

Porrum sylvestre Lobel.

Ampeloprasum Dodon.

Wilder Lauch.

Wilder Brießlauch.

Gunds Knoblauch.

In agrorum oritur margi-
nibus. Plus quàm porrum
calefacit, κακὸς ομαχότερον, vrin-
as ac Menfes vehementius
ciet. Contra Serpantium
morsus succus utilis.

*Porrum agreste proli-
ferum.*

Allium seu Moly monta-
num 2. Clus.

Ampeloprasum prolife-
rum Lob.

Pallacana.

Wilder Knoblauch.

Agris nascitur incultis &
quiescentibus.

Calidæ est & siccæ na-
turæ.

*Potamogeton angusti-
folium.*

Ποταμογετον Diosc.

Σταχιδίς.

Pota-

Potamogeton ὑπερφύλλον,
Thalij.

Phyllitis lacustris Cord.

Samfraut.

Seeholdenfraut.

Alumna est aquarum stagnantium, lacustrium & torpentium.

Gultu adstringit, siccatur, refrigerat, densatur. Ex vino dysentericis & Cœliacis medetur.

Potamogeton rotundiorifolius.

Potamogeton λειψύλλον
Thal.

Breitblettericht Samfraut.

Spicatos flores erigit Iulio ex paludibus seu piscinis.

Potentilla.

χαμαρόν Plin.

Argentina Aduers.

Anserina.

Stephanomelis Plin.

Genferich.

Grenferich.

In pratis vdisq; vijs nihil vulgatijs, serpendo sese propagat.

Calore moderato exiccat, adstringit, repellit, viscera roborat, sanguinem grumofum potu dissoluit, Calculum

frangit & dysentericis utilis. Alui quasvis fluxiones & feminarum profluvia cohibet additis Corallijs & Ebore. Interiora vulnera & vlcera maligna oris pudendorumque sanat.

Gargarizatu commotos dentes firmat & laxas gingivas prolapsamq; Columellam restituit.

Pulvis intertrigines iumentorum inspersus curat.

Aqua stillatitia Lentigines, panos & maculas fuscumque colorem Sole contractu delet.

Primula veris odora.

Primula lutea odora, Aduers.

Herba Paralysis vulg. Cl. P. Verbasculum odoratum, Fuchf.

Arthetica, Officin.

Betonica alba.

Schlüssel blümlin.

S. Peters schlüssel.

Gicht blumen.

In pratis aridioribus & secus vias graminosis locis. Maio flores leguntur.

Folia modicè amara & acria sunt. Flores suauem spirant odorem, Calida & sicca naturæ tenuiumque partium.

Tota

Tota Articularibus morbis auxiliatur; admodum utilis capiti, nervis & humorum, ex decubitu, putredini aut inflammationi.

Flores ex Saluæ & Maiorana decocto, Resolutis ac tremore affectis potu conferunt.

Saccharo conseruatur paralyticis, Apoplecticis, tremulis & ijs qui crebras patiuntur Syncopas profuturi.

Aqua ex floribus ad eodem vsus elicitur.

Herba vulneraria est, Articulorum doloribus utiliter imponitur.

Succum epotum atq; etiam illitum fractis luxatisq; ossibus conferre experimento notum est.

Radices decoctæ & epotæ Renum & Vesicæ calculos atterunt.

Primula veris inodora luteopallida.

Herba paralytis sylu. Trag. primula veris maior, Dod. *Phoris.*

Wilde Schlüsselblumen.

Bleichgeele Schlüsselblumen.

In pratis vliginosis & riguis, syluis & frutetis montium Aprili flores explicat.

Vulneraria est. Contusis & ruptis salutaris.

Primula veris inodora alpina.

Verbasculum alpinum angustifolium.

Berg Schlüsselblümlin.

Folia eius longiora sunt, flores luteoli, odoris expertes.

Maij fine & Iunij initio in montibus altissimis niue delapsa floret humidis & herbdiiis locis.

Prunella Bugula cærulea.

Συφύρον γέλορον.

Bugula prunella, Lobel.

Bugula, Dodon. & Officin.

Prunella cærulea i. Trag.

Consolida media vulgo,

Clus. P.

Blauer Guckguck / sil.

Edle Braunnellen.

Gülden Günsel.

Maij promit flosculos; pratis vdis, hortis alijsq; amœnis locis familiaris.

Facultate sicca est, modiceq; calida, vulneribus utilis imposita.

Pota Mammis & præcordijs percussis sanguinis grumos in ventriculo vel alia parte concretos dissiecit.

Prunel-

Prunella Bugula incarnato flore.

Prunella purpurea vel 4.
 Trag.
 Leibfarben Guckuck / Sil.
 Edle Braunellen mit leib-
 farben blumen.

Prunella Bugula albo flore.

Weisser Guckuck / Sil.
 Edle Braunellen mit weis-
 sen blumen.

Prunella petraea.

Σύμφυτον πετρεῖον.
 Prunella vulgaris.
 Prunella, Dodon.
 Symphytum petraeum.
 Consolida minor flore
 purpurascens.
 Gauchheil / Gottheil / Sil.
 Braunellen / S. Antho-
 nius fraut.

Vulgo nota in pratis, hor-
 tis, locis etiam montosis, pe-
 trosis, incultis. Aestate floret.
 Modicè amara est. Calidæ
 & siccæ naturæ, admodum
 glutinosa, nonnihil abster-
 gens. Vulneribus medetur.

Cum veronica Pulmoni
 exulcerato opitulatur, San-
 guinis grumas discutit &
 consolidat.

Succus vt & decoctum,

Linguae, faucium & guttu-
 ris inflammationes orisque
 vlcera sanat.

Prunella petraea albo flore.

Prunella niveo flore.
 Weisse Braunellen.
 Weisser Gauchheil.

Rarius occurrit, in pago
 das tieffe Hartmansdorff /
 cliuosis Iunio floret.

Eiusdè vt prior facultatis.

Prunus sylvestris.

Ἀγριοκωνυμνία.
 Acacia germanica, vulg.
 Schlehdorn / Schlehen-
 strauch.

In dumetis, sylvarū mar-
 ginibus & sepibus nihil fre-
 quentius. Editiora & incul-
 ta occupat loca.

Tota exiccantis, adstrin-
 gentis est facultatis. Flores
 primo vere colliguntur, re-
 siccati in dysenteria alijsque
 alui fluxionibus, nec non in
 laterum doloribus magni
 vsus. Tantillum amaricant,
 abstergūt, siccant, cohibent.

Fructus immaturos pueris
 dysenteriam conciliare sæ-
 pissimè obseruari: per ma-
 turitatem resiccati, cocti &
 saccharo conditi, aluum ad-
 strin-

Y

stringunt, ventriculo sunt
vtiliores.

Ad vinum pendulum ni-
hil efficacius prunis sylue-
stribus.

Succus à Pharmacopolis
inspissatur, Acaciæ vicem
supplens.

Dentium dolores mulcet
cortex radice aceto deco-
ctus, fluxionesq; inhibet.

Folia & radices gargari-
zatu faucium vlcera & flu-
xiones sanant.

Psyllium perenne.

Ψύλλιον.

Κυόπα Theoph. Gesn.

Psyllium Plinianum fortè,
radice perenni supinum, Lob.

Psyllien fraut.

Sabulosis & incultis aruis
agri Vratislaviensis perēnat.

Pulegium regale.

Γλήχων, Diosc.

Pulegium, Herbar.

Puleium, Cicer.

Poley/ Hertz Poley.

Humectis & vliginosis lo-
cis siue palustribus, quæ hy-
bernis mensibus rigantur,
Iulio & Augusto floret.

Odoratum est, gustu acri
& peramaro.

Calefacit, siccit, aperit,
attenuat, incidit, discutit,

linquentes animo reficit.

Potu lenta & crassa ex-
creatu facilia reddit, vrinas
& menstrua pellit, partus,
secundas eijcit.

Ictericos & aquâ inter cu-
tem laborantes curat.

Capitis & nervorum affe-
ctibus ex frigidityte pro-
gnatis succurrit, visum acuit,
conuulsis auxiliatur.

Pulegium ex aceto tepido
potum & naribus appositum
loquelam amissam statim
restituit.

Pulegium sylvestre.

Pulegium sylvestre.

Mentha aquatica exigua

Trag.

Wasser Poley.

Wilde Poley.

Bleine Bachmüntz.

In palustribus & scrobi-
bus humidis.

Pulmonaria vulgarior.

Pulmonaria folijs Echij,

Lobel.

Pulmonaria Plin. Gesn.

Symphytum sylu. & Pul-
monaria Plin. Cord.

Lungen fraut.

Bleine Walwurtz oder
Beinwelle.

In syluis locis opacis flo-
res. Ver annunciant, folijs
inte-

interim succrescentibus.

Cohibet, consolidat, siccatur, abstergit.

Præfertur ad pulmonis cum vlcera, tum cæteras infectiones, & ad sanguinis reiectiones. Tabe affectis mirè conducit.

Pulmonaria maculosa.

Symphytum maculosum, Dodon.

Symphytum Plinij mas.

Symphytum sylu. Cordi.

Beslecket Lungenkraut.

Hirsch Mangolt.

Flecken kraut.

Minus frequens: at eiusdem vsus.

Pulmonaria gallica I.

Pulmonaria gallica mas Tabern.

Pulmonaria Gallorū flore Hieracij, Aduers.

Geel Lungen kraut.

Buchföhl/ Buch lattich.

In syluis cliuosis & umbrosis montium, Iulio floret circa Gryphibergā im Lindswalde/ad Quissum fluuium.

Refrigerat, siccatur, consolidat cum adstrictione. Latetescit tota & vulnera sanat.

Pulmonaria gallica II.

Pulmonaria gallica an-

guistifolia, Tabern.

Buchföhl mit schmalen blettern.

Prouenit opacis syluis sub Fagis vt prior.

Pulsatilla purpurea flore.

Pulsatilla vulgaris, Lob.

Pulsatilla vulgaris dilutior, Clus. P.

Herba venti, Trag.

Samolus Plin. Dalech.

Oxytropis.

Rüchenschelle / Bizwurz.

Graw Bergmennle / Bocksbart.

Apricis, aridis & sterilibus delectatur.

Aprili flores erigit ex cæruleo purpureos.

Excalefacit & siccatur 4. gradu. Caustica est facultatis. Attenuat, attrahit, digerit, expurgat.

Radix folijs mitior est. Aduersus pestilentia contagia, venena, virulentorum animalium ictus ac morsus pota commendatur.

Cruda mansu pituitam elicit.

Pulsatilla niuea alpina.

Anemone alpina, Gesn.

Anemone montana Pul-

satilla folio, Cl. P.

Y 2

Pulsa-

Pulsatilla petraea.

Schneeglöckchen / Schneeglöckchen.

Wild Manftraut.

In celsis Suditorum iugis inter scopulos leui & tenui terra tectos. Iunio & Iulio explicat flores, postquam defluxere niues succrescentibus tremulis & comosis seminum pappis.

Pyrola maior.

Pyrola vulgaris, Clus. P.

Limonium, Cord.

Apiophyllum.

Steinpfantzen, Sil.

Wintergrün.

Wald Mangolt.

Montosis syluis & frigidis vdis nascitur. Toto anno viret, frigoris & hyemis patiens. Iulij sine flores elegantes odoratos candidos Lilij ferè conuallij gerit.

Refrigerat, siccatur, adstringit, glutinat. Insignis vulneraria. Fistulis & alijs malignis vlceribus medetur & Hernijs utilis. Exulceratos Renes ex aqua Symphyti iuuat.

Pyrola minor.

Pyrola tenerior f. 2. Cl. P.

Ambrosia, Dalech.

Klein Wintergrün.

Birnbaumchen fraut.

Locis vmbrosis sylvarum Muscum terrestrem perreptat, coliculos cum flosculis paulatim Iunio & Iulio erigens.

Haud disparis vsus.

Pyrola frutescens.

Pyrola 3. Clus. P.

Pyrola fruticans.

Viabelfraut.

Stauden Wintergrün.

In montibus & syluis vastis Gorlicensibus ad fines Silesiæ. Iulio flosculos niueos ostendit.

Pyrus syluestris.

Äpfel Theoph.

Pyrafter.

Wilder Birnbaum.

Feld Birnbaum.

Incultis, syluis, agris & secus itinera.

Folia adstringunt. In defensionibus mulierum ad vuluæ procidentias adduntur.

Pyra syluestris.

Feldbirnen.

Duplicia sunt: maiora & minora.

Frigidæ sunt essentia & crassarum partium, vehementer adstringunt & siccant.

Sicca-

Siccata in vino rubro decocta Dysentericis & alui fluxionibus diuexatis auxiliantur. Idem præstant succus & aqua stillaticia.

Quercus vulgaris.

Δῦο Diosc.

Quercus sativa, urbana.

Querquus Aduers.

Arbor Iouis.

Eichbaum/ Eiche.

In syluis, collibus & montosis gignitur.

Adstringentis est facultas: glutinat, cohibet, sanguinis fluxionibus sistendis utilissima.

Folia tenera & rubicunda vino decocta collutu ac gargarizatu dentium dolores sedant.

Adduntur Infesibus, vbi adstrictione opus est.

Aqua ex tenerrimis folijs elicitur ad faucium inflammationes, dysenteriam, & alios alui & sanguinis fluores utilis.

Quercine glandes.

Βάλανοι τῆς Δυοῦς.

Eicheln.

Vrinam cient, Calculum frangunt, flatus pariunt, stranguriæ medentur.

Sues his pinguescunt &

duram solidamque carnem generant.

Memini vrgente fame Pauperes ijs loco Panis vitasse.

Capula Glandium.

Calix Glandium.

Οἶμφοις Diosc.

Eicheldöpflein.

Sistunt, adstringunt fluorem mulierum, alba Menstrua, Dysenterias sanant, dentes ex vino rubro firmant.

Quercus pilula.

Onicididæ Trag.

Σφαλεῖα τῆς Δυοῦς.

Eichäpfel.

Ad Gallarum facultatem accedunt, sed tamen ipsis infirmiores ac minus efficaces. Ad tincturæ vsum à tincto-ribus colliguntur.

Vua Quercina.

Eichtraube.

In vetustis Quercubus ad caudicem præcipuè Autumno nascitur spongiosum excrementum, Arthriticis medetur.

Quercus petraa.

Δυοῦς ἀγρία.

Quercus sylvestris.

Y 3

Robur

Robur *Latinis.*

Stein Eiche.

In collibus & petrosis frequens.

Fortius lignum habet & incorruptius cæteris. Folia quamvis arescant, per hyemem non cadunt.

Quinquefolium Officinarum.

Πεντάφυλλον *Diosc. Tabern.*

Quinquefolium maius repens C. B.

Quinquefolium maius luteum Fuchs.

Sünfffinger fraut.

Ad margines hortorum, in aquarijs ductibus & riguis stabulatur.

Radix eius longa sensim attenuata foris nigricans, intus subrubens adstringentis facultatis. Maio & Iunio flores splendent.

Citra morsum desiccatur, minimum caliditatis habens, penetrat, adstringit, Alui profluuijs, Dysenteria, Intestinorum prolapsui, Igni sacro & vulneribus remedium conueniens.

Bibitur contra febrium circuitus. Succus foliorum continuis diebus potus, regium morbum sanat.

Quinquefolium vernum maius.

Pentaphyllon vernum maius.

Grüe Sünfffinger fraut.

Incultis & apricis arido solo, primo vere floret.

Siccatur cum adstringendi vi, morsus expers.

Quinquefolium maius albo flore.

Weis Sünfffinger fraut.

Radix longa, subrubra, cui sæpe annascuntur bulbulli *Filipendulae* modo. Floret Maio, semen fert Iunio & Iulio. In agro *Vratislauiensi*.

Quinquefolium vernum minus.

Quinquefolium vernum repens.

Pentaphyllon siue Quinquefolium minus Tabern.

Klein frischend Sünfffinger fraut.

In collibus siccis & secus vias Aprilis occurrit.

Quinquefolium fragiferum.

Quinquefolium 3. serpens Dodon.

Pentaphyllon supinum Tormen-

Tormentilla facie Lob.

Briechend Erdbeer Fünfffinger fraut.

Locis montium occurrit graminosis.

Quinquefolium sylvaticum.

Quinquefolium flore albo Mattiol.

Pentaphyllum 1. Clus. P.

Wald Fünfffinger fraut.

Sylvarum umbrosis ac humidis locis viget.

Quinquefolium fragiferum erectum.

Stehend oder aufrecht Fünfffingerfraut.

Folia ut plurimum quina, interdum septena, rarius nouem in pediculo nascuntur. Floret Maio & Iunio, ubi & semine Fragorum instar ornatur.

Herba, radix & semen siccandi & adstringendi vim obtinent.

Quinquefolium palustre.

Quinquefolium 4. Dod.

Pentaphyllum rubrum palustre Lobel.

Heptaphyllum Plin. fragiferum.

Wasser Fünfffingerfraut.

Rot Fünfffinger fraut.

Sieben Fünfffinger fraut.

Vliginosis putridis montium delectatur locis, ad piscinas & paludes fruticans. Iunio floret.

Adstringentis & siccantis facultatis est herba cum fructu.

Potum sanguinis profluuijs medetur.

Quinquefolium petraeum argentatum.

Pentaphyllum album Mattiol.

Quinquefolium petraeum maius seu 10. Tabern.

Gros Stein Fünfffinger fraut.

Fünffblat mit weissen blättern.

Vulgaris est notitia. Passim in aggeribus & secus arua macro & arenoso solo fruticat. Augusto floret.

Officinae non recte pro vero vtuntur.

Quinquefolium alpinum splendens.

Pentaphyllum aureo flore seu 3. Clus. P.

Berg Fünfffinger fraut mit schönen gelben blumen.

Celsioribus Suditorum iugis gelidisq; cautibus oblecta-

lectatur. Sub finem Iunij flores eleganter lutei splendent.

Ranunculus præcox candidus.

Bαρδαχον, quod humentibus & opacis locis Ranarum modo delectetur.

Ranunculus nemorosus

Lobel.

Anemone s. *Dod.*

Weisser Aprillen Hanenfuß.

Weisse Pusch oder wilde Veilichen.

Primo vere in syluis frigidiusculis montosis vberim cum flore luxuriat.

Acris est & linguam vrit.

Ranunculus præcox purpureus.

Ranunculus nemorosus purpureus.

Anemone sylvestris vulgaris purpurascens *Cl. P.*

Liechtrote Waldhenlin.

Rötlichte Waldveilichen.

Ranunculus præcox luteus.

Ranunculus nemorosus luteus.

Anemone sylv. vulgaris lutea *Cl. P.*

Gele Waldhenlin.

Gelbe Waldveilichen.

Non adeò frequens ut priores, inter Fumarias bulbosas ad arcem Greiffenstein.

Ranunculus Muscatellinus.

Muscatellina *Cordi.*

Ranunculus minimus septentrionalium herbido muscoso flore *Lob.*

Fumaria bulbosa seu tuberosa minima *Tabern.*

Dentaria minima.

Moschatella.

Biesem Hanenfuß.

Biesem freutlin.

Vmbrosis gaudet frutetis, Aprili floret.

Acris est ut Ranunculus, & Moschum redolet.

Ranunculus dulcis pratensis.

Βαρδαχον γλυκερον.

Ranunculus oleraceus.

Süßer Wiesenhanenfuß.

Passim in pratis & graminosis vdis marginibus nascitur.

Dulcis est & in cibum venit cum alijs oleraceis.

Ranunculus dulcis pratensis maior.

Ranun-

Ranunculus oleraceus
maior.

Ranunculus dulcis 3. Ta-
bern.

Gros süßer Hanenfuß.

Gros Schmalzblum.

Butterblume Sil.

In pratis notus.

Ranunculus dulcis pratensis maculosus.

Gefleckter süßer Hanen-
fuß.

In pratis, hortis gramine-
is & agris incultis.

*Ranunculus dulcis sylua-
ticus.*

Βαρύχρον γουραιοειδής.

Ranunculus dulcis nemo-
rosus Martius Tr.

Ranunculus auricomus
Lob.

Vnguis Leopardi.

Wald Schmirgeln.

Wild Goldgeel Hanen-
fuß.

Süßer Wald Hanenfuß.

Syluis humidis & opacis
occurrit.

Ranunculus vulg. pratensis causticus.

Ranunculus 2. Mattiol.

Ranunculus 1. Tabern.

Ranunculus sylu. pratensis
surrectis cauliculis.

Schmirgeln. Sil.

Gemein Wiesen Hanen-
fuß.

In pratis plusquam notis-
simus, cuius flores saepe in-
tegra prata operiunt.

*Ranunculus dulcis
repens.*

Ranunculus hortensis r.
Dod.

Ranunculus vinealis Ta-
bern.

Ranunculus pratensis et-
iamque hortensis reptante
cauliculo Lob.

Γαλοπρόδιον.

Geel kriechend Hanenfuß.

Weihenfuß.

In hortis oleraceis vber-
rimo luxu serpendo sese
propagat.

Ranunculus aruensis.

Ranunculus segetalis
Cord.

Ranunculus sylu. 3. Dod.

Ranunculus aruorum Lob.

Acker Hanenfuß.

Feld Hanenfuß.

Inter segetes Iulio floret.

*Ranunculus palust. fo-
lio Apj.*

Βαρύχρον 1. Diosc.

Ranunculus palustris ro-
tundiore folio Aduers.

Z

Apium

Apium risus.

Sardoa vel Sardinia herba.

Gleisblumen.

Wasser Hanenfuß.

Wasser Eppich.

Humidis & viginosis delectatur, non raro ad scrobes & fossas aquas habentes occurrit.

Siccat & calefacit 4. gradu cum radix tum vniuersa herba.

Radix sicca tritaq; sternutamenta ciet naribus indita.

Herba vngues scabros eximit, scabiem detrahit, & stigmata delet.

Herba in oleo violaceo macerata crustis excitandis & hamorrhoidibus referandis aptissima.

Ranunculus flammæus maior.

Ranunculus palustris maximus.

Ranunculus lanceolatus.

Grosser langbletterichter Wasser Hanenfuß.

In lacustribus & piscinis natales habet.

Facultate cæteris similis, acris similiter, exulcerans & vesicas faciens.

Ranunculus flammæus minor.

Ranunculus lanceolatus minor.

Ranunculus bifolius Taronis effigie Aduers.

Flammula Ranunculus Dod.

Lingua Plin. Lugdun.

Ranunculus aquaticus *αγρογλασφόλλας Thal.*

Egelkraut Sil.

Sperkraut.

Langer weißer Hanenfuß.

Perquam familiaris riuulis per steriles tractus segnitè fluentibus. Iunio & Iulio flosculos ostendit.

Feruidissimus est & pecora enecat.

Alii ducunt hac herba pastas inflammatione Iecinoris, internorumq; viscerum erosionibus atq; exulcerationibus corripit.

Ranunculus flammæus angustifolius serratus.

Ranunculus lanceolatus serratus Tabern.

Flammula aquatica serrata.

Lingua maior Lugdun.

Gekerst Sperkraut.

Gekerster langbletterichter Wasser Hanenfuß.

lisdem natalitijs fruitur.

Ranunculus palustris gramineus minimus.

Ranun.

Ranunculus pumilus gramineis folijs *Aduers.*

Hydropiper lanceolatum *Lugdunens.*

Lanceolata *Officin.*

Gras Hanenfuß.

Hunc alunt pascua humida & vliginosa.

Ranunculus fluiatilis hederaceus Lugdunensis.

Ranunculus aquaticus Hepaticæ facie *Lobel.*

Hepatica aquatica siue palustris *Dalech.*

Polyanthemon aquatile.

Wasser Hünlein.

Wasser Hanenfuß.

In fossis aquas habentibus & lentè decurrentibus Aprili, Maio & Iunio abundè & latè flosculos promit.

Calidus est & cæteris Ranunculis facultate similis. Exulcerat enim & vesicas excitat.

Ranunculus alpinus luteus maximus.

Ranunculus platyphyllos flore luteo *Cl. P.*

Ranunculus magnus aconiti folio.

Aconitum 3. *Martiol.*

Grosser geeler Birkhanenfuß.

Humida & herbida altissimorum montium loca amat. Iulio floret.

Ranunculus alpinus luteus globosus.

Ranunculus alpinus glomeratus *Lobel.*

Trollius flos *Gesner.*

Ranunculus flore globoso *Dodon.*

Geeler Albhanenfuß.

Dotterblum *Sil.*

Trollblume.

In valle Gigantum ad Oupæ cataraetam. Iulio flores magnos luteos in globum, vitelli oui instar, conuolutos erigit.

Cæteris minùs est acris. Quare minùs excalefacit & ficit.

Ranunculus alpinus candidus.

Ranunculus alpinus maior leucanthemus folio Aconiti.

Ranunculus maximus *Leucanthemus* siue Aconitifolius *Thal.*

Weisser Albhanenfuß *Sil.*

Weis Trollblumen *Gesner.*

Hanenfuß mit weissen Blumen.

In vliginosis montosis seu

Z 2

ad ri-

ad riuulos ex montibus defluentes nascitur.

Folia eius ampla profundius sinuata Platani instar; flores lactei.

Sapor ei subacris & nitrosus.

Ranunculus alpinus Narcissi flore Cl. P.

Ranunculus montanus hirsutus Narcissi-florus.

Ranunculus polyphyllus niueus.

Bergbünlein.

Iunio & Iulio montium conuallibus flores niueos, aliquando purpurascens ostentat Narcissi æmulos.

Radix concava, fibrillis candidis, miro naturæ artificio contexta.

Rapistrum luteum.

Εχινου Cord.

Rapistrum aruorum Advers.

Armoracia Diosc. Tabern.

Raphanus sylvestris Cord.

Lampfana Mattiol.

Geel Hederich q. d. Heiden Kettich / Schindtsenff / Wildsenff.

Plurimum inter segetes hordeaceas & Rapaceas inuitis Agricolis luxuriat, ut interdum toros agros co-

periat Iunio & Iulio.

E Raporum sylvestrium censu est Rapistrum. Acrimonia pollet ut Nasturtium.

Semen feruens & acre gustu, urinam prouocat.

Rapistrum album.

Raphanus sylu.

Sinapi agreste Tr.

Lampfana seu Brassica sylu. Mattiol.

Weis Hederich.

Campis rapaceis cultis & incultis, sed rarius occurrat.

Semen excalefaciendi siccandi, abstergendi, digerendi vi pollet.

Rapunculus aruensis.

Rapunculus vulgaris

Clus. P.

Rapunculus Mattiol.

Rapunculum paruum Advers.

Pes Locustæ Auicenn.

Rapunzel.

AckerRapunzel.

Inter segetes prouenit. In hortis etiam ad acetariorum usum feritur.

Radix cum foliolis veris initio in acetarijs commendatur; quod maxime gustu placeat & appetentiam excitet.

Æstate

Æstate floret & semine
pragnat.

*Rapunculus montanus
albus.*

*Rapunculus sylvestris al-
bus spicatus, Thal.*

*Rapunculum Alopecu-
ron, Dod.*

Wald Rapunzel mit weiß-
sen blumen.

Wilde Rüblin.

Natales eius montosa &
aliosa prata, conuallesque
nemorosa. Iunio spica viget.

Radix, priusquam caulem
protrudat, elixa cum, sale,
aceto & oleo macerata ci-
bi appetentiam parit, Sto-
macho prodest & vrinas e-
licit.

*Rapunculus montanus
cæruleus.*

*Rapunculus Alopecuroi-
des spica cærulea, Clus. P.*

*Rapum sylvestre maius,
Dodon.*

Blauerwald Rapunzel.

A priori comâ cæruleâ
discernitur.

Rapunculus Nerifolius.

*Rapunculus vestitus aut
campanulatus, Thal.*

Wald Rapunzel.

Wald Glocken.

Conuallib. nemorosis sub
Gigantæo, Iulio & Augusto
floret.

*Rapunculus sylv. cæruleus
umbellatus.*

*Rapunculus umbellatus
angustifolius, C. B.*

Nabelicht wald Rapunzel.

Augusto flores fert in
montanis recessib. ad Quis-
sum fl.

*Rapunculus sylv. campanu-
latus Linifolius.*

Kleine Rapunzeln.

Kleine Glöcklin.

Asperis & petrosis oritur.

Rhamnus catharticus.

Rhamnus solutius.

Spina infectoria, Lob.

Cervi spina, Trag.

Creutzdorn.

Wegdorn.

Wiedorn/ Sil.

In sepibus & syluis fru-
tescit.

Folia seu interior Cortex
gargarizatu Oris vlcera &
putredines emendat.

Succus baccarum recen-
tium aluum exoluit, aperit,
expellit, pituitam tenuem e-
ducit, & impetum eius in
articulos citatum auertit &
cohibet.

Z 3

Bacca

Baccæ nondū maturæ, re-
ficcata cum aqua tempera-
tæ addito momento alumi-
nis, luteum seu croceū præ-
bent colorem; maturæ viri-
dem. Circa Martini festum
à Coriarijs & qui chartas
pingunt, ad puniceum colo-
rem carpuntur.

Succus cum Alumine de-
coctus pro saturatē virenti
colore in vsu est Pictoribus,
Saffgrün.

Rhodia radix.

*Ρόδα ῥίζα, Diosc.

Rosæ radix, Fuchf.

Rosaria.

Rosenwurz.

Rosinwurz.

Plurima in altissimis Su-
ditorum rupibus saxosis ac
præruptis locis accessu dif-
ficilibus.

Mistæ est temperatura,
partim calefaciens & hume-
ctans, partim refrigerans &
siccans; vti odore sic & tem-
peratura Rosæ affinis.

Pota Dysenteriam, diar-
rhœam curat: Alba men-
strua cum Nuce moschata si-
sit. Aduersus capitis dolo-
rem cum Rosacea fronti im-
ponitur.

Miscetur frontalibus &
Oxyrrhodinis.

Ribes acidum.

Ribes vulgare, Mattiöl.

Ribes Arabum, Lobel.

Ceanothus lævis, Gesn.

Grossularia rubra.

S. Johannis treublin oder
beerlin.

Spontè fruticat ad Gigan-
tæum montē humidis con-
uallibus; ad Zacum item
fluum prope Hirsbergam.

Flosculi leuiter purpura-
scunt, & baccæ vulgaribus
multo maiores, quæ post sol-
stitium æstiuū maturescunt.

Fructus acidus est & grati
saporis. Refrigerat & siccatur
2. gradu. Æstuantem ven-
triculum temperat, nauseam
& vomitum sistit. Ardore
febriles restinguit ac miti-
gat. Putredinibus aduersa-
tur, ventriculi subuersiones
& Choleram morbum sistit.
Baccæ & succus saccharo con-
seruantur ad eodē vsu.

Ribes insipidum.

Ribes sylvestris, Cam.

Ribes dulce, Clus. P.

Wild S. Johannis treuble.

Folia priore minora, O-
xyacanthæ ferè, fructus insi-
pidus seu dulcis in racemu-
lis breuioribus.

Floret Maio, Autumno
baccæ

bacca rubent. Circa Gigantraum im Dappelgrunde. Fructus est insipidus seu subdulcis.

Ribes nigrum.

Ribestru fructu nigro, Dod.

Grossularia nigra, Lugdun.

Amomum Mattiol.

Pipirella.

"Iros vel oiros, Theophr.

Schwartz Johannisstreu-
lm.

Gichtbaum / Jungfraw-
baum / Sil.

Folio est viticis aut Bryoniae, virgultis odoris interfindendum virentibus: flosculi sunt luteoli punctis rubentibus: bacca nigra in racemis odorata.

In Riphæis montibus humidis & opacis conuallibus sæpè reperitur.

Folia calida sunt, grauis odoris. Epilepticos & vtero strangulatas feminas trita naribus admota excitant. Ex vino pota ventris torminibus medentur, & Menstrua prouocant.

Aduersus conuulsiones, Paralyfin, Arthritin vagam, contracturam ex Colica &c. in hortos à plebecula nescio quibus ceremonijs superstitione transfertur.

Ros Solis maior.

Rorida siue Solis Ros.

Drosion, Recentior.

Salifiora, Cord.

Sonnendaw / Sindaw.

Löfflinfraut.

Unsers Herrn Gottes
Löffel / vulgo.

Edler Wiedertbon / Sil.

Pratis montosis vdis familiaris inter alia Musci albicantis & subrubentis. Iulio floret. Gustu est acris, subadstringens, nonnihil acidus & subacerbus, admodum exiccans.

Cum sale tritus impositus vesicas excitat, ideo caustica facultatis particeps.

Huius gustatu pecudes ad Venerem incitari fertur.

Aqua destillata auri luteo relucet colore.

Phthificis à nonnullis commendatur.

Ros Solis minor.

Ros Solis 2.

Rorella.

Blein Sonnendaw.

Blein Löfflinfraut.

Iisdem locis.

Rosa sylu. vulgaris.

Κωδωνισ, Diosc.

Κωδωνισ.

Rosa

Rosa canina odorata, Lob.

Canirubus.

Dorn Rosen.

Beck Rosen.

Hanbüttenstrauch.

Vbique sponte occurrit in aggeribus secus itinera & agrorum margines.

Flos eadem potest quæ satiuæ, magis adstringit & ficit.

Radix valet ad morsum Canis rabidi.

Caro eiusdem cum Cydonijs est facultatis, & non solum ad reprimendos vapores & humores contemperandos magnam vim habet, sed & calorem Renum, ne calculos generet, infringit, & meatus laxiores, ut facilius calculum excludant, reddit.

Rosarum spongiola.

Rosarum fungus.

Bedeguaris, Aduers.

Rosenschwam.

Schlaffkuntze/ sil.

Mellis odorē spirat. Puluis ex vino datur calculosis & dysentericis. Prodest etiam strumosis naturæ suauis.

Supposita puluinarib. Infantium, somnum conciliare vulgus credit.

Rosa alpina rubra.

Berg Rosen.

Rote Birkrosen.

Flores suauiter rubent.

Ad riuulos montium Iunio floret.

Rosa aruina.

Rosa auenaria.

Haber Rosen.

Erd Rosen.

In agris auenaceis circa Vratislauriam.

Rosa Maialis.

Rosa campestris odora.

Marien Kößlin.

Meyen Kößlin.

Wolriechender Dorn.

Campeltria sectatur.

Rubia syluestris maior.

Rubia montana Silesiaca.

Stellaria maior.

Berg Rote.

Amat montosa & petrosa loca.

Radix acris est & tenuium partium.

Rubia syluestris minor.

Rubolia saxatilis.

Mollugo r. Dod.

Stellaria minor.

Geißelweiden, Dief.

Wilde Rote.

Stern Frant.

Incultis secus itinera & margines agrorum, sepes & mu-

& muros nihil frequentius.
Vires habet domestica
imbecilliores.

Rubia aruensis.

Rubia minima, *Lob.*

Rubiola aruensis.

Blein Acker röte.

Inter segetes agri Hirs-
bergensis flosculi rubentes
Iunio gliscunt.

Rubus batius.

Bátos, *Dioscor.*

Rubus grandis, *Trag.*

Rubus lentis.

Brombeer strauch.

Krazbeer strauch.

Bremen/ *Sil.*

Notus inter dumeta, se-
cus vias & margines agro-
rum. Maio floret, Augusto
& Septembri ad maturita-
tem prouenit fructus.

Omnibus suis partib. ad-
stringendi facultate pollet.

Flores ex vino poti aluum
sistunt.

Cymæ ex vino rubro spu-
tum sanguinis inhihent, ex
vino austero dentes firman.

Bátiva, Mora rubi, vati-
cana.

Brombeern/ Krazbeern.

Fructus maturus dulcis e-
sui non insuauis, ventriculo
gratus.

In media maturitate con-
sistens aluum sistit.

Ad dysenteriam & ven-
tris proflauia eiusque robur
deperditum valet.

Succus ad Stomatica pro-
dest.

Rubus aruensis.

Xapalatos Theophr. *Cord.*

Humi-rubus.

Rubus minor seu reptans,
Aduers.

Acker bremen.

Tauben beer.

In aruis restibili seq; pro-
gignente rediuiua sobole
sparsim pullulat.

Eiusdem cum priori na-
tura.

Rubus alpinus.

Rubus paruus saxatilis al-
pinus, *Clus.*

Rubus minimus, *Thal.*

Xapalatos Theoph. *Clus. P.*

Steinbeerstrauch.

Summa occupat mon-
tium iuga.

Folia per hyemem virent,
quibus cerui & capreoli hy-
eme delectantur.

Rubus hircinus.

Bockabeer/ *Sil.*

Saltubus nemorosus mon-
tium occurrit.

A a

Fru-

Fructus dulcis esu gratus.

Rubus Idæus.

Βάρος Ἰδαία, Dioscor.

Rubus Ceruinus.

Ceruirubus.

Hindbeerstrauch.

Himmelbremen.

Frequens in nemorosis montium saltibus.

Fructus egregie refrigerant tantillum adstringentes. Maturi esitantur ablati diligenter, iucundiores moris vaticanis.

Condiuntur saccharo, vino & aqua Rosarum ad sitim & voluptatem.

Acetum placet sapore, odore, colore.

Ex succo paratur Rob febricitantibus ad sitim leniendam idoneum.

Aqua ex baccis destillatur fragrantissimi odoris & Cordi admodum amica.

Sagittaria maior.

Πίσδαρ μεγάλη.

Sagittalis maior Mattiol.

Camer.

Pistana Magonis, *Plin.*

Sagittaria aquatica.

Gros Pfeilkraut.

Amnibus gaudet ac leuiter labentibus aquis. Iulio ac Iunio floret.

Gustu est adstringente siccante succo non ingrato.

Herbam potu & infessu foecundas reddere mulieres Camerarius obseruauit.

Sagittaria minor.

Sagitta & Sagittalis, *Cord.*

Sagitta Iouis.

Klein Pfeilkraut.

In amenissimis residibus propè Leobergam Iulio flosculos edit.

Salix rubra.

Ἡ ῥέα, Diosc.

Salix nigra & punicea,

Theoph.

Salix viminea purpurea,

Plinij.

Salix perticalis, *Cordi.*

Weide/ Weidenbaum.

Bandweide/ Wilgenbaum.

Rote Weiden.

In humidis tractibus ad ripas frequens.

Folia refrigerant & siccant absque morfu.

Recentia adduntur soporiferis lotionibus, & sparguntur circa lectulos febricitantium.

Salix candida.

Salix candida fragilis.

Salix 2. seu sylu. *Frag.*

Weisse Weiden.

Bruch Weiden,

Mürz

Mürbe Weiden.
Cognitu facilis. Cortex
candicat & facile frangitur.

Salix viminalis.

Salix vitellina.
Salix græca, Colum.
Salix Sabina seu Ameri-
na, Thal.

Salix vinea, Pet. Cresc.
Gele Weiden.
Bach Weiden.
Dorfer Weiden.
Band Weiden.
Gele/rote/braune Band=
weiden.

Hæc colore variat, sequa-
cis admodum lentitiæ, li-
gandis Cadorum vinariorū
circulis conuenientissima.

Passim in pratis occurrit.

Salix pumila repens.

Ἰρία ἡνίκ, Theoph.
Salix humilis repens an-
gustifolia, Aduersf.
Chamæltea, Tabern.
Krebs Weiden.

Ad margines pratorum
& ripas aquarum longè la-
teq; serpendo se propagat.

Folia recentia ad lectulos
proiecta & pedibus suppo-
sita febricitantibus ardorem
temperant ac somnum con-
ciliant.

Salix latifolia montana.

Salix caprea rotundifolia,
Tabern.

Salix platyphyllos rotun-
diore folio, Thal.

Salix latifolia arborescens.

Seil Weiden/ Sellen.

Saal Weiden/ Sil.

Passim in saltibus nemo-
rosis montium verno tem-
pore emittit florem luteum
odoratissimū, quo apes plu-
rimum delectantur. Nuc-
menta longa succrescunt,
quæ cum semine in pappos
eunt. — Fragilis est.

Ex floribus oleum para-
tur *salignum* in Officinis, ad
soporem conciliandum & æ-
stus febrium contemperan-
dos vtilissimum.

Salix latifolia pratensis.

Salix latifolia acuta.

Salix cinerea.

Salix maritima acutior
folio.

Haar Weiden.

Sähe Weiden.

Humidis & vdis montiū
pratis familiaris, ob tenaci-
tatem & lentitiam Doliarijs
conuenientissima.

Flores Aprili luteoli, o-
dorati, soporiferi sunt; Ma-
io cum semine in pappis a-
uolant.

Semen cum lanugine san-
gui-

Aa 2

gui-

guinem filit, & ambustis medetur.

Aqua florum visum exa-
cuit, scabiem capitis sanat,
& capillos pulcros reddit.

Salix saxatilis.

Salix alpina repens.

Stein Weidlin.

Berg Weiden.

Perrepta taltiora Sudito-
rum iuga.

Sambucus vulgarissima.

Sambucus vulgaris co-
rymbacea, *Aduers.*

Sambucus arborea.

Sambucus, Sereni.

Beza Guiliel. *Saliceti.*

'Αντὴ, *Diosc.*

Holderstrauch.

Holunderbaum/ *Sil.*

Amat opaca & humecta
loca. Circa oppida & pagos
ad muros & sepes frequens.

Gustu est amaro. Corti-
ces, folia, flores purgandi
vim obtinent: sed non abs-
que molestia & ventriculi
incommodo.

Turiones recentes & folia
tenera cocta aluum emol-
liunt, pituitam, bilem & se-
rosos humores detrahunt.

Cortex medius virensque
eadem præstat, sed efficacis-
simè, Hydropicis & scabie

vexatis utilis: ambustis suc-
currit.

Flores odorati caseis in-
seruntur. Saccharo etiam ad
Hepatis affectus conser-
uantur.

Acetum ex floribus ven-
triculo gratum appetentiam
excitat, crassos crudosque hu-
mores incidit & attenuat.

Rob ex succo baccarum
coquitur per se vel cum sac-
charo, aqua inter cutem suf-
fusis conueniens. Plebecula
vititur in alui fluxibus bilio-
sis & dysenteria.

Nuclei absterguunt, per al-
uum & vomitum purgant
vehementer. Rusticorum me-
dicina.

Sambucus alpina.

'Αντὴ ὀρενῶν.

'Αντὴ ἐρυθροδάφυλος vel πορ-
νοδάφυλος, *Thal.*

Sambucus montana race-
mosa, *Aduers.*

Sambucus ceruina, *Trag.*

Berckholder.

Waldholder.

Schalaster.

Humidiorum montium &
saltuum amasia: floret Maio;
Augusto & Septembri bac-
ca rubent aspectu elegantes.

Frigidi est temperamentum.

Baccarum esus nimius ad-
modum

modum noxius creditur:
quamuis à nonnullis succus
cum melle ad intinctus co-
quatur.

Sambucus aquatica.

Ἀκλή *μυρσός.*

Δρύπαιος Theoph. *Lugdun.*

Sambucus palustris.

Sambucus rosea.

Schwelckenbaum.

Wasser Holder.

Ballinckenbaum } *Sil.*

Tallinckenbeer }

Vmbrosarū amœnarum-
que riparum, quas blandè ri-
gant aquæ, alumna, Praten-
sibus vdis conualliumque
marginibus familiaris.

Baccæ egregiè rubent, a-
uiculis in cibum cadunt, in-
tegra hyeme durant, frigo-
ris vim absque corruptione
ferentes.

Deuorata vomitum cient
Homini.

Succo vis est absterforia,
qui cum melle ad syrupi co-
quitur consistentiam aduer-
sus tussim vulgi experimèto.

Sanguisorba maior.

Pimpinella Sanguisorba
maior, *Clus. P.*

Sanguisorba maior seu syl-
uestris, *Lugdunens.*

Sorbastrella.

Gros Welsche Pimpernel.

Drachenblut.

Murmwurtz.

Böblinfrant.

Pratis delectatur montiū
humidioribus.

Radix refrigerat, adstrin-
git, siccatur. Alui & ventris
fluores sistit. Intestinorum
exulcerationes sanat. Ad
muliebria profluvia quoque
plurimum efficax.

Flos siccus pulu. ex vino
rubro Dysentericis opē fert.

Sanguisorba minor.

Pimpinella Sanguisorba
minor, *Clus. P.*

Sanguisorba hortensis,
Lugdunens.

Pampinula, Bipinella.

Klein Welsch Bibinell.

Pimpernell.

Klein Böblinfrant.

Loca amat inculta, arida
& squallidos colles: inde in
hortos recipitur, in quibus
semel sata diutius durat &
ex semine se propagat.

Siccatur 3. refrigeratur 2. ad-
stringit muliebri profluiū,
& quoslibet sanguinis & al-
ui fluxus cohibet, biliosas
fluxiones reprimat.

Vino mersa gratiam ei
conciliat, sapore & odore a-
romatico ac vinoso.

A a 3

Ia

In acetarijs visceribus, Hepati, Cordi & præsertim Spiritibus vtilissima.

Sanicula.

Sanicula mas.
Diapensia *Aduers.*
Ferraria minor.
Sanickel.

Vmbrosis syluis & montibus nota.

Calefacit, siccatur, adstringit, glutinat, roborat.

Egregia vulneraria, Chirurgis cognita. Pota sanat vulnera, fistulas, Enterocelas. Sanguinis sputo, dysenteriae Renumque vitij medetur. Additur vulnerarijs potionibus.

Sanicula alpina.

Sanicula alpina minima
Lobel.

Auricula Vrsi minima
flore purpureo.

Klein Berg Sanickel.

Rote Steinnegelin *Sil.*

Hæc nonnisi in præruptis Suditorum supercilijs petrosis reperitur. Maio niuib liquefactis, flosculi rubentes gliscunt.

Gustu adstringit, siccatur, refrigerat.

Vulneraria est.

Saponaria.

Herba fullonum.

Lychnis fullonia.

Struthium *Fuchs.*

Lanaria.

Seiffentraut/Waschekraut.

Speichelwurtz.

HundesNegelin } *Sil.*

Madenkraut

Secus herbidas amnium conualles & depressos apricorum vdorum margines æstate floret. Calidæ & sicca naturæ. Pressu nitrosum extergentemque remittit succum. Vnde vi pollet abstersoria, adeo ut etiam pituitam è capite eliciat ac sternutamenta moueat tanta violentia, ut partum mortuum excutiat.

Rustica gens puluere ascarides puerorum expellit.

Abstergit scabiem & omnes cutis fœditates.

Satyrium abortiuum.

Orchis abortiuæ.

Nidus avis *Lugdunens.*

Dentaria aphyllis minor.

Niesla Dod.

Margendrehen.

Vogelshest.

Wurmwurtz/ *Sil.*

Syluas

Syluas sectatur montium
vmbrosas. Iulio & Augusto
flores in nudo coliculo pal-
lent.

Radiculæ vermiculis si-
miles pulu. contra Lumbri-
cos bibuntur.

Saxifragia alba.

Σαξίφραγον.

Saxifragia alba Chelido-
nides *Aduers.*

Saxifragia 4. *Mattiol.*

Weisse Steinbrech.

In collibus apertis, gra-
minosis, herbidis. Maio
cum floribus ad medicum
vsum colligitur.

Grana radicibus hæren-
tia amara sunt & acria. Ab-
stergunt, incidunt, attenu-
ant.

Decocta crassa & gluti-
nosa à Pectore educunt, far-
ctus Renum & Vesicæ exter-
gunt, Calculum expellunt:
in difficultate urinæ non
contemnendi vsus.

Saxifragia aurea.

Χρυσοκόληνιον *Tabern.*

Saxifragia aurea Lichenis
facie & natalitijs *Aduers.*

Hepatica aurea nonnul-
lis.

Gulden Steinbrech.

Butterblumen *Sil.*

Gelb Leberfraut.

Sequitur opaca montosa.
Ad riuiolos, fontes, aquarum
scaturigines Aprili aureo lu-
cet flore. Folia integro vi-
rent anno.

Gustu siccatur, adstringit,
abstergit.

Vsus eius non alius quàm
Hepaticæ aut Lichenis fon-
tanæ.

A vaccis si deuoretur, bu-
tyrum inde flauescere villi-
ci obseruarunt.

*Scabiosa maior vul-
garis.*

Ψάχα Αἰθῆ.

Scabiosa campestris seu
segetum & satorum *Lob.*

Scabiosa *Officin.*

Herba Apostematica.

Scabiosenfraut.

Blaw Kormrosen

Gliederlunge

Oderlunge

Sil.

In segetibus planis & le-
tioribus passim obuia.

Sapore est amaro, partium
tenuium.

Herba est πολύχενος. Con-
fert aduersus tussim vete-
rem, respirationis difficul-
tatem, Laterum dolores &
alia huiusmodi Pectoris vi-
tia. Purulenta expurgat.

Decocta cum Theriaca
seu

seu Mithridatio vtiliter in febris pestilentibus bibitur. Ad Carbunculos efficacax.

Scabiosa maior albo flore.

Scabiosen mit weissen blumen.

Weisse Kornrosen.

Inter segetes quandoque occurrit.

Scabiosa media.

Scabiosa minor seu Columbaris *Aduers.*

Scabiosa minor *Mattioli.*

Klein Apostemkraut.

In pratis siccioribus nascitur.

Scabiosa minima aspera.

Aphyllantes 1. *Lugdunens.*

Stœbe minor.

Klein Scabiosen.

Blawe Glockblum.

Secus itinera asperis & fabulosis montosis vbiuis multa. Aestate floret.

Scabiosa lutea.

Scabiosa flore luteo odorato.

Geele wolriechende Scabiosen.

Plurima in aggeribus se-

cus itinera Ducatus Vratislauensis & Suidnicensis, alijsque campestribus. Floret Iulio, Augusto, Septemb.

Trita amaricat cum partium tenuitate, Pectoris & Vesicæ vlcera abstergit.

Scandix Plin.

Scandix Diosc.

Cherofolium aciculatum.

Pecten Veneris.

Nadelkörffel.

NadelNöhren.

Beckelkam.

Inter segetes Maio viget.

Crudum coctumue mansum Stomacho vtile est & Ventri.

Decoctum eius Vesicæ, Renibus & Iecinori confert.

Scandix repens.

Scandix minor *Tabern.*

Saxifragia minor.

Perchepier Anglorum *Aduers.*

Klein NadelNöhren.

Klein Nadelkörffel.

Arido & trito solo in agris vbertim luxuriat.

Manifestus amaror & acrimonia in ea percipitur. Calefac & sicc. 3. Mouet vrinas vehementer. Expurgat

gat Renes & Vesicam, aperit Hepar obstruatum, medeturq; Stranguriæ.

Scordium.

Σκόςδιον Diosc. ab odore Allium imitante.

Μυρτιάδα a Mithridate.

Triflago palustris Lobel.

Scordium minus Tabern.

Chamadrys aquatica.

Knoblauchsfraut.

LachenKnoblauch.

Palustribus oblectatur.

secus fossas & scrobes aquas habentes circa Vratisslauiam frequens. Iulio & Augusto flosculi prodeunt purpurei.

Tota planta grauem Allij odorem spirat. Amarum quiddam obtinet, acre & acerbum. Urinas ciet & Menses, venenis resistit, dysenterias iuuat, Pus e Pectore extrahit & vulnera glutinat. Contra pestilentes febres bibitur.

Tam putrefacientibus venenis animalium quam Medicamentorum deleterijs aduersatur.

Scorzonera.

Scorzonera Germanica.

Scorzonera latifolia 2.

C.B.

Schlangen Wurd.

Böhmische Scorzonera.

Ad montem à vulturibus denominatum circa Suidnicium Iunio & Iulio floret.

Veris initio radices elixæ in acetarijs eduntur. In febribus malignis vtilis.

Scrofularia maior.

Γαλίοψ Cord. Fuchf. & Dod.

Ocymastrum minus Trag.

Ficaria, Castrangula.

Millemorbia.

Kanckerwurtz Sil.

Fischwurtz/ Braunwurtz.

Palsia humidioribus & opacis locis prope sepes & vetustas maceries oritur.

Subtilium est partium & gustu amara.

Emollit, abstergit, resoluit, discutit. Vlceribus strumiosis, canernosis, carcinomatis atq; depascentibus fideratis satis oportuna.

Illita radix Hæmorrhoides sanat & scabiem tollit: recens disiecta admota Dentium dolores sopit.

Semen pondere 3j. Lumbricos ventris necat.

Sedum maius.

Ἀείζων μέγα, παρὰ τὸ ἀείζειν.

Semperuium maius.

Barba Iouis.

Bb

Bauß

Gauswurtz.

Donnerkraut.

Zimmergrün.

Nihil vulgatius, vñtatius, viuaciusq; in parietinis, tectis, imbricamentis.

Augusto flores gestat.

Refrigerat, humectat, leuiter quoque adstringit. Potandum datur contra dysenteriam Aluiq; profluuia.

Folia in ardentibus febribus ore retenta sitim sedant.

Per se vel cum polenta illita ad Erysipelata, Oculorum inflammationes, ambusta igni & podagras conferunt.

Succus illitus Capitis dolores mulcet, subditus in velere mensum abundantiam sistit: Lippitudinibus inungitur.

Destillatum ardentibus & biliosis febribus correptis haud frustrato successu propinatur a Mulierculis.

Sedum maius montanum.

Cotyledon 2. montanum *Clus.*

Grosse Berg Gauswurtz. Vberremo luxu ad saxa sub castro Kynast viret.

Sedum minus album.

Αιζώωρ λευκόν.

Semperuiuum minus herbaceo flore.

Vermicularis.

Crassula, *Officin.*

Blattlose.

Bleine Gauswurtz.

In petris, parietinis, macerijs & muris antiquis, nec non in scrobibus opacis latet. Contraria pollet facultate, nempe calefaciendi & vrendi.

Sedum minus montanum purpureo flore.

Aizoum hamatodes.

Blein Gauswurtz mit leibsfarben blumen.

Ijdem locis.

Sedum minimum.

Αιζώωρ ἑδος ἡτίον, Diosc.

Semperuiuum minimum, *Mattiol.*

Aizoum minimum, *Cord.*

Vermicularis.

Piper murinum.

Mauer pfeffer.

Stein pfeffer.

Batzentreublin.

Nieskraut } *Sil.*

Knorpelkraut }

Ramulis congestis arenosas saxosas moles collesq; aridos interdum cooperit.

Duplex occurrit, vnū insipidum, aliud feruidi gustus.

Acre

Acre calidum vehementer, foris admotum rubificat, & vesicas excitando tandem exulcerat. Inspidum refrigerat, siccatur. Igni sacro, ambustis, oculorum inflammationibus, capitis doloribus commodum.

Sedum alpinum Silvestricum.

Aizoun telephiū, *Lugdun.*
Blein Alpen Donnergrün.
Præruptis altissimorum montium locis.

Serpyllum vulgare.

Ἐρπύλλος, Diosc. à serpendo.
Σαχίφραγιά.

Serpyllum flore purpureo.
Cunilago.

Quendel/Quenlein.

Günerfraut.

Incultis & sterilibus marginibus latatur.

Odore ferè est Maioranæ, gustu acre, digerit, incidit, aperit.

Potui urinas, Menstrua mouet, obstructions Pulmonis, Iecoris & Lienis tollit Torminibus, ruptis, conuulsis auxiliatur.

In balneis & fomentis sudores elicit.

Serpyllum albo flore.

Serpyllum 4. album, *Trag.*
Weisser Quendel.
Iisdem locis.

Serpyllum citratum.

Serpyllum 2. citratum.
Serpyllum odore Citrij mali.

Citron Quendel.

Minus obuium, asperis Soli expositis locis. Præstantius & ad omnia vulgari efficacius.

Serpyllum Boiemicum odore vinctuoso suauissimo.

Serpyllum Pannonicū 3. angusto lanuginosoq; folio,
Clus. P.

Raucher zarter wolriechender Quendel.

Latè serpendo interdum magnos cespites occupat aridis & incultis collibus.

Tota planta pineum quodammodo seu resinaceum odorem trita refert, gustu calida.

Serratula tinctoria.

Iacea aromatica.

Serberscharten.

Schartenfraut/*Sil.*

Syluis humectis & pratis montosis familiaris: floret Iulio.

Calefacit & siccatur 2. gradu.
Bb 2

du. Datur vtiliter ruptis, conuulsis, ab alto deuolutis.

Radix tusa & imposita Hamorrhoidum dolores sanat. Ad Enterocelas seu Intestinorum ramicem. Iunio ad tinctorum vsum legitur.

Serratula I I.

Serratula tinctoria 3. Tabern.

Iacea aromatica.

Folia humi proxima profundius habet incisa.

Sefeli Peleponnese.

Σέσλι Πελοποννησιακόν.

Sefeli Peloponnense folio Cicutæ.

Sefeli Peloponnesiacum, Tabern.

Sefeli montanum 1. Clus. P.

Hirschwurtz/ Sil.

Möhrenkraut.

Pestilenzwurtz.

Pasim in montium herbis conuallibus exurgit.

Radix in fibras nonnullas crassiusculas diuaticatur. Odorata est & aliquantulum acris.

Flores Iulio in vmbella candidi: semen Augusto & Septembri maturescit.

Venenis aduersatur & pestilentia medetur.

Sefeli pratense Monspeliense.

Pastinaca syluestris nigra, Cord.

Silaus fortè, Plin.

Wilde Möhren.

In pratis montosis occurrit.

Sideritis I.

Σιδνήρις, Diosc.

Sideritis heraclea, Cl. H.

Herba Iudaica, Dod.

Tetrahit Herbariorū, Lob.

Zeißgenkraut/ Sil.

Feld Andorn.

Gliedekraut.

In collibus apricis & marginibus saxosis circa Grünbergam & Vratislauiam.

Iunio & Iulio floret.

Betonica odorem ferè æmulatur. Amariuscula & acris, exiccat, abstergit, adstringit, consolidat.

Vius eius frequens contra capitis dolores. Cerebrum & articulos roborat.

Insignis vulneraria.

Sideritis I I.

Sideritis aruensis flore purpureo.

Stachys aquatica, Tabern.

Pseudoclinopodium, Matt.

Brauner Andorn.

In agris.

Sium

Sium aquaticum odoratum.

Σιον, ἀπὸ τῆς αἰσῆς ἀκοῦτινδο.
Ἰσπορέλιον.

Sium, Dod.

Sium seu Lauer, Diosc. Olu-
fatri folio, seu Pastinaca a-
quatica, Lobel.

Apium palustre.

Wasser Peterlin.

Wasser Eppich.

Frosch Eppich.

In scaturientium fontium
riuulis stationem habet. Iu-
lio floret, Augusto semen
offert.

Odoratum est & gustu a-
marum. Excalescentis &
siccantis facultatis. Digerit,
vrinas mouet, Renum infar-
ctus expedit. Calculos Re-
nū frangit & Menses euocat.

Sium aquaticum II.

Sium 2. Olufatri facie, Lob.

Apium aquaticum angu-
stifolium.

Eosdem requirit natales.

Decoctum Hepatis ob-
structiones expedit, Aurigi-
nē tollit, Hydropicos iuuat.

Semen nonnihil acredinis
obtinet.

Solanum nigrum.

Σπεύχρος κηπάρις, Diosc.

Solanum vulgare.

Solanum holeraceum seu
esculentum.

Morella.

Schwartzes Nachtschat-
ten / Sil.

Sew fraut.

Vbius viarum & horto-
rum cultis & incultis scrobi-
bus, marginibus & areis lu-
xuriat.

Refrigerat, adstringit, me-
dium autem absolute in hu-
medando & exiccando ob-
tinens. Cibis idoneum est.
Crudis enim baccis pueri &
gens rustica sine noxa ve-
scuntur. Acres & mordaces
humores contemperat. Fo-
lia conuenienter illinuntur
Ignibus sacris, vlceribus ma-
nantibus, serpentibus & cu-
ratu difficilibus.

Trita Stomacho aestuanti
auxilantur, & Hepatis ar-
dori seu inflammationi, ad-
mota.

Succus eadem præstat.
Fronti illinitur contra capi-
tis ab aestu dolores, calidaf-
que oculorum fluxiones.

Agylopi cum fuluo gal-
linarum fimo subactus præ-
sentaneo est remedio.

Gargarismatis additur cū
aceto ad faucium & colu-
mellæ inflammationes.

Bb 3

Sola-

*Solanum rubrum.*Solanum fruticosum, *Gesn.*

Solanum γλυκύπικρον.

Amarum-dulce.

Roter Nachtschatten / *Sil.*

Je lenger je lieber.

Aquosa & rigua amat, ad sepes viasq; viginosas frutescit. In flore differentia existit, sæpe violaceum, rarius candidum fert.

Calefacit, siccatur 3. abstergit, digerit.

Gustanti primùm nonnihil amaroris exhibet calore & acrimonia linguam ferrens, quæ tamen ilico abeunt, persistente dulciculo & imbecillo quopiam sapore Glycyrrhizæ ingratiore fastidium pariente, magis magisq; dulcorem offundendo.

Potum moderatè, citra virium dispendium viscerumque incendium, egerit per sudores vrinasq; aquas, atque obstructions demolitur, quæ sunt icteri praviæ atque alumnæ. Eadem facultate Lac Mammis suggerere fructus potis est.

Baccæ ex vino 40. diebus Splenem liquant, & per urinam & aluum absumunt. Bibuntur ad Orthopnœam, reliquias à partu purgant.

Folia foris vtiliter contra inflammationes & pruriginosos pedum tumores admoventur, Plebis vulgato experimento.

*Solanum montanum.*Σπέρχνος μελαχροίνεσσος, *Thal.*Solanum somniferum, *Lob.*

Solanum furiosum.

Bella donna, *Ital.*Wolfsbeeren / *Sil.*

Schlaffkirschen.

Dollkirschen.

Wald Nachtschatten.

Vmbrosa & opaca sectatur montium loca, velut in Hochwalde / non longè à Schœnouio.

Refrigerat ordine 3. siccatur 2.

Fructus comesti soporem inferunt, Nervos consopiant, adeò ut veterum, tremorem, convulsionem & insaniam inducant.

Quod exemplis puerorùm quorundam constat, qui cū baccas loco cerasiorum comedissent, somno semisepulti & mente conturbati ferè interierunt; sed tandem vini & theriacæ usu fuere restituti.

Solidago Sarracenica alpina.

Conso-

Consolida Sarracenicæ.

Serrifolia, Cord.

Herba fortis.

Heidnisch Wundkraut.

Magdehülle / Sil. corruptè
potius Nachtheil.

Plurima montosis & ne-
morosis vdis fruticat. Iulio
aureis ornatur flosculis.

Gustu adstringit modice-
que amara est, ficeat eu-
identissimè, claudit, iungit,
conferruminat vulnerum la-
bra.

Ex vino hausta perquam
accommoda Renibus, He-
pati, intestinisq; exulceratis
& dissolutis.

Miscetur potionibus, quæ
vulneratis, cæsis, ruptis aut
ex alto delapsis propinatur.

Sonchus asper.

Σόνχος ἀσπερ. Diosc. ἀπὸ τοῦ σπέρ-
ματος, quod salutare fundat
succum.

Sonchus lævis tenerior
latifolia Lobel.

Suillus Carduus.

Cichorium porcinum.

Endiuia spinosa.

Stechende Gewdistel Sil.

Gänse-distel.

Agris incultis & hortis o-
leraceis familiaris. Acsta-
te floret.

Sapor ei amarus aquea

dulcedine permistus: semen
dulce odore Papaveris.

Tam herba quam succus
ad æstuosas Stomachi lanci-
nationes & Hepatis biliosas
obstructiones vtilissima: ob
id Tertianis & putridis fe-
bribus conuenit.

Sonchus lævis vulgaris.

Σόνχος λαῖος Diosc.

*Sonchus lævis folijs laci-
nosis Dentis Leonis Lobel.*

Intubus fylu. seu erraticus

2. Trag.

Hasenföl.

Linde Gewdistel.

Iisdem fruitur locis: nec
differt facultatibus.

Ex vino Stomachi fluxio-
nibus medetur.

Suspiriosos & Asthmati-
cos iuuat & Stranguriam fa-
nat.

Succus Auribus instillatus
earum dolores mulcet.

Sonchus lævis latifolius.

Sonchus lævis 3. Tabern.

Breitbletterter Hasenföl.

Sonchus lævis angustifolius.

Σόνχος ἐλάσιος.

Sonchus lævis tenerior Lob.

Intubus fylu. seu erratica

acutis folijs Trag.

Son-

Sonchus esculentus.

Brassica leporina.

Weicher Hasenföhl.

Weiche Sewdistel.

Estur olerum modo, cum adhuc viridis & tener est, præsertim radix elixa in accarijs.

Sonchus alpina cœrulea.

Sonchus flore cœruleo

Clus. P.

Intybus *μαλίσκος* Harcynica Thalij.

Blaw Berghasenföhl.

Sette Henne 2 sil.

Wald Mohens

Plurima humidis & umbrosis saltibus montium. Floret Iulio & Augusto.

Pabulum pecori gratissimum.

Sonchus arborescens.

Sonchus laevis altissimus seu 3. Cl. P.

Σβυχας τρυφερός Diosc.

Baum Sonchenfraut.

A vulgari magnitudine differt.

Sorbus montana aucuparia.

Βουξία Dod.

Sorbus torminalis Dalech.

Fraxinus bubula Dodon.

Eber Eschbaum.

Grosser Malbaum.

Vogelbeeren.

Arbor notissima, montibus propria. Iulio flos in corymbis exit candidus; fructus sequitur primum viridis, deinde rubet.

Fructus adstringit, siccatur, repellit, Auius potius quam hominibus expetitur.

Turdus in cibum venit, quibus etiam Autumno frequenter ab Aucupibus capiuntur.

Sparganium ramosum.

Σπαργάνιον Diosc. q. fasciatis.

Σίφιον Gal.

Platanaria seu Butomon Dodon.

Butomos Theoph. Lobel.

Phleos fem. Lugdun.

Agelsknospen.

Schwertelried.

Degenfraut.

Palustribus & riualis tardè fluentibus oritur.

Siccandi vim habet.

Sparganium non ramosum.

Sparganium rectum.

Sparganium 2. Lobel.

Degenfraut.

Auffrecht Agelsknospen.

Spergula

*Spergula albo flore.*Sagina spergula *Aduers.*Weisser Knödrich. *Sil.*

In agris tam cultis quàm incultis prouenit, solo plerunq; arenoso.

Plantis pedum supposita trita, nimium Mensium fluorem inhibet.

Spergula purpurea.

Leibfarben oder Roter Knödrich. *Sil.*

Sabulosis, incultis. Maio flosculi gliscunt rubentes: semen minutum succrescit in theculis fuscum.

Inspida est, tantillum acrimoniae linguae imprimens.

*Stachys.*Stachys vera *Mattiol.*

Stachys maior germanica *C. B.*

Lychnitis seu Stachys spuria Flandrorum. *Lob.*

Marrubium montanum.

Elæxus Diosc.

Riechender Andorn.

Asperos montes & colles sequitur. Iulio floret.

Gustu est acri & amaro. Calefacientis & siccantis naturæ.

Folia decocta pota expurgant pectus, Menses & Sc-

cundas pellunt, abortumq; faciunt.

*Stachas citrinum.*Xeranthemum *Diosc. Aduers.*

Amaranthus luteus.

Winterblumen *Sil.*

Mottenkraut.

Schabenkraut.

Aridis & sterilibus collibus Aestate flores promit aureos.

Gustu est aromatico, medicato, acuto & feriente linguam.

Iecinoris obstructions aperit, Regium morbum sanat.

Flores apponuntur vestimentis ut tineas pellant.

Lixiuio induntur ad capillos tingendos.

Succisa.

Præmorfa.

Morfus Diaboli *Lobel.*Iacea nigra *Brunfels.*

Abbis.

S. Peterskraut.

Iulio & Augusto pratis humectis flores promit.

Amara est gustu, calidi sicciq; temperamenti: abstergit, incidit, discutit.

Aduersus ictus virulentorum, venena & pestilentes morbos non minus quàm

Cc

Scabio-

Scabiosa efficax. Sanguinis grumos dissoluit, & ventris tincas expellit.

Præsentaneum remedium ad maturandos Carbunculos herba recens imposita, & ex vino pota.

Symphytum maius purpureum.

Σύμφυτον μέγα, παρὰ τὸ συμφύειν, à consolidando.

Σύμφυτον ἔπειον Diosc.

Symphytum maius rubens Cord.

Symphytum alium seu alius Aduersar.

Consolida maior Offic.

Walwurz.

Beinwelle.

Schwartzwurz.

Beinwurz.

In pratis pinguibus & hortis nonnullis sponte luxuriat. Floret Iunio & Iulio.

Radix omnium maximè viscida ἀπείρος siue exqualis, & qualitatis gustabilis expers.

Tota vulneraria est. Radices decoctæ & potæ cruentis expuitionibus, gutturi asperitatibus, omnibusq; internis rupturis profunt. Dysenteriam, rubra feminarum profluvia, Renum vlcera etiam diuturna curant, & pro-

fluentem ex his sanguinem sistunt. Hæmorrhoides etiam nimium profluentes reprimunt impositæ.

Ossibus fractis medentur & Enterocelas impositæ cohibent.

Symphytum maius album.

Symphytum maius candidis floribus.

Symphytum femina.

Vnctuosa.

Beinwelle Weiblin.

Humida & opaca desiderat loca.

Earundem virium. Recentia vulnera glutinat, & ad rupta vnice commendatur.

Tanacetum luteum.

Ἀρtemisia λεπτοφύλλος Fuchs.

Tanacetum Millefolij folijs Aduers.

Artemisia tenuifolia, Tabern.

Athanasia Ruell.

Reinfarn.

Revierblumen/ Sil.

Wurmfrant.

Vulgaris notitiæ, passim ad margines agrorum, pratiorum, secus fossas & aggeres Iulio & Augusto flores in umbel-

umbella luteos Agerati exhibet.

Amara est & cum incunditate quadam graueolens.

Excalescit, siccatur, abstergit, aperit.

Alui, Ventriculi, Intestinatorum flatus pellit. Lumbricos enecat, Renes purgat, vrinam ciet & Menses: Ventrīs torminibus succurrit, Vterum & genitalia roborat. Gallico resistit.

Decoctum in peste laudatur. Sudores enim facto experimento euocat.

Oleum ex semine arte chymica extractum vmbilico Infantum illitum tineas ventris expellit torminibusque medetur.

Tanacetum leucanthemum.

Tanacetum inodorum 2.

Clus. P.

Sideritis Italorum Lob.

Marricaria sylvestris.

Wilder Metram.

In montibus occurrit æditis & cædis syluis.

Taxus.

Θμίλος Theoph.

Σμίλαξ Dioscor.

Κάκλος Gal.

Smilax arbor.

Zbenbaum.

Zibenbaum.

Plerisque montium Conuallibus arborefcit.

Maio flosculi exeunt nouis germinibus: bacca rubent maturæ.

Ligni materies est ruffa, venosa, robusta & ferè incorrupta, ex qua hastæ, arcus, canthari, cochlearia parantur.

Rasura ligni vulgi experimento contra morsum Canis rabidi datur. Succus verò arboris ad viperæ morsum multum facit. Suffitu necantur Mures.

Taxum Narbonicam & Hispanicam deleteriam solâ vmbra prodidit Antiquitas: in Silesia nequiquam malefica & vmbra periculo caret.

Telephium album.

Τηλέφιον, Diosc.

Faba inuersa seu crassula, *Aduers.*

Anacampteros, *Gesm.*

Crassula maior.

Wolfskraut.

Fette henne.

S. Johannis pflanze.

Bnabenkraut.

Agris & syluosis marginibus nonnunquam occurrit

Cc 2

vulgo

vulgo notum. Iulio & Augusto floret.

Calidæ & cum essentiæ tenuitate resiccantis & abstergentis facultatis. Sanat & glutinat omnis generis vulnera, maximè interna. Herniosis mirè confert.

Folia tusa rec. fronti admota sanguinem è naribus fluentem reprimunt.

Maleficiatis ægris sanitatem celeriter reddere & incantatione ligatos soluere Plebs superstitiosa credit.

Telephium purpureum.

Crassula purpurea, Offic.

Braun Wundkraut.

fette henne.

Rarius in montibus petrosi locis reperitur, earundem virium.

In internis vulneribus & Hernijs à Recentioribus maximoperè commendatur.

Thalictrum alpinum.

Thalictrum magnū, Diosc.

Barba capræ minor.

Ruta capraria Nonn.

an *Salmon*, Diosc.

Sonnenwirbel/ Sil.

Wald Raute.

Graw Bergmennlin.

Heile blatt.

In altioribus montium

humidis syluis ad duorum cubitorum altitudinem asurgit. Moderatè calefacit vnicè resiccans.

Folia trita vlcera vetera ad cicatricem perducunt.

Thalictrum pratense.

Ruta pratensis Herbarior.

Lobel.

Ruta pratensis minor, Tab.

Wilde wiesen Raute.

Klein Sonnenwirbel.

Graw Mennlin.

Ad pratorum margines passim.

Maio comam ex cœruleo albicantem surrigit.

Folia mansa instar Liquiritiæ dulcia sunt, vulnera sanant.

Thalictrum luteum.

Thalictrum tenuifolium,

Cord.

Peganum, Lugdunens.

Ruta pratensis maior, Tab.

Rhabarbarum spurium.

Saxifragia lutea, Gesn.

Gele wiesen Raute.

Wilde Raute/ Sil.

falsch Rhabarbara.

In pratis agri Hirsbergensis vdis & riguis trium quatuorue cubitorum altitudinem aliquando excedit. Iulio flores luteoli.

Ama-

Amarum est gustu & sub-acre. Odorem vibrat virosum. Calefacit, siccit, abstergit. Odor Epilepsiâ correptos excitat.

Radix lutea pediculis & atomis seu cirenibus interficiendis, Balneis additur.

Thlaspi latifolium.

Θλάσσι, πλατύφυλλον.

Thlaspi vulgarissimū Vaccariæ folio.

Thlaspi verum & vulgare, Iohan. Bauh.

Thlaspi, Officin.

Gros Seckelkraut.

Gros Teschelkraut.

Agris incultis secus itinera & margines agrorum.

Semen acre est, calefacientis & siccantis naturæ. Attenuat, prouocat, incidit, vrit, perinde vt Nasturtij semen.

Thlaspi latius maius.

Θλάσσι.

Σίμνιον ἀγρίον.

Thlaspi Diosc. Drabæ folio & Chamælinæ, Aduers.

Thlaspi Cardamoides, Cord.

Nasturtium sylvestre scandulaceum.

Breit Teschelkraut.

Teschelfresse.

Bawrensenff.

Maio, Iunio & Iulio cum semine in aruis viget.

Semen acre est, bilem extrahit potum. Internas supurationes rumpit.

Thlaspi album supinum.

Thlaspi album 1. & 2. Tab.

Thlaspi album supinum, Lobel.

Weisser Weg oder Bawren Senff.

Weisse Wegekresse/Vratissl.

Circa Vratisslauiam secus vias extra pagos passim provenit: Aestate florescit & semen fert.

Calefacientis & siccantis naturæ.

Herba incensa pestis tempore Aëris vitia corrigere vulgus credit.

Thlaspi minus Osyridis folio.

Thlaspi Osyridis folio acerrimum & album, Lobel.

Alyssum minimū, Clus. P.

Thlaspi minus germanicum.

Steinfraut/Wegkresse.

Klein Besemkraut.

Vbiuis viarum incultis oritur.

Calefacit & siccit 4. gradu semen. Causticæ facultatis.

C c 3

Ad

Ad calculum laudatur.

Thlaspi luteum repens.

Thlaspi luteū supinū, Lob.

Thlaspi supinum montanum luteum.

Blein friechend Thlaspi.

Arenosa perreprat loca.

Tilia mas.

Θιλιεα ενιερη.

Tilia saxatilis, Matt.

Tilia montana minore folio.

SteinLinde/ WaldLinde.

Syluarū & montiū incola.

Tilia femina.

Θιλιεα, Dioscor.

Tilia, Dodon.

Tilia sativa siue fecunda latiore folio.

Linde/ Lindenbaum.

Arbor in Cœmiterijs, arboris, hortis & sylvis notissima.

Adstringit, glutinat, discutit, inspissat, abstergit, repellit.

Folia trita & aqua conspersa, pedum tumores discutiant & reprimunt, singulare contra Spasmodum flatulentum in gravidis remediū, Emplastri modò imposita.

Cortex medianus vulnera recentia glutinat, & ambusta sanat.

Flores Iulio leguntur calidæ & siccæ naturæ, tenuiū

partium, odorati. Aduersus Epilepsiam, vertiginē, Apoplexiam, Paralyfin. Tormentibus ventris auxiliantur.

Aqua elicitur ex floribus ad eisdem usus.

Viscum Tiliaceum Caduco morbo obnoxijis salutare.

Ligni carbonēs puluerantur ab alto deuolutis, fractis aut contusis.

Adduntur trochiscis profumo.

Tithymalus pinea.

Tithymalus Cyparissias

Trag. & Mattioli.

Esula, Officin.

Πιτυλλον, Diosc.

Cypressene Wolffamilch.

Esselfraut.

Plurima secus itinera & aggeres viarum sterili & inculto solo. Maio floret, Iunio semen maturum.

Impensè calida est & acris, exulcerans, ventriculo molestissima.

Aluum turbat Radix, pituita detrahit, bilem aquosq; humores. Corrigitur Cordialibus, Stomachicis, viscidis & roborantibus scilicet ut acrimonia, caliditas & vis Stomacho inimica emendetur. Hydropicis propinatur.

Purgatorium est Rusticorum

rum & Empiricorum, qui nihil præter Esulam, Helleborum, & Antimonium agris offerre solent.

Scabiem sanat contagiosam capitis, den Erbgrind.

Lac recens perunctum exulcerat, capillos euellit, verrucas, Impetigines, thymos delet.

Tithymalus Cupressina.

Τιθύμαλος κυπρεσσίνης.

Tithymalus cupressinus seu Humipinus, Lob.

Tithymalus Cyparissias, Dodon.

Esula Cyparissina seu Cupressina.

Kleine Wolffsmilch.

Cypressene kleine Wolffsmilch.

Incultis agris & sabulosis tumulis Maio & Iunio floret: semen Iulio maturescit.

Tithymalus Cyparissias rubente capitulo.

Tithymalus syluaticus capitulis rubentibus.

Wolffsmilch mit roten Endpflin.

Wald Wolffsmilch.

In collibus & montibus sterili & aridiore solo.

Tithymalus σικλόφυλλος.

Tithymalus folijs punctis croceis notatis.

Punctirete Wolffsmilch.

Asperis & sobulosis passim cum Pineis secus itinera & agrorum margines.

Tithymalus leptophyllos.

Tithymalus minimus, Tabern.

Esula exigua, Trag.

Stein Milch.

Die kleinste Wolffsmilch. Iisdem natalibus.

Tithymalus πλατύφυλλος.

Tithymalus latifolius montanus.

Esula latifolia.

Berg Wolffsmilch.

Syluarum & montium incolae.

Tithymalus ἐράνθεμος.

Pityusa seu Esula minor altera floribus rubris, Lob.

Wolffsmilch mit roten blumen.

Tithymalus ἡλιοσκοπιος.

Tithymalus helioscopius siue Solisequius, Aduers.

Tithymalus Portulacæ-folius.

Lactuca solisequia.

Wolffsmilch / Sil.

Bundes

Hündemilch.
Sonnenwendende Wolffsmilch.

Hortis oleraceis molestus
 vbiuis notissimus.

Trahit bilem per aluum
 cum Oxyelite.

Tithymalus fruticosus
palustris.

Wasser Wolffsmilch.
 Ad sabulosas crepidines
 fluminum.

Tormentilla.

Ἑτάφυλλον, Hermolai.

Quinquefolium Tormen-
 tilla, C. B.

Consolida rubra.

Birchwurtz.

Nabelwurtz.

Rhurwurtz.

Hünerwurtz / Sil. quòd
 gallinarum grauedinem ex-
 cutiat.

Montium nemorosis sic-
 cioribus macilentiorib. pra-
 tis familiarissima.

Siccat absque manifesto
 calore. Attrahit, sanat, con-
 solidat Radix.

Datur ruptis, ex alto de-
 lapsis, dysentericis alui de-
 fluxionibus.

A peste præsruat pueris
 & grauidis in cibo sumta.

Dentium cruciatus & tor-
 menta aufert recens impo-
 sita aut decocta.

Extractum Tormentilla rubi-
 cundum acquirit colorem.
 In Dysenteria, cholera & v-
 teri hæmorrhagia certū ex-
 perimentum. Abortum pro-
 hibet cum Corallio rubeo &
 aqua Nuc. mosch.

Exiccatum velut gummi
 splendet, sanguinem Dra-
 conis repræsentans, cuius
 defectum commodè supple-
 re potest.

Tormentilla alpina.

Tormentilla maxima.

Grosse Kiesenbergsche
 Hünerwurtz.

Rotwurtz.

Radix non tantum breuis
 & nodosa; sed prælonga
 brachiataque est, rubra &
 odorata.

Ad lacus Suditorum, nec
 non circa gigantæum repe-
 ritur.

Radix venenis resistit, dys-
 enteriam contagiosam & om-
 nes Sanguinis eruptiones
 compescit. Herpetes, Stru-
 mas, durities sanat. Pesti-
 lentibus morbis commoda.
 Fortiter enim putredini ad-
 uersatur & sudores mouet.
 Idcirco Antidotis & magnis
 compo-

compositionibus vtiliter additur.

Trachelium maius purpureuolascum.

Τραχύλιον.

Trachelium maius, *Aduers.*
Ceruicaria & Vvularia,

Trag.

Trachelium folijs Vrticæ.

Campanula vrticæ folio.

Braune Glocken.

Galstfrant.

Braunfingerhüttlin.

Pratis & syluis cæduis sal-
tuosis obuiam.

Adstringit, exiccat, ceruicis, colli & oris exulcerationibus gargarizatu opitulatur.

Trachelium maius albo flore.

Ceruicaria alba, *Trag.*

Weisse Waldglocken.

Tapffenfrant.

In conuallibus ad Bob-
rum vmbrosis Iulio floret.

Trachelium minus.

Trachelium minus pra-
tense umbellatum.

Ceruicaria minor.

Klein Galstfrant.

In agris & pratis aridiori-
bus frequens.

Trachelium alpinum maximum.

Ceruicaria maxima.

Grosse Berg Glocken.

Ad hominis proceritate
sæpe in foveis niualibus vdis
herbidis assurgit.

Iulio flores campanulati
prominent.

Tragopogon luteum maius, minus.

Τραγοπόγων.

Barbula Hirci.

Josephs blumen.

Bocksbart.

In campestribus & agge-
ribus pingui solo congestis
lætatur. Maio & Iunio flo-
ret, semine paulò post cum
pappo auolante.

Radix lacte turgens cale-
facit & humectat. Affecti-
bus Pulmonis, Asthmaticis
& tabidis utilis.

Tribulus aquaticus.

Τρίβλος ἐν ὕδατι Diosc. Ἐπὶ τριῶν
βελόνων, à tribus iaculis seu cu-
spidibus, quib. munitus est.

Tribulus marinus, *Officin.*

Wassernüsse.

Weier Nüsse.

See Nüsse.

Strachel Nüsse.

Lacuum & stagnantium

Dd

aqua-

aquarum alumna.

Nuci inest emplastica ob-
struendique vis. Aluum con-
stipans.

Inflammationes omnes
cataplasmate iuuat : vlcera
oris, gingiuas tonsillasque
per sanat.

Nucleus recens calculosis
utilis.

Tribulus terrestris.

Τρίβυλος χερσάνος.

Lappa campestris.

Burgeldorn.

Campestris est, tenuium
partium.

Calculus semen atterit.

Tridactylites cœrulea.

Dactyliobotanon cœru-
leum, Thal.

Alfine Tridactylites cœ-
rulea, C. B.

Blaw Gendlin fraut.

Blaw Hungerblümlin / Sil.

Agris arenosis & macilen-
tis verno tempore vbertim
luxuriat circa Hirsbergam.

Annonæ caritatē eius pro-
uentum prælagire vulgus
obseruauit.

Aestiuis caloribus perit.

Tridactylites albicans.

Weis Gendelin fraut.

Flosculis differt, forma

& natalibus idem.

Trifolium pratense

vulgare.

Τρίφυλλον πορφύρεον.

Trifolium incarnatum
seu rubrum.

Braun Wiesen Blee.

Roter Blee.

Nuspiam deest pratis &
herbidis locis.

Flores vim obtinent re-
frigerandi & siccandi.

In Enemate additi, Inte-
stinorum rosiones ac dolo-
res sedant, & viscidos len-
tosque humores inhærentes
Intestinis educunt.

Trifolium pratense

album.

Τρίφυλλον λευκόν.

Trifolium album, Tabern.

Weisser Blee.

Agros quiescentes & pra-
ta ficciora floribus candidis
Iulio sæpe integrè cooperit.

Flores poti ad alba vteri
profluuia vtiliter bibuntur.

Apes his maximoperè de-
lectantur.

Trifolium sylvaticum al-

bium maximum.

Weisser Wald Blee.

In ericetis sylvosis non
densis. Iunio floret.

Trifo-

Trifolium agrarium.

Trifolium pratense luteum, *Fuchf.*

Trifolium luteum minimum, *Lobel.*

Melilotus 6. *Trag.*

Τρίφυλλον ἄγριον.

Geeler Feld Blee.

Stein Blee.

Pratis hortis oleraceis & agris notum.

Trifolium lupulinum.

Trifolium luteum 2. Lupulinum, *Thal.*

Lupulus syluaticus, *Vulg.*

Hopffen Blee.

Geeler Wiesen Blee.

Unser Frauen Hopffe/*Sil.*

Campestribus & pratensibus Aestate & Autumno occurrit.

Trifolium corniculatum.

Trifolium siliquosum minus, *Tabern.*

Melilotus nobilis, *Trag.*

Melilot^o coronata, *Aduersf.*

Geeler Schotten Blee.

Vogels Wicken.

Wilder Stein Blee.

Sicca prata viarumque margines amplectitur, per æstatē flosculos croceos explicans, semine in siliquis Autumno maturescen-

te. Euidenter adstringit, refrigerat, siccatur. Incipientibus Inflammationibus perutile. Odor floribus imbecillior: Mellis ferè viribus quàm proximè ad Melilotum accedens.

Trifolium palustre.

Ἰσόπνευς, *Diosc. Nonn.*

Μυρίαδερ.

Trifoliū paludosum, *Lob.*

Trifolium fibrinum.

Bona hircina, ab odore olido.

Biber Blee.

Lungen Blee.

Bockbohnen.

Creutzwurtz/*Sil.*

Huius natales sunt vdamontium loca. Ad fossas piscinarum territorij Hirsbergij Aprili & Maij initio flosculos elegantes calyculatos promit, quibus mox theculæ semē claudentes succrescunt.

Tussilago alpina maxima.

Καρχαλία & λεοντική, *Diosc.*

Tussilago alpina maior, *Gesner.*

Tussilago alpina siue montana, *Lugdun.*

Cacalia, *Lobel.*

Grosser Berg Lattich/*Sil.*

Ross Lattich.

D d 2

Sudito.

Suditorum iugis opacisq;
supercilijs prope fluentes &
aquarum scaturigines pluri-
ma frutescit. In caule bicu-
bitali Iunio flosculos edit
purpurascētes, qui citò cū
lanugine auolant.

Tussilago alpina
minor.

Tussilago montana mi-
nima, *Lobel.*

Tussilago 2. alpina *Clus.*
Lugdun.

Asarina, *Mattiol.*

Hederula saxatilis.

Heidnisch wundkraut } *Sil.*
Gröschlin kraut }

Passim perreptat altiora
humida & vmbrosa mon-
tium loca.

Iunio in coliculo nudo do-
drantali concauo florem e-
rigit purpurascētem, qui ci-
tissimè in pappum euanesce-
re & perire, folijs integro viren-
tibus anno.

Gustus radiculis acutus
cum leuiuscula quadam a-
maritudine & salsedine.

Vim habet calefaciendi
& siccandi. Attenuat, inci-
dit, abstergit, tenuium par-
tium.

Aluum ducit, crassam pi-
tuitam & acres humores.

Additur commodè deco-

ctis Hydropicorum & lœ-
ricorum.

Ad Sonticum morbū Ner-
uorumque resolutiones ab
alijs commendatur.

Tussilago vulgaris.

Béxor, Diosc. & τὸ τῶ ἰατρ. βῆξα.

Farfara, *Lobel.*

Bechium, *Dodon.*

Farfugium.

Suff Lattich.

Brand Lattich.

Chmbletter / Sil.

Vda sata crepidinesque
fluminum sectatur. Recentia
folia humida & frigida; sic-
ca verò modicè acria & ca-
lida.

Decocta tussientibus &
Orthopnoicis prodest, Pe-
ctoris vomicas rumpit.

Aduersus calidos capitis
dolores & æstus febrium ar-
dentium vtiliter folia adhi-
bentur: illita & imposita
ambusta sanant.

Typha palustris.

Τύφη, Diosc.

Typha aquatica.

Kolben / Weiher Kolben.

Narren Kolben / à flore
denso, clauæ simili, in lanu-
ginem euadente.

Natales eius sunt amnes
leniter fluentes, vada item,
flagnan-

stagnantesque & palustres aquæ.

Evidentiſſimè refrigerat & ſiccatur.

Lanugo axungia permixta ambuſtis partibus tumorem & inflammationē arcet.

Ad Enterocelas ſumta & admota prædicatur.

Lanugo ſuffocationis periculum comēſta minatur. Mures occidit.

Vaccinium nigrum.

Vitis Idæa minor, *Thal.*

Pſeudo-Myrtus, *Tabern.*

Myrtillus, *Offic.*

Myrtus terreſtris ſeu pumila.

Χαμαμύρην, Peuc.

Heidelſtrauch.

Blanc Heidelbeer.

Staudelbeer / Roſsbeer.

Macro ſteriliq; ſolo ac incultis ſyluoſisq; locis nihil frequentius.

Maio floret. Fructus Iulio maturus nonnihil refrigerat, exſiccatur, adſtringit, roborat, reſſumit, cohibet.

Baccæ auſteriuſculæ ſunt & vinoſæ, crudæ eduntur.

Paupercula plebs ex his pul-tes cum farina coquit haud ingratas.

Siccata ventriculo æſtu-

anti conueniunt, ſitim auertunt, ardentium februm æſtus mitigant. Aluum reſſumunt, vomitum ſiſtunt, dyſenteria ex bile natam curat.

Rob ex ſucco cum ſaccharo paratur ad omnia præferendum.

Vaccinium rubrum.

Χαμαμύρος.

Vitis Idæa rubra, *Mattiol.*

Erica baccifera latifolia,

Tabern.

Vua Vrſi, *Anguil.*

Rote Heidelbeer.

Rote Preuſſelbeer.

Preuſſelbeer.

Rauſch / *Tabern.*

Syluoſis & ſaxoſis montium, vaſtis etiam ſyluis circa Boeſſaniam & Saganum plurimum. Floſculos Maio & Iunio inſtar vtriculi concavos blandè rubentes exhibet. Auguſto baccæ rubent.

Baccæ ſapore ſunt acidæ & adſtringentes magis, nec perinde ſucculentæ vt Myrtilli. Frigida & ſicca his conceſſa facultas ſimulq; adſtringens.

Probantur ſiccæ in calculo, dyſenteria & diarrhœa.

Ex ſucco Rob conficitur addito ſaccharo, Ventricu-

Dd 3

lo æſtu-

lo æstuant & à Cholera male affecto gratissimum.

Ad intinctus etiam additis aromatibus commodè usurpatur.

Vaccinium alpinum.

Vitis Idæa 2. Clus.P.

Vitis Idæa nigra maior

Thal.

Vitis Idæa maior Gesn.

Jegerbeer.

Grosse Heidelbeer.

Rausch Sil.

Nascitur in montibus & solitudinibus syluosis.

Fructus per maturitatem niger Vaccinio nigro similis saporis gratia commendabilis, plurima grana in se continet.

Folia adstringunt & non nihil acidum sapiunt.

Tinctores virgultis cum folijs frequenter vtuntur.

Vaccinium palustre.

Oxycoccon Cordi.

Acinaria palustris.

Erica baccifera Mattiol.

Erica sexta baccifera Dod.

Lugdun.

Πιόνιον, Thal.

Mosbeeren / Moselbeeren.

Gichtkraut / Affenbeer.

Winterbeere / Rauschgrün.

Vdis muscosis syluis Ericetisq; montium Suditorum passim luxuriat, & viticulis tenuibus muscum perreptat.

Flosculi purpurei, Solani rubri, minores, apiculis flavescentibus Maio & Iunio hiscunt, Baccæ autumno maturescunt, tota hyeme sub nive latitantes incorruptæ, quas verno tempore Pueri & Pastores colligunt, ac pulpa molli turgentes sine detrimento comedunt.

Folia adstringenti vim fortiuntur.

Fructus acidum sapit & egregiè adstringit cum leuicula abstergendi facultate.

Valeriana media.

Φεμυδρ.

Phu paruum.

Valeriana minor vulgaris.

Valeriana sylvestris Advers.

Gemein Baldrian.

Augenwurz.

Bedram Sil.

Humectis locis ad margines pratorum ripasq; fluuiorum passim reperias.

Iulio floret copiosissimè altiss. herbis montium conuallibus.

Radix odorata, gustu acrior est. Excalescit & siccatur valen-

valentius quàm maior.

Aperit, attenuat, venenis aduersatur.

Ruptis, Conuulsis ex alto præcipitatis secundum Recentiores datur.

Visum exacuit, ob id à febribus libenter deuoratur.

Radicula decocta suffitu peculiariter valent ad testium tumores à frigidityte aut flatu genitos.

Herba cum radice contusa & imposita capitis dolores, imperus ac compunctiones eius sedat tollitq; : ad Erysipelata Oris & gingiuarum exulcerationes efficax remedium.

Valeriana montana.

Phu montanum.

Berg Baldrian.

Locis humidis & herbidis montium nota.

Valeriana agrestis.

Phu minimum Lobel.

Olus album Dodon.

Bupleuron Casalp.

Pes Locustæ Auic.

Λευκόφυλλον Dod.

Acker Baldrian.

Wiesefraut.

Blein Kapungelin.

In satis tota hyeme viret

latissimè. Estur in acetarijs per hyemem.

Sapore quodammodo insipida est. Refrigerantis & nonnihil humectantis facultatis, temperamento Lactucæ hand dissimilis.

Radix tenuissima fibrosa Valerianam redolet.

Verbascum fruticans.

Φλόμος λευκόφυλλος Diosc. Σπ. τῶν φλογῶν, quod eâ ad ellychnia veteres utebantur.

Verbascum latius Dodon.

Thapsus barbatus Officin.

Verbascum aut Phlomos vulg. mas Diosc. Lob.

Verbascum leucophyllum.

Candela regia.

Weis Wullfraut.

Königsferge / S. Johannisferge.

Föllich / Wüllich sil.

Incultis & sterilibus collibus secus itinera & sepes à Iulio in Autumnum floret.

Folia siccant, detergent, digerunt, & dolores mitigant.

Omnibus internis apostematibus, doloribus & inflammationibus auxiliantur. Laterum & Pectoris dolores tollunt, Ambustis subueniunt illita. Sedem procidentem suffitu cohibent & Tenesmum

nesmum in dysentericis fa-
nant.

Flores cum Ovi vitello tu-
mentes & dolorificas Hæ-
morrhoides cohibent: idem
efficit oleum insolatu colle-
ctum & illitum. Capillis et-
iam flauedinem conciliat.

Herba infessu Sedis in-
flammationibus & Genitali-
um ac Podagræ; fotu Oculis
utilissima.

*Verbascum magnum 2 flore
subpallido Lob.*

Verbascum flore luteo
magno.

Verbascum 2. minus.

Ander Wullkraut mit
bleichgeelen blumen.

Iisdem fruitur natalibus.

Verbascum nigrum.

Φλβρος μελανόφυλλος.

Verbascum nigrum lati-
folium luteum Aduers.

Verbascum nigrum Trag.

Schwartz Wullkraut.

Schwartz Wullich Sil.

Hoc nihil vulgatius fabu-
losis & aridis collibus & ag-
geribus secus itinera.

Aestate floret.

Verbenammas communis.

Πεισιερβων seu πεισιερβων, q.
Columbaris, quod iuxta Co-

lumbaria in sterquilinijs lu-
bens proueniat.

Verbena communis Lob.

Verbenaca recta Tab.

Verbena femina Casalp.

Eisenkraut.

Eisenhart.

Wilder Eiserwig. Sil.

Pagorum viarumq; mar-
gines & areas vrbium occu-
pat. Iulio & Augusto floret.

Herba viridis jucundi est
odoris, gustus insigniter a-
mari.

Calefacit, siccatur, abstergit,
adstringit, consolidat. Omni-
bus visceribus, Pulmoni,
Lieni, Lateri & Phthisi inci-
pienti prodest, visum acuit,
capitis doloribus pituitosis
& chronicis summo est præ-
sidio.

Manfa Dentibus herba
rec. contra Pestem singulare
prædicatur Alexipharma-
cum.

Plebecula superstitione
plena, nescio ad quas expia-
tiones delira quadam per-
suasione adhibere solet.

Veronica mas serpens.

Veronica vulgaris supina
Clus. P.

Veronica vera & maior
Lobel.

Laudata Nobilium.

Æhren

Ehrenpreis Mennlin.
Grundheil.

Heil allen schaden.

Herba incultis & cæduis
fyluis sed æditis repertu faci-
lis.

Amara est cum manifesta
adstrictione. Calidæ & siccæ
facultatis.

In Hepatis, Pectoris & Li-
enis affectibus multi vsus.

Tabidis, suppuratis & I-
cteris succurrit, febribusq;
malignis conuenit.

Colicæ à proprietate, &
omnibus Cutis vitijs saluta-
ris.

Veronica femina

Mattiol.

Ἐλάτιν Diosc. *Aduers.*

Elatine *Dodon.*

Elatine vulgaris *Herb.*

Thal.

Ehrenpreis Weiblin.

Inter segetes riguis & hu-
midis.

Amaricant folia adstrin-
guntq; siccitate non exaspe-
rante.

Meritò Dysentericis tu-
moribusq; feruidis prodest.

Vicia maior.

Vicia Herbar.

Orobis perperam *Nonn.*

βίαν.

Grosse Wicken / Feld Wis-
cken.

Kornwicken / Roswicken
Sil.

Seritur in campis ad ju-
mentorum pabulum; in qui-
bus etiam spontè nascitur.

Semen moderati est calo-
ris, sed valentius desiccatur, ad-
stringit, mundat, abstergit.

Stomachi & alui fluxiones
tostum, fractum & decoctum
Lentis instar sistit.

Vicia sylvestris I.

Ἀφάρα, ἀγαχός.

Craccæ 1. genus *Dod.*

Aphaca *Mattiol.*

Aracus & Cracca maior

Lob.

Kleine Wilde Wicken.

Vogelwicken *Sil.*

Prouenit vnà cum segeti-
bus, pabulum cum recens
tum siccum bobus gratum.

Semen amarum, tenuis es-
sentia, Columbarum cibus.

Vicia sylvestris II.

Craccæ 2. genus *Dod.*

Aracus seu Cracca mini-
ma *Lobel.*

Viciola, Arachus minimus.

Kleine Wilde Wicken.

In hortis Oleraceis & in-
ter segetes luxuriat, frugum
pestis & vitium.

E c

Vicia

Vicia sylu. III.

Vicia lutea Tabern.

Gelbe Wicken.

Legumen Terræ glandibus simile.

Iulio & Augusto floret in campestribus frutetosis locis. Semen ingrati saporis.

Vicia sylu. IV.

Vicia sylu. cœruleo flore.

Vicia syl. spicato flore Cl. P.

Galega sylvestris Dod.

Os Mundi.

Blawe Wicken.

Schwarze Linsen.

Christoffelskraut.

Passim in agris & dumetis, quibus se implicat, ad sepes secus itinera Aestate visitur.

Viola Martia odorata.

Ἰὼν πορφυρῆν Diosc.

Ἰὼν μέλαν καὶ κενδρίων Theophr.

Viola Martia præcox purpurea simplex Lob.

Viola nigra, à violando, quòd violetur & conculcetur & proteratur transeuntium pedibus.

Blawe Violen/Veilichen.

Wertzen Violen.

Amat opaca & aspera. Ad Murorum radices, hortorum margines & sepes pingui solo.

Viuit hyeme pariter ac æstate, frigoris patientissima. Floret Martio & Aprili.

Refrigerant 1°. humectant 2°. si recentes.

Aluum emolliunt.

Soporifera sunt. Calidos dolores mulcent & inflammationes extinguunt, leniunt & solvunt. Bilem educunt eiusq; feruorem temperant. Conferunt capitis doloribus, Pectoris & Lateris inflammationibus auxilio sunt, sitimq; arcent.

Medentur Anginæ & Columellæ vitijs.

Iecinoris, Renum, Vesicæ nimios calores restinguunt.

Siccantur in umbra ad Cordiales condituras, syrupos & cathartica.

Folia in Clysteribus & Infusib. commodè adduntur.

Viola Martia syl. inodora.

Viola canina.

Viola cœrulea syl. ferotina Lob.

Bunde Veilichen.

Passim in syluis & frutetis, neglectivus.

Viola Martia fruticosa.

Viola Martia surrectis cauliculis Lob.

Aufstehende Veilichen.

In syl-

In syluis fruticat.

*Viola Martia alpina
lutea.*

*Viola alpina rotundifolia
lutea C. B.*

*Viola luteola & minore
flore Gesn.*

Geele Diolen.

Geele Nertzeilichen.

Humidis & opacis herbi-
disq; montibus Iunij initio
cum floribus reperitur.

*Viola matronalis multi-
color.*

φάλαξ φάλαξ Theoph. Dod.

Viola tricolor.

*Iacea seu herba Trinitatis
Stieffmütterlein Sil.*

Frauenveil.

Freisamfraut.

In campis asperisq; Colli-
culis frequens. Floret Iunio,
Iulio, Aug. ad finem Aestatis.

Tota subamara est & acris.
Calefac. siccatur, digerit, inci-
dit.

Aegrè spirantibus & Pul-
monum Inflammationibus
opem fert; Febricitantibus
maximè Pueris & Infantib.
quorum Convulsionibus ac
Comitialis morbi accessio-
nibus subuenire creditur.

Scabiem & cetera cutis
vitia delet.

Viola matronalis pallida.

*Viola tricolor f. Septico-
lor Thal.*

*Iacea seu Herba Trinita-
tis 2. seu minor Matt.*

Wilde Stieffmütterlein.

Flosculi pallidi sunt.

Ad Clysteres colligitur.

*Viola matronalis albo
flore.*

*Viola Trinitatis minor
petraea.*

Viola sylv. Lobel.

Weisse Stieffmütterlein.

Virga aurea I.

*Virga aurea ferratis folijs
Tabern.*

*Virga aurea margine cre-
nato Dodon.*

S. Petersstab Sil.

Heidnisch Wundkraut.

Nemorosis & saltuosiss o-
paci lato pinguiq; loco e-
nascitur. Augusto virga lu-
cet aurea.

Subamara est. Calefacien-
di vi pollet. Abstergit, gluti-
nat, adstringit.

Renes à sabulo & arenulis
liberat, sanguinem cohibet.

Gargarizatu Anginae &
Columellae inflammatae, fau-
ciumque Morbis auxilium
fert.

Ec 2

Addi-

Additur potionibus vulnerarijs.

Virga aurea I I.

Virga aurea folijs non serratis Villanouani *Aduers.*

Herba scripta *Anguill.*

Gulden Wundkraut.

Folia interdum lineis & maculis albis insignita videntur.

Viscum.

Οΐζις.

Mistel/ Mispel.

Eichen Mistel / Tannen Mistel.

Nascitur in Abiete & Quercu quamuis rarius. Abundat in syluis Boemiar.

Abietinum hyeme viret. Laudatissimum est Quernū.

Calefacit, emollit, digerit, extrahit, discutit, parotidas, tubercula cæterasque collectiones ad maturitatem perducit.

Lignum eligitur intus porraceum, extra fuluum, quod asperi nihil aut furfuriosi conceperit.

Amuletū insigne aduersus Caducum morbum. Tritum etiam Epilepticis auxiliatur & contra sanguinis eruptiones valet.

Vitis sylvestris.

Ἀμπέλως ἀγρία, Diosc.

Labrusca, Trag.

Wilde Weinrâben.

Wilder Weinstock.

In Silesia inferiore ad Croznam.

Racemi adstringunt & extergunt.

Oenanthe, id est, flos vitis sylvestris potu aluum sistit ac sanguinis excretiones, Stomacho ac urinæ ciendæ utilis.

Vlmus campestris.

Πτελέα, Diosc.

Vlmus Herbarior.

Ylmenbaum.

Küstern/ Küstbaum.

Amat plana & campestria.

Liquor folliculorum vulnerarius est. Valet ad Lichenas, & nitorem faciei conciliat.

Vlmus montana.

Ὁρειπτελέα, Theophr.

Montiulmus, Gaz.

Vlmus vernacula seu nostras.

Ylmen.

Effenbaum.

Berg Küstern.

Locis montosis ad arcem Fürstenstein & alibi.

Folia

Folia & cortex adstringunt, inspissant, abstergant, resoluunt, emolliunt & glutinant.

Umbilicus Veneris palustris.

Cotyledon palustris Dod.

Cotyledon aquatica acris septentrionalium Lob.

Uabelkraut.

Paludibus & piscinis innatat.

Vrtica maior pungens.

Κνίδν, πικρὰ τὸ κνίζειν, à pruriendo.

Ἀρχαλόφν, Diosc.

Vrtica syl. asperior, Label.

Vrtica vrens 2. Dodon.

Grosse Nesseln.

Importuno prouentu ubiuis iuxta sepēs luxuriat.

Radix ex vino Tussienti-

bus, Asthmaticis, Pleureticis, calculosis morbisque ex viscosa pituita ortum habentibus prodest.

Folia ventrem molliunt, flatu discutiunt, Calculum & arenulas deijciunt.

Semen lithontribon est, sanguinem cohibet; in Officinis vrticæ Romanæ semini substituitur.

Vrtica pungens minor.

Vrtica minor acrior, Lob.

Heiter Nessel.

Brennende Nessel.

Haber Nessel.

Vulgatissima in hortis & fatis.

Priori facultate similis.

Radix cocta vino & melle egregiè contra frigidas tussēs & pectoris vitia facit.

FINIS PRIMI LIBRI.



Ec 3

STIR-

STIRPIVM SI- LESIAE HORTENSIVM

Liber secundus,

*In quo Arbores, Frutices, Herba cum Re-
gionis propria, tum aliunde al-
lata recensentur.*

Abrotonum mas.

Aβρότον αἴρεν,
Diosc.

Stabwurtz mennlin.

Gartheil/rechter Gartheil/
sil.

Rote AlbKaute.

Amat solum aridum, hor-
tis Rusticorum familiare: flo-
ret Augusto & Septembri.

Admodum amarum est.
Calefacit, siccatur, 3°. recessu
à medio. Aperit, digerit, in-
cidit, rarefacit, mordicat.
Tenuium est partium.

Summitates cum flosculis,
Asthmaticis, ægrè spiranti-
bus, convulsis, Ischiadicis
conducunt. Lentos humo-
res Pulmonis, Renum, Ma-

tricis & vesicæ incidunt, stil-
licidio urinæ succurrunt, &
quosvis dolores internos fe-
dant.

Exitium venenorum an-
tidotum.

Cinis Alopeciam curat.

Olim contra omnia vene-
ficia, quibus Coitus inhibe-
batur, efficacissimum habe-
batur.

Abrotonum femina.

Αβρότον θῆλυ, Diosc.

Cyparissus hortulana.

Chamæcyparissus, Fuchs.

Chamæpitys, Tragi.

Santolina, Anguil.

Cypressus sil.

Garten Cypress.

Stabwurtz weiblin.

In hortis & siccilibus co-
litur

litur ad coronarum vsum.
Impatiens frigoris. Augu-
sto floret.

Amarum est, aperit, ab-
stergit, venenis aduersatur.
Regio morbo, vrinæ diffi-
cultati medetur.

Semen potum Lumbricos
enecat & Menstrua pellit.

Abutilon auicenna.

Althæa lutea.
an Ibisus, Theoph?
Samet Pappeln.

Welsche geele Pappeln.

Non nisi in hortis instru-
tioribus sub finem æstatis
floret.

Glutinosa & vulneraria
est. Recentia consolidat &
glutinat.

Semen calculosis ex vino
competit.

Acanthus sativa.

Acanthus Italica.

Acanthus sativus, Lobel.

Acanthus vera, Fuch.

Acanthus lævis, Plin.

Branca vrsina vera Ro-
mana.

Ἀκανθός, Diosc.

Μελάνθιον, Gal.

Welsche Beerenflaw.

In horto Laurentij Scholt-
zij Med. Vratiss.

Folia temperatè in frigidi

& calidi medio quasi confi-
stunt nonnihil humida, e-
mollientem ac modicè di-
gerentem vim obtinent, do-
loremque sedant; vnde Ene-
matis incoquuntur non mi-
nus quàm Malua.

Acetosa Sabaudica.

Acetosa nobilis Franca.

Oxalis gallica, Romana.

Oxalis rotundioribus fo-
lijs, Gesn.

Saphoischer Sauerampfer.

Agrestampfer.

Frembd Sauerampfer.

Ex semine in horto in-
structiss. D. Laur. Scholtzij
Vratiss. Spontè copiose in
asperis montis Iurassi infra
Geneuam nascitur.

Gustu & aciditate delica-
tiore cæteris cunctis præ-
fertur.

Achillea.

Ἀχιλλεύς, Diosc.

Millefolium nobile, Trag.

Tanacetum Millefolij fo-
lijs, Lobel.

Edle zarte Garbe.

Abstergit, mundat. Vul-
neraria est.

*Aconitum Pardali-
anches.*

Ἀκόνιτιον.

Aconi-

Aconitum i. Diosc. *Gesf.*
Aconitum thelyphonon,
Theoph.

Phthora VValdensium
Aduersf.

Lunaria, *Nonn.*

Waldenser Gifftraut.

Waldenser Tora.

In horto meo Maio flo-
ruit, Vienna missa. In Iurassi
præcipitijs vbertim spontè
luxuriat.

Lethale & præsentaneum
venenum omnibus anima-
libus.

Acorus verus.

**Acoros* Diosc. & *Theoph.*

Acorus verus & legitimus
Diosc. *Aduersf.*

Acorum.

Calamus aromaticus, *Offi-
cin. falsò.*

Ackerwurtz.

Balmes/ vulgò.

Admodù familiaris hor-
tis præsertim humidioribus
& riguis, vt etiam ad exte-
ros deuehatur. Patria eius
Podoliæ, VValachiæ & Lit-
uanix fines. Loco floris iu-
lum fert.

Amara est radix modicè,
acris, odoris iucundi & te-
nuis essentia. Incidit, ape-
rit, prouocat vrinam, Men-
ses & Secundas trahit, Late-

ris dolores tollit, Iecinorosos
& Lienosos iuuat, Pectori
prodest, vrinæ stillicidijs & à
Serpente demorsis mirificè au-
xiliatur. Antidotis additur.

Peregrinantes quidam se-
cum ferunt contra aquas
corruptas.

Succus Oculorum caligi-
nes discutit, Ceratoidis traf-
fitem detergit & simul ex-
tenuat.

Extractum valet præcipuè
in affectibus Ventriculi &
Pectoris cum intemperie fri-
gida cum materia crassa &
tenaci. Expectorat, difficul-
tatem spirandi mitigat &
concoctionem iuuat. In Ca-
tarrhis item frigidis, Colica
& Quartana cum appropri-
atis syrupis commendatur.

In officinis loco Calami
aromatici vsurpatur, cum ta-
men legitimus & verus suf-
ficienter iam ad nos feratur,
qui non radix sed Arun-
do est.

Æthiopsis.

**Æthiopsis* Diosc.

Phlomitis *Lob.*

Cotonaria *Monspel.*

Mohrenkraut.

Grembder *Wullich.*

Instructoribus hortis ex
semine nata. Auxiliatur pu-

Ff

rulen-

rulentis excreationibus decocta & pota.

Ageratum latifolium.

Balsamita maior Dod.

Mentha græca seu Saracenica Offic. Matt.

Chrysocome Cord.

Costus Hortorum Cass.

Bals. Aduers.

Mentha corymbifera maior.

Unser FrauenMintz Matt.

Römische Salbey sil.

Sam Heydnisch Wund=

fraut.

Hortis nota herba. Subamara est, adstringens & grauiter odorata.

Excalefacit, siccit, aperit, roborat, abstergit, prouocat, discutit, Stomacho & Cordi amica.

Auxiliatur vterinis affectibus frigidis.

Frige factum Ventriculum & Hepar excalefacit & viscerum obstructions aperit.

Prodest Cachexiâ & Leucophlegmatiâ laborantibus, præsertim in initio. Venenis resistit, Alui profluvia cohibet, Defluxiones e Capite reprimat, & resiccant. Caput roborat.

Succus Lentigines, Alphos & alias Cutis foeditates e-

maculat: illitus Lumbricos necat, Ventriculum roborat tam haustus quam illitus, & vomitiones cohibet.

Semen Lumbricos enecat, expellit.

Ageratum angustifolium.

*Aγέριον Gal. & Diosc. *μαγά το υν γράσκων*, quod flores diu seruet incolumes.

Balsamita minor Dod.

Eupatorium Mel. Trag.

Costus minor hortensis

Gesü.

Herba Iulia seu Balsamita Costina minor Herbar.

Ageratum Septentrionalium & Anglicum.

Mentha Corymbifera minor.

Leber Balsam.

Frembd Leberfraut.

KleinWelsch Frauenfraut.

Semel satum facile augeatur. Augusto floret, semen Octobri relinquit minutum, latiusculum Lactucæ candidum.

Odoratius est maiori, subamarum adiuncta adstrictione. Calefacit, siccit, attenuat, abstergit, aperit, resoluit, bilem euacuat.

Roborat Ventriculū, Hepar, etiam viscera interna, ob ter-

ob terrenam adstringendi-
que vim.

Syrupo de Eupatorio Mes-
commodè additur.

Allium sativum.

Σκόρδος Diosc.

Alliū hortense ὄν τὸ ἀλλανθόν,
quòd exiliendo crescat.

Knoblauch.

Rusticorum hortis nullibi
deest.

Vim obtinet calefaciendi
& siccandi quarto à medio
recessu. Acre est, mordet,
excernit, digerit, pellit, in-
cidit, prouocat.

Aluum turbat, flatus dis-
cutit, Coli dolores minuit,
sitim temperat, Oculorum
aciem hebetat, venenis resi-
stir, Pectus excalefacit. Sto-
machum exiccat.

Laras Ventris tineas in
Cibo sumtum abigit; Aquas
insalubres emendat, vocem
reddit claram, veterem tuf-
sim lenit.

Hydropicis, maximè Tym-
panitide laborantibus utile.

Præstat contra rabioso-
rum Canum morsus, tam il-
litum quàm potum.

Allium hybernum.

WinterKnoblauch.

Aëris corrupti arcet con-

tagia. Amuleto veneficia in-
hibere vulgi persuasio.

Quibus Alliorum vsu Ca-
put non tentatur, nec astu
viscera incandescunt, vt Ru-
sticis & assuetis, his ea manè
cum vinogenerosoingere,
quolibet Antidoto ad-
uersum pestiferas nebulas
nocturnasque caligines cer-
tius est præsidium & incan-
tamentum.

Allium Serpentinum.

Scorodoprasen 2. Clus. P.

Moly Serpentinum Anglor.

Allium Colubrinum.

Allium Creticum.

Ὀφιοσκόρδος.

Schlangen Knoblauch.

Welscher Knoblauch.

Venenis resistit.

Aloë vulgaris.

Ἀλόη Diosc.

Sempervivum marinum.

Aloe/ Aloeparick.

In horto D. Laurentij

Scholtzij.

Aloë spinosa.

Aloe folio mucronato.

Aloe Americana Mattiol.

Amerikanischer Aloe.

Stachlicht Aloe.

Ex America ad nos affer-

tur.

Ff 2

Luto

Luto radici circumligato & subinde rigato, è tabulatis Cœnaculorum suspensa, non modò diutiùs viret, verùm & incrementum sumit, nouaq; folia protrudit: sed tepentem hyeme locum esse oportet, ne congelata tabescat.

Succus foliorum nondum æstiuis Solibus percoctus, vt brumali tempore minimum amarus est.

Alfne peregrina.

Alfne marina Dod.

Hippia maior Lob.

Frembder Meyer.

Frembd Vogelkraut.

Ex maritimis locis in hortos recipitur.

Amaranthus vulgarior.

Αμάραντος, ὁ τὸ τὸ μὴ μακάριος.

Amaranthus purpureus Dodon.

Amaranthus purpureus saturo Cocci colore.

Phlox seu flamma Theoph. Angul.

Flor Amor.

Blum der Liebe.

Tausentschön.

Rot Kölblin.

Differt panniculâ, quæ simplex, sparsa, incurua. Flo-

ret Augusto & Septembri.

Elegantia causa & voluptatis Corollaria ergò in hortis feritur.

Flores poti cruenta expuentibus profunt.

Mensium abundantiam & albas vteri fluxiones reprimunt.

Flos madefactus aquâ hyeme reuiuiscit ad Coronas.

Amaranthus maximus.

Amaranthus maior floribus obsoleti coloris Dod.

Blitum Vngaricum Matt.

Blitum topiarium seu Indicum Gesn.

Grosser Straus Meyer.

Sanenfam / Ungrischer Meyer.

Floret Augusto & durat in Autumnum. Refrigerat, siccatur, repellit, cohibet.

Iis, quibus in Pulmone vel Pectore vas aliquod fractum fuit, prodest.

Amaranthus tricolor.

Amaranthus pictus Aduers.

Blitum maculosum Dodon.

Blitum variabile Ital.

Symphonia Plin. Dalech.

Geserbter / gescheckter Meyer.

Papageykraut / Widerschein.

Seritur

Seritur in hortis & ficili-
bus spectaculi caussa.

Ammi.

Αμμι Diosc.

Ammi perpusillum Lob.

Ammi Alexandrinum.

Aethiopicum Cuminum.

Alexandrinischer Ammey.

Ex semine nascitur. Solum
requirit bene stercoreatum,
Soli expositum.

Semen gustu amarum est,
subacre & tenuium partium.

Ammi vulgatus.

Βελαντιον Hipp. Tabern.

Ammi Cord. & Fuchs.

Ammi vulgare Dod.

Amnioselinum Tabern.

Gemein Ammi.

Ammei Peterlin.

Humidiora amat loca.

Amarum est semen, & gu-
stu feruet.

Mouet vrinas; Renes, Ve-
ficam & Vreteres expurgat.

Amygdalus arbor.

Αμυγδαλος το δένδρον Diosc.

Mandelbaum.

Floret primo vere in viri-
darijs, fructus Autumno ma-
turefcit.

Amygdala dulcia mode-
rate sunt calida, leuiculam
tamen amaritudinem ha-

bent, sed à dulcedine occul-
tatam, quæ tamen temporis
spacio fit manifesta. Corpus
saginant, Pectus expurgant,
tabidis conferunt, & Som-
num placidum conciliant.

Amara incidunt, tenuant,
tergent, digerunt sine mor-
su. Ob id ex Pulmone excre-
ationem crassorum & lentor-
um humorum promouent:
obstructum Hepar, Lienem,
Renes, Colum à crassis &
lentis humoribus expedi-
unt.

Anagyris.

Ανάγρις ἐρέτα.

Anagyris minus foetens
Lobel.

Laburnum 2. Lugdun.

Faba inuersa Cord.

Baumbonen.

In horto Laur. Scholtzj.

Flores Maio lutei depen-
dent racematim Spartij, Ge-
nistæ aut Cytisi.

Semen vomitorium est.

Anemone maior alba.

Ανεμών.

Ανεμώνια Theoph.

Anemone Pannonica Dod.

Anemone 3. Mattiol. albo
flore Lob.

Weisse WindRöslein.

Weiss AnemoneRöslein.

Ff 3

Maij

Maij initio flores apparent. Acris est & feruidi saporis.

Anemone Ropertiana.

Anemone tuberosa Geranifolia cœrulea Lob.

Anemone tenuifolia 3.

Cl. H.

Klein blaulechte Windröslein.

Variat flore nunc albo, modò cœruleo, Aprili.

Anemone violacea.

Anemone tenuifolia 2.

Cl. H.

Violbraun Anemonröslein.

In hortis elegantiae causa habetur.

Anethum.

Άνθον Diosc.

Ανέθου.

Anethum.

Till/ Dillkraut.

Ad ciborum obsonia & in medicum quoq; vsum feritur: flores & semen æstate perficit.

Grauitè spirat. Vim habet calefaciendi, aperiendi, concoquendi, digerendi, subtiliandi, discutiendi, cum partium tenuitate.

Dolorem sedat, somnum conciliat, crudos & incoctos

humores concoquit: Lac euocat, Inflationes & tormina sedat: Aluum, Vomitiones sistit, vrinas ciet, singultum lenit: sed Oculorum aciem hebetat & genituram restinguit assidue potum.

Teneræ comæ in iusculis & oleribus frequenter escitantur à Calculosis.

Vulgus vaccarum pabulo commiscet, ad augendam Lactis copiam.

Angelica hortensis.

Σιδήριον, ὁ τῆς σμύρνης, ἢ Myrrha Smyrnum Cord.

Angelica maior Matt. & Dod.

Angelica Misnensis, Brigoia Offic.

Geistwurtzel.

Sam Angelick.

Silphij & Lascerpitij species. In hortis semel plantata quotannis ex semine deciduo facile se propagat.

Cultu est acris & amarifuscula, suauiter odorata. Calefac. sicc. 3. Aperit, attenuat, discutit.

Pituitosos lentosq; humores digerit, crassam tenacem q; pituitam expectorat, ideo frigida Tuss auxiliatur: Virginum remorantes Menses euocat, secundas expellit,

lit, rigores febrium ex vino soluit.

Aduersus venena mirè pollet, febres quas pestilentiales vocant, curat, & mansa à peste præseruat, halitumq; Oris grauem emendat.

Extractum Angelicæ multò efficacius & in minima dosi omnia perficit.

Rotulæ ex hoc, saccharo addito, parantur suauissimæ, & contra aëris infectiones utilissimæ.

Anisum.

Ἀνισόν, Ἀνισόν Diosc. ὅτι ἀνίσταται ἐκ τῆς χειμῶνος.

Anisum.

Anicetum.

Cuminum dulce.

Anis / süßer Kummel.

In hortis feritur, sed difficiliter semen perficit, Iulio & Augusto floret.

Semen saporis est mixti, ex dulci, acri & amariuscule constans. Calefac. 2. siccatur 1. Aperit, digerit, discutit, urinam ciet. Valet ad inflationes & torsiones Ventris, Aluum & alba feminarum profluua sistit. Lac ad Mammæ elicit, Venerem stimulat, dolores Capitis leuat, halitum Oris iucundiores reddit, Hydropicis sitim extinguit

potum. Venenis aduersatur animalium.

Oleum ad eosdem vsus elicitur, guttula vna atq; altera in appropriato liquore vel syrupo hausta.

Anthora.

Ἀνθόρα.

Zedoaria, Zedoaria.

Antithora Mattiol.

Zedoaria vera Arabum Tabern.

Napellus Moysis Auic.

Giffheil / Heilgiff.

Flores Iulio prodeunt flauis, semen in theculis nigrum relinquentes.

Vehementer amara est radix. Venenis resistit. Calefacit, siccatur, abstergit, subtiliat, soluit. Magnæ contra Pestem efficaciam.

Antirrhinum maius.

Ἀντίρρινος Diosc.

Ἀντίρρινος.

Buxperier Gal.

Leontotomos.

Caput Vituli.

Lewentleuler.

Balbs Nase.

Welscher Orant.

Hundskopff.

Flore variat, incarnato, candido, luteo, Aestate conspicuo.

Sub-

Subamara sunt folia, similis cum Bubonio facultatis, sed minoris efficaciar.

Aduersus veneficia & philtrea, maximè morbum Caducum portatur, anili persuasione.

Apium verum.

Σέλιον κηπόδιον, Diosc.

Apium hortense, Trag. Dod. Lobel.

Petroselinum, Officin.

Garten Eppich.

Peterlin/ Petersilge/ Sil.

Herba hortis oleraceis notissima ob vsum in condimentis Ciborum & acetarijs gratissimum. Loca amat humentia.

Apium ori & Stomacho gratum, calidum & siccum. Aperit, prouocat, vrinam & Menses ciet, flatu discutit, Calculos coherentes soluit, Iecur & Lienem obstructione liberat. Hydropicis & Ictericis conducit, secundas & partus extrahit. Auxiliatur contra Serpentium venena.

Admiscetur semen theriacis & tussis remedijs.

Apium crispum.

Σέλιον πολύφυλλον.

Apium 2. Tabern.

Petroselinum crispum.

Transfer Peterlin.

Gesülte Petersilge.

Rarius scribitur: at eiusdem facultatis.

Apium Macedonicum.

Πετρώδιον, Gal.

Petroselinum Macedonicum, Mattioli.

Macedonischer Peterlin.

Stein Peterlin.

Frigoris impatiens ex semine hortis Medicorum familiare.

Semen Theriacæ & antidotis vrinam cientibus miscetur.

Apium Alexandrinum.

Σμύρνιον, Gal.

Ἰπποσέλιον, Diosc.

Apium Macedonicum Officin. vulg.

Hippofelinum, Cord. Dod. Lobel.

Smyrnum, Mattioli.

Alexandrinischer Peterlin.

Rosß Eppich.

Spanischer Eppich.

Solum amat pingue, humidum.

Semen calidæ & siccæ naturæ, Lienis, Renum, Vesicæ & vteri vitij prodest. Inflationes Stomachi lenit, sudores ciet & ructus.

Adium

Apium palustre.

Ἰσποσέλιον.

Ἐλαϊοσέλιον. Diosc. & Gal.

Apium rusticum.

Paludapium, Mattiol. Lobel.

Tabern.

Apium Offic. vulg.

Eppe / Epre / Sil.

Eppich / Wasser Eppich.

Humidis & vmbrosis hor-
torum angulis luxuriat.Ingrati est tum odoris tum
saporis, acutioris & grauio-
ris, quo caput ferit; vnde a
cibis abdicatur.Temperamenti est calidi
& sicci. Reliquæ vires cum
Apio domestico.Succus attenuat, aperit,
crassa extenuat, obstructio-
nes amolitur & vrinas mo-
uet: Tertianis ex frigida
caussa, ac Regio morbo suc-
currit. Oris Tonsillarumq;
malignis vlcerib. cum Hor-
dei decocto, addito Melle
Rosato, prodest.Aquæ destillatæ peculia-
ris vis contra Hydropem a
vulgo ascribitur.*Aquifolium Plinij.*

Agrifolium.

Paliurus 2. Lacum.

Cratega, Gauland.

Ruscus sylu.

Stech Palmen.

Wald Distel.

In viridario D. Laurent.
Scholtzj.*Aquilegia hortenſis.*

Agley.

Glocken blumen.

Varias hæc in flore tam
ratione magnitudinis, quàm
coloris obtinet differentias.*Aquilegia alba simplex.*Aquilegia simplex candi-
do flore.

Aquilina alba.

Weisse einfache Agleien.

Aquilegia rubescens.

Aquilina rubra.

Rote Agleien.

Aquilegia purpurea.

Purpurbraun Agley.

Aquilegia incarnata.

Leibfarbene Agley.

*Aquilegia multiplex
cærulea.*

Aquilina pleno flore.

Blawe volle Agley.

Semen Epilepticis com-
mendatur.*Aquilegia candida multi-
plex strijs cæruleis.*Weisse volle Agley mit
blawen streiffen.

Gg

Aqui-

*Aquilegia multiplex
variegata.*

Aquilegia multiplici va-
rij coloris flore.

Agley mit vollen geschec-
ten blumen.

*Aquilegia degener vi-
ridi flore.*

Agley mit grünen blumen.

Aquilegia inuersa.

Aquilegia flore inuerso
Mattiol.

Aquilegia hortensis mul-
tiplex inuersis floribus Casp.
Bauh.

Agley mit umbgefereten
blumen.

Hanc ostendit mihi Geor-
gius Rösler^o patricius Gör-
licensis & Rei herbariae stu-
diosissimus.

Arantia malus.

Μυλέα νεραντζι.

Arbor Arantia.

Malus Aurantia, Dod.

Pomeranzenbaum.

Fronde viret perpetua,
hyeme subterraneis locis as-
servatur; cum hyemem non
ferat.

Arantia mala.

Mala Aurengia, Nerangia.
Pomeranzen.

Refrigerant, sitim febricitantibus sedant, praesertim acida, vomitum compescunt, ventriculum roborant.

Cortex amarus est. Cal. & sicc. Aperit, abstergit, ventriculum confortat, Ictericæ medetur, Menstrua prouocat, flatus expellit.

Semen venenis potenter resistit, Lumbricos necat & expellit.

Arbor Indæ.

Κεραία, an κεραία, Theoph.

Ceratia siliqua.

Siliqua fatua.

Fabago.

Judas baum.

Wild S. Johannisbrod.

In viridarijs rariss. frigoris impatiens.

Arbor vitæ.

Οία, Theoph.

Κέδρος λυκία.

Cedrus Lycia, Aduers.

Cedrus Americana.

Baum des Lebens.

Americanischer Cederbaum.

In horto Laur. Scholtzj.

Ramuli in terram depacti
facile radices concipiunt,
hyemis & frigoris est patiens.

Ex Canadas Americae septentrionalis Insulis primū
ad nos allata.

Sapor

Sapor ei subamarus odoris fragrantissimi. Huius ligno, Xyloaloe hodie à plerisq; adulteratur.

Aristolochia rotunda vera.

Ἀριστολόχια στρογγύλη, Diosc.

Aristolochia rotunda, Offic.

Aristolochia femina.

Ronde Osterlucey.

Ex Italia instructioribus Medicorum hortis nota.

Radix amara est & subacris. Abstergit, digerit.

Venenis resistit, Ruptis, conuulsis, laterum doloribus, singultibus, suspirijs porta auxiliatur. Vlcera fordidà expurgat.

Aristolochia longa vera.

Ἀριστολόχια μακρά, Diosc.

δακτυλίτις.

Aristolochia mascula.

Lange Welsche Osterlucey.

Gustu est amaro & graui, Calefac. & siccac 3. gradu.

Ad remorantes à partu secundas, Mensesq; ciendos magni vsus.

Aristolochia longa vulgaris.

Ἀριστολόχια κληματίτις.

Aristolochia Saracénica, Dodon.

Aristolochia clematidis nostràs, Lobel.

Gemein Osterlucey.

Lange Holwurtz.

Bruchwurtz.

Biberfraut.

Facile in hortis propagatur.

Amara est insigniter. Recens tusa & imposita aculeos, spicula, furculos extrahit. Menstrua retenta mouet.

Artischochus lanis.

Ἀρτίσχοκος, Theoph. Diosc. Lobel.

Κωδέα, Aduers. quòd, dum colitur, cineribus maximè gaudeat.

Cynara, Dodon.

Carduus strobilis.

Alticocalus, Gal.

Alcocalus, Cocalus, Hipp. Nonn.

Arcotum, Officin.

Artischaw.

Artischock.

Strobbildorn.

Seritur ab Olitoribus capitis causà.

Stercoratam & solutam terram requirit.

Capitulum, quod altero à satione demum anno perficit, coctum, cum pipere, oleo seu butyro, sale & aceto præ-

G g 2

to præ-

to præparatur, gulæ & veneris incitamentum.

Radix amara calef. ficut, urinam copiosam, vino pota detrahit, eamq; foetentem.

Caules qui per hyemem eduntur, vocantur Cardi, & profunt Spleneticis.

Artischochus aculeatus.

Σκώληκος ἀκυνθώδης.

Scolymus aculeatus, Tab.

Chamaeleonta Monspel.

Lobel.

Cinara hispida, Colum.

Cinara degenerans, Dod.

Stechender Artischock.

Floret Augusto & Septembri.

Ex obsonio sumtus succum generat Melancholicum, vt & prior.

Radix contusa & illita cum alarum graecolentiam tū totius corporis emendat.

Foliorum costæ mediæ candidæ teneræq; factæ magno apparatu Mensæ cum bellarijs inferuntur.

Arundo sativa.

Δόναξ, Diosc.

Κάλαμος.

Donax sativa seu Cypria,

Lobel.

Arundo domestica, Italica.

Zam Rohr.

Spanisch Kied.

Garten Rohr.

Folia refrigerantis & siccantis sunt facultatis. Cortex excalefac. 3. & plus etiam ficut.

Radix attrahit, extrahit, fistulas vlceraq; inueterata exiccat.

Arundo Indica florida.

Canna Indica, Recent.

Harundo Lilifera.

Indianisch blumenKied.

Indianisch Lilgen Rohr.

In viridario Laur. Scholtzj Vratilauia Autumno floruit. Hyemem agrè fert.

Asclepias nigro flore.

Vincetoxicū flore nigro.

Schwalben wurtz mit schwarzen blumen. Ibidem.

Asparagus hortensis.

Ἀσπάργος ἡμερῆς, Diosc.

Asparagus altilis, Tabern.

Asparagus marinus, Clus.

Sparagus Officin.

Spargen/ Spargeln.

Corallenfrant.

Pasim in hortis humido pingui beneque subactō solo. Iunio & Iulio floret, Maio & Iunio turiones ad acetariorum vsum colliguntur.

Aspara-

Asparagi recentes in cibo sumti Aluum emolliunt, vitia pectoris expurgant, vrinā mouent, Stomacho vtilis.

Radix pota Iecur, Lienem obstructione liberat, Vesicam expurgat, Regiū morbum sanat, Vrinæ stillicidium difficultatemq; ac dysenterias mitigat.

Asphodelus luteus.

Ἀσφάδελος mas Diosc. Fuchs.

Asphodelus femina Matt.

Hastula regia.

Affodillus Officin.

Geel Affodillwurtz.

Goldwurtz.

Geydnische Lilgen.

Radix extergentis & discutientis est facultatis. Iunio floret.

Asphodelus albus.

Ἀσφάδελος Theoph. & Diosc.

Asphodelus mas Mattiol.

Asphodelus maior Clus. H.

Weis Affodillwurtz.

Affodill Lilien.

Radix calefacit, siccatur, vrinā & Menfes ducit.

Asphodelus rubens.

Asphodelus flore suaue rubenti Lob.

Rote Affodill Lilien.

Iunio in horto meo floruit

ex semine prognatus.

Atriplex sativa alba.

Ἀτρίπλεξ Diosc.

Χερσολάχανον.

Atriplex domestica, Matt.

Atriplex hortensis alba.

Türkische Mölten.

Sam weisse Mölten.

Ab Olitoribus seritur ob gustum ceteris suauiore. Iunio & Iulio caules cum flore promit.

Humectat 2. refrigerat 1. gradu cum tepida caliditate. Aquæ est substantiæ & minimè terrenæ. Emollit aluum, abstergit & Iecoris obstructions aperit.

Calidis & macris naturis conducit.

Semen vomitus prouocat.

Atriplex sativa rubra.

Atriplex hortensis Dod.

Atriplex 2. folio & flore purpureo liuens Lob.

Mölsen / Miltien.

Grünfrant vulgò.

Seritur in campis & hortis hyemis initio.

In cibis præstat vere tantum: siquidem velocissimè fenescit & deperditur.

Atriplex Hispanica sinuata.

Gg 3

Σπιν-

Σπαναχία, σπυτομώλαχος Tr.
Σπυτομώλαχος Gefst.

Olus Hispanicum Tr.

Spinacia, Spinachia Dod.

Boulapathra Plin.

Spineth.

Binetsch/ Spanach.

Spanisch Braut.

Vere feritur & æstate, sed citò adolescit & inter duos Menses perficitur.

Sapor qualitatis expers, citò idcirco descendit & aluum emollit.

In cibum deuorata, exasperatas Arterias lenit, & arida tussi confert.

Atriplex Hispanica Beta folio.

Spinachia nobilior seu femina.

Niederlendischer Spineth.

Folia habet non vt prior prorsus acuta, sed parum in rotundum flexa Betae instar, eaq; teneriora & gratiora.

Inter culinaria olera laudatissima habetur palatoq; gratissima sed flatulenta.

Succus epotus calorem restinguit, Stomachi rosiones mitigat. Lac elicit.

Auena candida.

Βένυος Dioscor.

Auena velca Lobel.

Weisser Haber.

Augst Haber.

Sata Vere, sub finem Autumni maturescit.

Temperiem paulò frigidiorẽ Hordeo obtinet, & nonnihil quoq; adstringit, ita vt Alui fluxiones sistat. Desiccatur insuper & calefacit mediocriter & sine morfu.

Ex Ptisana & farina eius Pulticula & Sorbitiones coquantur haud ingratae Ventrículo. Tussientes plurimum iuuant, nec non Pleureticos, Hepaticos & Spleneticos; temperant calorem Viscerum. Stranguriam leniunt & Raucedinem, purulenta excreantibus salubres.

Suauior hæc & vescendo cæteris gratior.

Auena nigra vulgaris.

Auena syluestris nigra Cesalp.

Eichel Haber.

Graver Haber.

Bart Haber.

Gemein Haber.

Frequentius feritur in riguis & montosis, quæ stercoreari commodè nequeunt.

Minus est granum, Equorum pabulum laudatissimum, Ab Agricolis etiam in cibos recipitur.

Auena

Avena nigerrima.

Avena Turcica.
 Schwarzer Haber.
 Granum prorsus nigricat.
 Minus frequens feritur.

Auricula Vrsi purpurea.

Auricula Vrsi flore purpureo Lob.
 Lunaria Arthetica Gesn.
 Rote Schlüsselblumen.
 Bär Sanickel.
 Gustu multum exiccat & adstringit. Vulneraria est.

Auricula Vrsi lutea.

Auricula Vrsi floribus luteis Tab.
 Sanicula alpina lutea.
 Geel Bär Sanickel.
 Schwindelfraut.
 Gele wolriechende Berg-Negelin.
 Ad vulnera vt prior utilis.
 Aliunde allata in hortos recipiuntur.

Balsamina mas.

Balsamina Cucumerina.
 Cucumis puniceus Cord.
 Momordica Bapt. Sard.
 Charantia Dod.
 Balsamfraut.
 Balsamöpfel.
 In hortis pensilibus. A-
 mat loca Soli exposita.

Siccatur & mediocriter refrigerat. Vulneraria est. Ad Coli dolores & Intestinorum tormina, Rupta Conuulsaq; cum vino assumitur foliorum puluis.

Oleum ex fructu immaturo paratur ad vulnera glutinanda doloresque vlcerum prauis humoris mulcendos, arcendasque Vulnerum & Mammillarum inflammaciones. Pervtile Hæmorrhoidibus dolentibus, Ambustis Vesparum & Apum ictus sanat.

Rumicosis pueris efficax remedium, si eo locus sapius perungatur, & Puluis foliorum interea aliquot diebus exhibeatur.

Balsamina femina.

Balsamina 2. Cord.
 Balsamina Amygdaloides Gesn.
 Balsamella.
 Balsamfraut Weiblin.
 In hortis & fistilibus alitur. Autumno fructus maturefcit.

Eisdem cum priori obtinet facultates.

Bellis minor hortensis pleno flore; purpureo, rubro, niueo, variegato.

Primu.

Primula veris hortensis
multiplex.

Volle Maßlieben.

Samerblümlin.

Tausent Schön.

Puellæ ad coronamenta
expetunt.

Maio flosculi elegantes vi-
gent, qui speciosissimi tam
denso foliolorum contextu
luxuriant, vt vix villo aut nul-
lo apparente luteo orbiculo,
vniuersum & ambitum &
medium floris occupent.

Eiusdem cum sylvestri na-
turæ.

Berberis.

Ὀξυδάκτυλα Gal. Cord. q.
ὀξύς ἀργύρεα.

Berberis Offic.

Amerbaris Auc.

Spina acida.

Erbsal.

Sauerdorn.

Berberis.

Versich.

Salsendorn.

Ob fructus in hortos reci-
pitur, ad quorum sepimenta
utilis.

Flores Maio exeunt colo-
ris lutei, Septembri & Octo-
bri fructus maturescunt.

Folia refrigerant, siccant
2. ordine, tenuium partium,
ac incisionis quid obtinent.

Ad Ciborum condituram
veluti Oxalidis vtilia. Cortex
ficus pul. putredinem sanat
oris & Colli.

Radix aculeos, & spicula
extrahit illita.

Baccæ gustu sunt acido &
subaustero. Refrigerant, sic-
cant, cohibent, roborant,
adstringunt: profunt cruen-
tis expuitionibus, firmant
commotos Dentes.

Robè succo inspissatur, ad
sitim restinguendam, bilio-
sas pestilentesq; exhalatio-
nes suppressendas conueni-
entissimum.

Condiuntur Baccæ saccha-
ro, Celiacis, Cibus reijci-
entib⁹, Dysentericis & Cho-
lericis vtilis: Mensium pro-
fluvia cohibent, tineas Ven-
tris necant.

Beta candida.

Τεῦτλον Diosc.

Σικαλικά, Sicula Theoph.

Beta alba.

Cicla Officin.

Weisser Mangolt.

Biessenfraut Sil.

Solum diligit madens ac-
lectum. Septembri semen ad
maturitatem perducit.

Nitrosæ facultatis parti-
ceps sine manifesto calore.

Cocta nitrositatem om-
nem ex-

nem exuit sitq; facultatis leuiter digerentis. Iecoris obstructionibus quàm Malua aptius accommodatur, Lienosos similiter manducata mirificè iuuat.

Folia inueteratis & malis vlceribus ac Inflammationibus vtiliter imponuntur.

Planta recens cum radice & coliculis ex aceto comesta, Cibi appetentiã adfert, sitim compescit, Choleram in Ventriculo reprimat.

Beta nigra.

Τεῦτλον μέλαινον Diosc.

Beta vulgatiore.

Beta nigricans agrestis Tr.

Beta viridis.

Gemeiner Mangolt.

Schwarzer Mangolt.

Bieffen Sil.

Paulò minor, à foliorum colore ex obscuro magis virentium nigra vocatur.

Culinaria est. Aluum minus mouet ob vim subadstringentem.

Eruptionibus Papularum, Igni sacro & ambustis medetur.

Succus recens Naribus attractus, Caput purgat, pituitam clementer extrahendo. Immiscetur Clysteribus ad indurata Alui

excrementa euocanda.

Beta rubra.

Τεῦτλον ἐρέθριον.

Beta rubra Romana, Dod. F.

Rapum rubrum.

Koter Mangolt.

Kote Rüben/ Sil.

Vulgo nota. Radix priusquam caulis exit, in aqua elixatur aut cineribus calentibus coquitur, & exutis apicibus cum aceto, sale & Carui conditur ad vsum pro carnib. assis palato & ori grata.

Eadem derafo cortice Anno glandis modo supposita, aluum ad excrementorum expulsionem inuitat, praesertim exiguò sale aspersa.

Blattaria alba.

Verbascum femina vulgò

Lobel.

Weis Schabenfraut.

Blattaria purpurea.

Blattaria flore purpureo,

Lobel.

Blattaria phoenicea, Tab.

Kot braun Mottenfraut.

Iulio floret. Autumno semen maturefcit.

Blattaria flore magno.

Schabenfraut mit grossen blumen.

H h

Iulio

Iulio flores exerit.

Borrage.

Βύλασσον, Diosc.

Εύφρασιον, Plin.

Buglossum verum Veterum Quibusdam.

Buglossa urbana.

Borragen.

Burretsh.

Bergblümlin.

Bertz freude.

Semel sata quotannis ex semine decidente renascitur.

Flores albos & cœruleos magna Aestatis parte in multum Autumnum vsque fert, Herba ad Aluum emolliendam cum alijs oleribus decoquitur.

Flores sunt Cordiales. In vinum nostra Aetas conijcit & acetarijs aspergit, lætitiæ ac hilaritatis excitandæ causa.

Radix saccharo conseruatur ad Cordis affectus.

Botrys.

Βότρυς, Diosc.

Artemisia Turcica.

Vua herba.

Patientia, Gallia.

Traubenkraut.

Lungenkraut.

Mottenkraut.

Annua est planta tota suc-

co resinoso madens: per maturitatem in viridi luteo languescit. Humecto latur solo.

Pertinacis odoris gratia fragrat, odoremq; haud ita dissimilem Ambrosiæ sed multo vegetiorem vibrat.

Excalefacit, siccatur recessu: penetrat, aperit, incidit, abstergit.

Præstat ad omnes pectoris & Thoracis pituitosos affectus: iuuat suppuratos, Asthmaticos, Suspiriosos, Puerperarum à partu dolores mulcet.

Arida vestimentis interponitur, ut ea à tineis & blattis præseruet.

Tenera folia saccharo conseruantur ad Cordis & Pulmonis affectus.

Botrys II.

Ambrosia.

Chamaepitys 2. Dodon.

Chamaedrys laciniatis folijs.

Feld Cypressen.

Feld Ambrosienkraut.

Iunio floret.

Amara est, odoris non inuicundi, resinosi. Calidæ & siccæ temperaturæ.

Capitis affectibus & vteri utilis. Calculum viasq; vrinarias

arias expurgat: Iecoris & Lienis obstructionibus medetur.

Brassica.

Κεράμην κεφαλάδην.

Brassica vulgatissima Slesiacia albida & subcœrulea.

Brassica capitata albida, Dodon.

Brassica Lacuturres, Plin.

Caulis capitatus.

Caputium, Officin.

Olus, καὶ ἑοχλὺς.

Kraut/ Kauptkraut.

Kauptköl/ Kappes.

Kappeskraut.

Hortis & campis frequentissima.

Martio seritur, Iunio transplantatur, post Solstitium in capita extuberat, quæ arctè occluduntur.

Hæc albida & cœrulea vulgò Weis vnd blau kraut/ habetur. Solum amat mediocre, pingue, probè stercoreatum & benè subactum. Desiccat, non tamen admodum acris: quin etiam emollit, giutinat, abstergit.

Crapulam discutit & inde noxam restinguit.

Crassum & Melancholicū procreat succū nimius esus.

Folia inflammationibus & tumoribus imponuntur.

Capita vel integra vel minutim concisa abundè concluduntur & vasculis concluduntur, atq; ita in quotidianum totius anni vsum adseruantur. Sauerkraut.

Ius eius Ignibus sacris imponitur.

Brassica latifolia

Sabauda.

Brassica alba capite oblongo non penitus clauso.

Brassica Sabauda.

Brassica latifolia.

Sapfischer köhl.

Breibletterter köhl.

Versich/ vulgò.

Hortis instructiorib. familiaris. Seritur & transplantatur vt prior, frigoris impatiens. Delicior est, palato magis arridens.

Brassica vulgaris.

Κεράμην, Diosc.

Κεράμην λεύκα, Plinij.

Gemeiner köhl.

Glatter köhl.

Köhlkraut.

In hortis ab Olitoribus feritur. Solum amat pingue.

Gustu hæc amara aliquantulum ac salsa. Esitata in cibo imbecillo Stomacho conuenit, Concoctionē adiuuat, Aluum durari non patitur,

Hh 2

titur; vrinam prouocat.

Brasica viridis cauliculi depurati si manducantur, aut succus cum Melle decoctus exhibeatur, ad vocem interceptam certissimum auxilium.

Brasica cœrulea.

Brasica Cumana seu rubra, Dodon.

Brasica vulgaris rubra, Marrucina.

Blawfol/ Kotsfol.

Rubro colore ex casto, crebro in hortis occurrit.

Brasica crispa.

Κράμνη ἐλὶ φύλλος, Theoph.

Brasica Apiana, Plin.

Brasica fimbriata.

Krauser fôl.

In iure veteris galli decocta Colicam & Ventris tormina sedat, si iusculum forbeat, qua ratione & calculo Renum, nec non Hepaticis & Spleneticis commodat.

Hyberno tempore cum carnibus Veruecinis pinguis decoquitur.

Brasica tenuifolia.

Κράμνη λεπτοφύλλος σελινουσίης.

Brasica tenuifolia lacinata.

Brasica Selinoides.

Zart Krausser Kol.

Folijs est fissis & in lacinas multas dissectis, sapore vulgaris Brasicae.

Brasica florida.

Brasica Cauliflora Dod.

Brasica florida botryitis

Lob.

Brasica Pompeiana Plin.

Blumentôl.

Salatfôl.

Bäselinfôl.

Caulisior olitoribus?

Peregrina est. Caules medij conglomerati, Ori grati cocti ex iure pingui eduntur.

Brasica raposa.

Caulorapum Mattioli.

Brasica caule rapum gerens seu g. Dod.

Brasica peregrina medio caule turbinata & rapacea.

Κράμνη γεγυλαμένη.

Rubenfôl.

E græcia hortis nostris familiaris facta, Solum vult mediocre, pingue & sterco-ratum.

Brasica prolifera.

Brasica crispa prolifera

Tabern.

Brasica Asparagodes crispa C. B.

Büschel

Büschel Kölskraut. Tabern.
In horto Laur. Scholtzj
Vratisl.

Buglossum Italicum.

Buglossum Angustifolium
Lobel.

Echium Italicum spinosum
Fuchs.

Buglossa maior *Officin.*

Welsche Ochsenzunge.

Βέγλωσσον.

In viridarijs Medicorum
perennat. A Iunio in Au-
tumnum vsq; floret.

Flosculi aspectu elegantes
Cordiales sunt, saccharo cō-
seruantur, & in vsum Medi-
cum exiccantur.

Buglossum rubrum I.

Ἀγχύστει *Diosc. παρὰ τὸ ἀγχύ-
στειν ἀφρίκων.*

Anchusa, Calys seu Ono-
clea *Aduers.*

Alcanna *Offic.*

Buglossa rubra *Mattiol.*

Rote Ochsenzunge.

Alfannenwurz.

Türkische Rote *Vulgò.*

Iulio floret.

Radix refrigerat, desiccet,
adstringit. Subamara est, ex-
tenuat, extergit humores
Corporaq; deniat.

Calculosis, Lienis & bile
suffusis commendatur. Hæc

cum vino rubro adstringenti
& butyro recenti decoqui-
tur ad vnguenti consistenti-
am, Ruptis, Conuulsis, ex al-
to deuolutis proficuam.

Ad Exanthematum faci-
lem eruptionem ex calenti
Cereuisia vulgi medicina.

Radicem ob sanguineum
succum mulieres olim ad fu-
candam faciem vsurpabant.

Buglossum rubrum II.

Buglossum angustifolium.

Anchusa spuria flore ru-
bro.

Echij facie Buglossum mi-
nimum flore rubente, *Lob.*

Kleine rote Ochsenzunge.

Minus est & folijs angu-
stioribus.

Bulbo-Castanum.

Βουλβοκάστανον.

Α' γένος κάστανον.

Nucula terrestris Septen-
trionalium *Aduers.*

Oenanthe 1. *Mattiol.*

Geranium 1. *Diosc. Castan.*

Erd Castanien,

Sew Castanien.

Schäfer Nüz.

Bulbus est oleraceus e-
dendo totus & gratus Casta-
næ sapore.

Bulbus eriophorus.

Hh 3

'Eri-

Βουμβίκος Theoph.

Bulbus Bombycinus.

Wolckhte frembde Zwibel.

Buxus humilis.

Πύξος Diosc.

Χαμύπυξος.

Burbaum.

Semper humilis manet,
nunquam ad Arboris assur-
git proceritatem.

Perpetuò viret, nec frigo-
ra horret, grauis odoris.

Capillum rufiant, tum fo-
lia tum rami in lixiuio de-
cocti.

Nec cariem nec vetusta-
tem sentit spississima ac
densissima eius materia: ob
id grauiissima.

*Calamintha montana præ-
stantior.*

K *Καλὰ μίνθην ὀρεῖν Diosc. ὡς κα-
λὴ μίνθην quasi bona Men-
tha & utilis.*

Calamintha montana
agno flore.

Edle BergMünze.

Viget æstate & toto ferè
Autumni tempore, à Iunio
in Autumnum flores semen-
que perficit. Radix valde re-
stibilis.

Olfactu est suauiter acri &
sapore paululum amaro.

Calidæ & siccæ temperiei.
Digerit, mordicat, extenuat,
incidit valenter crassos hu-
mores, trahit ex alto ad cir-
cumferentiam.

Menses ciet, vrinæ pellit,
Ruptis, conuulsis, ægrè spi-
rantibus, torminibus, horro-
ribusq; auxiliatur. Regium
morbum expurgat, Venenis
resistit. Theriacæ miscetur.

Calamintha montana
vulgaris.

Calamintha Mattioli.

Calaminthum montanum
vulgare *Officin.*

Gemeine BergMünze.

Iulio & Augusto floret.

Eadem præstat, sed minus
potens.

Calendula vulgaris
hortensis.

Χρυσάνθεμον Diosc. Aduers.
*Chrysanthemum ocula-
tum Diosc. Aduers.*

Calendula Officin.

Verrucaria.

Ringelblumen sil.

Goldblumen.

Nulli non horto decora &
inquilina. Singulis ferè
Mensium calendis, Maio &
Iunio incipiente vsque in au-
tumnū floret.

Gustu est adstringenti
cum

cum lenicula amaritudine. Calefac. ordine 2. Aperit, digerit, prouocat. Cor roborat, venenis resistit, & aduersus pestilentes febres commendatur.

Ventriculum frigidum corroborat, appetitum prostratum excitat, ab obstructione liberat Hepar & Lienem. Calefacit & confortat omnia viscera interna. Mouet vrinas & Menstrua ducit. Semen verimibus infestum.

Calendula simplex maiore flore.

Grosse einfache Ringelblumen.

Calendula simplex maiore flore medio rubro.

Calendula simplex medio ruffa.

Kotgelbe Ringelblumen.

Calendula simplex maior albicante flore.

Weisse Ringelblumen.

Præfertur cæteris ad album fœminarum fluxum immodicum.

Calendula multiplex.

Calendula flore pleno.

Calendula multiflora maxima.

Grosse volle Ringelblumē.

Calendula multiplex aurea.

Calendula satiuæ polyanthos melina.

Grosse Goldgeele volle Ringelblumen.

Flores Virguncularum coronis inserti bonum colorem eis reddere vulgo persuasum est. Poti earundem Ocrias emendant, Menstrua eliciunt, Ictericam discutiant, & prauum Corporis habitum emendant.

Conserua florum cum Rhabarbaro sumta ad eodem vltus efficax.

Vulneraria est insignis.

Calendula multiplex prolifera.

Calendula reflorescens seu prolifera.

Calendula polyanthos prolifera.

Chrysanthemum proliferum Lob.

Volle Ringelblumen mit nebenblümlein.

Autumno vtp plurimum laterales flosculi enascuntur.

Camelina I II.

Camelina Thlaspi effigie.

Pseudo-Myagrum 3. Matt.

Camelar.

Tschel

Teschel Dotter.

*Camelina Thlaspi ef-
figie.*

Cameline Lobel.

Myagrum 2. Thlaspi ef-
figie.

Schottendotter.

Semen Auiculis gratum.

Cannabis mas.

Kannabis mas. asclepias xanthoxanthos, Diosc.

Cannabis fœcunda Dod.

Canapus.

Zamer Hanff.

Hanff sil.

Ad vestium stragula, Re-
stes & quamlibet suppel-
tilem seritur in campis.

Semen gignit rotundum,
cinereum colore, medulla
dulci, alba. Calefacit mul-
tum, desiccatur, flatus discutit,
genituram exiccat.

Emulsio ex semine trito
fluxiones sistit diurnas,
dolores, repentinosque fla-
tum vortices, & humorum
fluctuatione compescit, som-
num conciliat. Vfus tamen
immoderatus molesto sopore
perfundit.

Contusi medulla capiti
vel pedibus imis admota
haud abs re Icteri humores
vaporesque tenues à centro

auertere & euocare putatur.
Gallinæ hoc semine oui-
feraciores redduntur.

Cannabis femina.

Cannabis sterilis, Dodon.

Cannabis sylu. Mattioli.

Cannabis maior, Trag.

Simel.

Simel Hanff/ sil.

Hæc caules edit longè te-
neriores, multis ramis bra-
chiatos, & floret etiam, sed
nullo semine prolificat.

Succus foliorum Auribus
instillatus vermes interimit,
Intestinorumque tineas ex-
cutit. Radices Podagricis
tophis commodæ: recentes
illinuntur vtiliter ambustis.

Capparis.

Kapparis, Diosc.

Kapperstaude.

Non nisi instructissimis
viridarijs alitur.

Fœtus priusquam se pan-
dat in florem, decerpitur &
muria vel aceto conditur.

Cappares in Officinis du-
plices habentur. Maiores, mi-
niores. Minores vulgo, quia
palato gratiores, habentur
meliores, fleine Kapperlin/
Cappern in Essig. Cum reuera
maiores melioris sint succi,
& aptiores alendæ carni.

Edun-

Eduntur sale prius eloto,
addito oleo & aceto, Quar-
tanâ laborantibus ac Lieno-
sis in cibo profunt: appeti-
tum lapsum erigunt.

*Cardiaca Moluccana
laevis.*

Cardiaca Melica seu Mo-
lucca Syriaca minus aspera,
Advers.

Molucca laevis, *Dodon.*

Melissa Constantinopoli-
tana, *Mattiol.*

Syrifch Hertzegefperr.

A Moluccis Orientis non
ita dudum repertis Insulis
nomen habet, vnde primò
allata creditur.

Ex semine nascitur.

Contra venena efficax.

*Cardiaca Moluccana
aspera.*

Melica seu Molucca aspe-
rior Syriaca, *Lob.*

Molucca spinosa, *Dodon.*

Rauch Syrifch Hertze-
gefperr.

A priori asperiufculis ca-
liculis tantum est diuerfa.

Calefacit, aperit, at-
tenuat, abftergit, Ictericos iu-
uat, Lumbricos interficit &
Animalium venenosorum i-
ctibus mirificè auxiliatur,
tum pota tum illita.

Carduus benedictus.

Ἀπκαλλὶς ἐπυρίοναυλος,

Theophr. *Dod.*

Attractylis hirsutior, *Fuchf.*

Cnicus supinus, *Cord.*

Cardobenedictus, *Officin.*

Carduus sanctus.

Cardobenedict.

Bernhardiner Fraut.

Gefegnetzer Distel.

Bornwurtz.

Planta apud Silesios ma-
gni nominis, æstimationis
& vsus.

In hortis Iulio & Augusto
florete, quo tempore ad Me-
dicos vsus colligitur.

Calefacit, siccat recessu 2.
Gustu amarus est. Expurgat
viscera: Iecur & Lienem ab
obstructione liberat: ventri-
culo què bilis infestat, con-
fert, eiusque dolores sopit.
Malos humores absumit &
educit. Pectus expurgat;
Phthificis, Pleureticis con-
ducit, tormina sedat, sudo-
res elicit. Calculum com-
minuit. Mensesque pro-
mouet.

Tertianam, Quartanam
aliasque putridas Ventricu-
li febres sanat.

Contra pestilentiam om-
nisque generis venena le-
thalia mirificè pollet, tam

li

inte-

interius suntus, quàm venenosorum animalium moribus illitus.

Cancrum aliaque maligna, putrida & gallica vlcera sanat.

Semen vtiliter Emulsionibus in febribus malignis additur.

Carduus Maria.

Acordagris, Diosc. Mattiol.

Cardu⁹ leucographis, Plin.

Sylibum, Aduers.

Spina alba hortensis, Fuchf.

Bedegarim seu *Bedeguar*, Offic.

Mariendistel.

Margendistel / sil.

Unser Frawendistel.

Planta est aestiva & quottannis ex semine deciduo repullulascit.

Deficcet Radix & modicè adstringit.

Semen tenuis est essentiae & calidae facultatis, gustu amarum, omnibus aduersatur venenis, conuulsisq; auxiliatur Infantibus. Bibitur vtiliter ad Hepatis & viscerum infarctus & vrinas remoratas. Quare confert Hydropicis, Ictericis ac Nephriticis. In pleuresi & lumborum doloribus vulgi medicina.

Carduus sphaerocephalus.

Pe⁹ Er, i⁹ E, Theoph. Aduers. *Echinopus* seu *Carduus echinatus*, Gesn.

Crocodylium, Fuchf.

Spherdistel.

Balldistel.

Rund Köpficht distel.

In hortis elegantiae causa: altero à satione anno floret.

Folia & semina sapore leniter amara sunt. Caput echinatum cum semine decoctum collutu dentium dolores mulcet.

Carduus stellatus.

Tei Conos *φωλάνθη*, Theoph.

Spina stella, Tabern.

Spina solstitialis, Dod.

Eryngium, Guil.

Calcatrippa Italica, Matt.

Sterndistel.

Kadedistel.

Wallendistel.

Iulio & Augusto floret.

Radix calidae est & siccae facultatis, tenuis essentiae, vrinas mirum in modum pellit. Calculumq; deturbat.

Aqua ex radicibus destillatur aduersus diuturnas febres vtilis, Lue venerea infectis commoda: sanguinem à vitiosis humorib. expurgat.

Carduus

Carduus fullonum satius.

Dipsacus fullonum, Dod.

Dipsacus albus, Fuchf.

Onocardium.

Weberdistel.

Weberfarten.

In hortis & campis à panificibus seritur.

Carduus sativus spinosissimus.

Τριφυλλος πικνοληψος.

Polyacantha vulg.

Grosser stachelichter Distel.

Maximus est & spinosissimus ad hominis altitudinem assurgens.

Augusto floret.

Carthamus.

Κράναι, Diosc. Gal.

Κράναι, Theoph.

Cartham⁹ seu Cnicus, Lob.

Crocus Sarracenicus Martiol. Cam.

Cnicus urbana & sativa, Plin.

Carthamum, Officin.

Wilder Garten Saffran.

Bürstenfrant.

Safflor.

Iulio & Augusto flores exponit, qui à nonnullis vice condimenti in cibum veniunt. Cibos namque croceo

colore commendant & aluum emolliunt.

Adduntur & cordialibus medicamentis. Semen superne & inferne purgat pituitam & aquas extrahit, ob id morbis inde natis mirifice auxiliatur. Corrigitur Mastice, Aniso, Zingibere & alijs stomachicis.

Carthamus sylvestris Recent.

Κράναι à *κρίνα*.

Attractylis sylvestris hirsutior.

Attractylis recticaulis, Theoph.

Spillendistel.

Spindeldistel.

Semen Cnico simile, sed minus & nigrum, amari- cans: siccatur & digerit mediocriter.

Caryophyllus sativus.

καρυφύλλος, Theoph. Scalig.

Betonica coronaria, Tab.

Betonica altalis, Fuchf.

Herba Tunica, Offic.

Flos caryophyllorum.

Caryophyllus hortulan⁹.

Graß Negelin.

Garten Negelin.

Vbius in fenestris, pensilibus vasis, nec non in hortorum torulis spectatur,

II 2

ut ni-

vt nihil vulgatius.

Floret diutissimè, tota quidem ætate, & autumnò, in cellis etiam interdum, fauente loci tepore, hyeme tamen frigida.

Mirum creditur, vt tam celebris flos tamque iucundus fuerit à veteribus silentio prætermisus, qui amplitudine, pulchritudine, varietate, odoris præstantiâ Rosa non inferior censi potest.

Vim floribus inesse calefaciendi & siccandi saporis amaritudo, odorisque fragrantia satis declarant. Alijs mediocris esse temperatura videtur.

Præstant purpureo nitentes colore, Caryophyllos aromaticos redolentes.

Roborant ventriculum, cerebrum, cor, & iecur, unde commendantur ad omnes cordis affectus, Vertiginem, Apoplexiam, Paralyfin & conuulsionem.

Aduersus venena, venenosorumque animalium ictus mirificè valent. Hinc contra pestilentie contagia dantur, Antidotisque inferuntur.

Conseruantur saccharo ad eisdem vsus.

Succus haud inferior eo, qui ex granis tinctorijs Ker-

mes dictis colligitur. In cordis affectibus, Cardialgia, Palpitatione, Lipothymia, Ventriculi imbecillitate, Capitisque malis, Vertigine, Cephalalgia &c. præstantissimum remedium. Commodissimè etiam in febribus malignis propinatur.

Acetum florum oxyrrhœdinis vtiliter permiscetur.

Aqua ad eosdem vsus vitreis organis elicitur. Iulepis Cordialibus & Epithematibus Hepaticis & Cephalicis non sine fructu miscetur.

Radix inodora, insipida cur floribus in compositis sit præferenda, non video.

Caryophylli domestici apud nos varia sunt genera, colore, odore, & florum stipatu differentia. Alij enim Maiores sunt, alij Minores, alij pleni. Quidam coccineo rutilant colore, alij saturatâ purpurâ nitent. Alij candido, alij carneo, alij miniato gaudent colore. Sunt & verticillores nonnihil albo rutiloque colore mistim resperfi.

Caryophylli domestici maiores simplices.

Intensè rubri.

Albi.

Minia-

Miniati.

Parpurei.

Variegati.

Einfache oder hohle Negelin / roth / weiß / leibfarben / Pomeranzfarbene / eingesprengete.

Ex semine facile nascuntur & hyemis frigora perferunt.

Caryophylli domestici pleno flore rubente.

Caryophyllus multiplex intensè rubens.

Caryophyllus maior plenus intenso rubore nitens.

Volle satt rote Negelin.

Caryophylli dom. multiplices pallidè rubentes.

Caryophylli domestici pleni carnei coloris.

Leibfarbene volle Negelin.

Caryophylli dom. multipl. miniati.

Caryophylli domestici pleni Arantij pomi colore.

Pomeranzfarbene Negelin.

Præ cæteris ob colorem elegantem ad Corollas expetuntur: verum odore minus fragrant.

Caryophylli domestici pleni variegati.

Caryophylli dom. multiplices rubris & albis punctis strijsq; picti.

Eingesprengete Negelin.

Strigische Nelcken vulgo.

Maiores sunt cæteris & denso foliorum stipatu suauissimum exhalant odorem.

Caryophylli dom. pleni ex furculis nati.

Allerley gepfropffte Negelin.

Hi diligentia & studio feminarum & Virguncularum furculis tenellis in terram Maio subactis plantantur, & fœtilibus multis annis Aestate & Hyeme florentes vigent.

Caryophyllus Armerius l.

Flos Armerius 2. Dod.

Viola barbata latifolia Lugdun.

Caryophyllus Charthusianorum,

Charteuser Negelin.

Scharlachs Blumen.

Stein Negelin mit Silber punctlin.

Folio est latiore, breuiore Saponariæ. Flores permulti in umbella simul congesti, Iulio & Augusto pulchrè rubent exiguis argenteis punctis ornati.

li 3

Caryo-

Caryophyllus Armerius II.

Superba alba & suauè rubens Lob.

Caryophyllus minor Dod.

Weisse Zerferbte Weis-
Leibfarbene gelin.

Pirnische Negelin.

Seder Negelin.

Flores minus profundè
dissecti sunt, suauiter odo-
rati.

Caryophyllus viscarius.

Muscipula seu Armeraria
2. Lobel.

Sesamoides magnum Sal-
manticum Cl. H.

Armerius flos 4. Dod

Strembde Bleber Negelin.

Caryophyllus Indicus minor simplex.

Αυκοντέριος Gal. Tabern.

Tanacetum Peruvianum
Cord.

Flos Aphricanus minor
simplex.

Africanische Sametrofen.

Herbst-Rosen / Samet-
blumen.

Color huic aureus subni-
gricans & liuida quadam
purpurâ adumbratus, aspe-
ctu admodum iucundo, ho-
losericum æmulans.

Augusto & Septembri in
hortis & fistilibus floret.

Grauis, foetidus & ingra-
tus odor attestantur, huic
inesse vim malignam & no-
xiam, ob id intra Corpus su-
mi non debet.

Caryophyllus Indicus minor plenus.

Flos Aphricanus minor
multiflorus.

Othonna Diosc. Lacuna.

Gefüllte Sametrofen.

Caryophyllus Indicus maior simplici flore.

Flos Aphricanus maior
simplex.

Tanacetum Africanum
maius simplici flore.

Caltha Africana frutico-
sa flore simplici Gesn.

Einfache geele Herbst-
Rosen.

Geele Rosen vulgò.

Caryophyllus Indicus maior multiflorus.

Flos Aphricanus maior
polyanthos.

Othonna maior polyan-
thos Lob.

Tages Indica.

Grosse volle gelbe Herbst-
Rosen.

Fistilibus ad hyemem vs-
que

que flores lucent: qui ad Corollas à Puellis colliguntur.

Aggrauant Caput, nocent Cerebro & Cor debilitant.

Castanea Arbor.

Καστανία Diosc.

Reffenbaum.

Castanienbaum.

Fructum præcedunt nucamenta propendunt longa & lutea Nucis Inglandis iulis similes.

Largius sumta in cibum Capiti dolorem inferunt. Adstringunt, siccant, aluum sistunt, ægrè concoquuntur & aluum inflant.

Centaurium maius.

Κενταύριον μέγα Diosc.

Centaurium maius serratifolium *Aduers.*

Rhaponticum *Offic. Cord. & Matt.*

Panax platyphyllon *Plin. Dod.*

Gros Centaurewurz.

Gros Taufengöldin.

Solum amat pingue & lætum.

Succum flauum subrufo-centem fundit Radix, quæ gustu est acris simulque adstringens, lenicula quadam dulcedine.

Medetur Ruptis, Convulsis, ægrè spirantibus, diutur-

na Tussi, sanguinem expul-
sentib⁹, Asthmaticis, ex aqua
& vino vulnera glutinat.

Haud rectè Rheopontico
substituatur, cum legitimum
hodie sufficienter asportetur
ad nos.

Cepa rotunda.

Κεράμειον Diosc.

Cepa Fuchf. *Trag.*

Cepa rotunda capitata
Matt. Cam.

Vnio.

Swippel.

Swiebel.

Swieffel.

Coloris est rubei & can-
didi, Culinis notissima. So-
lum appetit pingue, vehe-
menter subactum. Seritur A-
prili & Maio.

Cepa acris est & odore
lachrymosa, calida & sicca,
crassarumq; partium.

Incidit, mordet, flatus
gignit, extenuat, expurgat,
sitim mouet.

Hæmorrhoides aperit cum
apposita tum cum aceto in-
uncta.

Costa vehementer urinam
pellit, semen genitale auget
& Venerem stimulat: im-
posita tubercula concoquit &
celerrimè rumpit.

Succus cum Melle & Ru-
ta Ca-

ta Canis rabidi morfibus illinitur.

Largiore cibo sumta, Capitis dolores efficit, Oculos offendit, ac aciem eorum retundit & sensus stupidiore reddidit.

Naturā biliosis aduersatur.

Cepa oblonga.

Cepa Hispanica oblonga Lobel.

Cepa alba.

Lange weisse Zwiebeln.

Spanische Zwiebeln Sil.

Mitior est sapore, nec adeo Caput afficit.

Cepa sterilis.

χωρὶς σπέρματος.

Κεβερμων. τμήλον Theoph.

Porrum sectium Lob.

Porrum tonsile.

Schnitzzwibel.

Briglauch Sil.

Ad obsonia & condimenta paranda in hortos recipitur. Diu viget & plurimis annis restat hyemis ac frigoris patiens.

Odore & sapore cepam & porrum refert.

Cepæa.

Κυτάν Diofc.

Portulaca sylvestris.

Zepeenfraut.

Acker-Burzel.

Welsch Harnfraut.

Folia in vino pota vrinæ stillicidio & Vesicæ scabie laborantibus opitulantur.

Cerasus hortensis dulci fructu.

Κερασορ.

Passim in hortis.

Cerasia dulcia rubra seu Cæciliana, rote Kirschen.

Cerasia nigra, Aëtiana.

Schwartz Kirschen.

Cerasia Hungarica.

Cerasia Hispanica.

Cerasia Iuliana Plin.

Grosse Ungrische Kirschen.

Spanische Kirschen.

Flatulenta sunt, Aluum emolliunt, cum nucleis vrinæ pellunt; sed citissime corrumpuntur & prauos succos generant.

Cerasia pinguis decocta & per cribrum traiecta in tabulis ligneis ad solem induratur a feminis in Ciborum condimenta.

Gegossene Kirschen.

Cerasus Italica.

Welscher Kirschbaum.

Cerasia acidula, acidodulcia, Pliniana.

Welsche Kirschen.

Weisse Kirschen.

Weinseurliche Kirschen.

Hæc

Hæc omnium sunt suauissima, quæ in Culinas veniunt.

Rubent quidem & melioris sunt succi, sed aquei, frigidi ac humidi. Sitim sedant, æstuanti Ventriculo profunt, febricitantibus utilia; faciliè descendunt & aluum lubricum reddunt, nutrimenti verò exiguum præbent.

Cerasus fructu acido.

Sauer Kirschbaum.

Cerasia austera, Amarena.

Cerasia Aproniana.

Schwartzæ Sauer Kirschen.

Amarellen.

Weichsel Vulgò.

Refrigerant, desiccant & nonnihil etiam incidunt, Ventriculum constringunt, Cibi appetentiam inuitant, bonum sanguinè generant, Pituitam incidunt crassosq; humores, flauam bilem reprimunt, urinam eliciunt.

Sapore commendantur ad intinctus conficiendos, quibus & sanis & ægrotantibus febribus maximè biliosis vexatis edulia iucundissimè condiuntur.

Succus per se vel cum saccharo ad eosdem vsus ad certam consistentiam densa-

tur. Condiuntur item saccharo & exiccantur integra in cibum & medicinam.

Cerasiorum gummi.

Lachryma Cerasi.

Kirschhartz.

Cum quadam viscositate tenuium est partium absque mordacitate.

Tussi veteri medetur, Arterias exasperatas lenit, Calculosis ex vino prodest.

Aceto liquefacta Infantium Lichenas sanat.

Virgunculæ in pyri formam effingunt, vulgò, Claren, quo pilos à fronte auertunt frontemque exhilarant.

Chamacerasus.

Χαμαίρερος.

Cerasus humilis.

ErdWeichsel.

In horto Laur. Scholtzj.

Chamalea.

Χαμαίρεα Diosc.

Chamalea tricoccos Lob.

Mezereon Arabum Aduers.

Coccognidion Officin.

Κόκκος κρινίδειος.

Zeidelbast.

Zeiland.

Belberahals.

Ibidem frutescit.

Kk

Folio

Folia & fructus amara sunt & acria vrentis & vehementer calidæ facultatis.

Bilem & Pituitam detrahunt, sordida & crustosa vlcera cum Melle repurgant.

Chamamelum Romanum.

Chamæmelum odoratius Dodon.

Anthemis seu Leucanthe-
mis odorata Lob.

Chamomilla Romana.

Römische Camillen.

Edle Camillen / oder Her-
mel.

Instructioribus hortis no-
tum, etiam asperrima hye-
me viret.

Facultatibus vulgari mul-
tò est præstantius. Suavius
enim quiddam aromati-
cumq; Amaraci aut Abrota-
ni exhalat.

Syrupus ex hoc ad Ictē-
rum Splenis & Hydropem
utilis paratur.

In aqua aut vino decocta
herba cum floribus addito
Cymino pota, mirificum in
Colica flatulenta præstat au-
xilium.

*Chamamelum Romanum
flore pleno.*

Chamæmelum Romanum
multiflorum.

Anglorum niveum λευκὰν-
θemon flore multiplici Aduers.

Volle Römische Camillena
blumen.

Edle Camillen / Hermel mit
vollen blumen.

Eiusdem cum priori fa-
cultatis.

Chærefolium.

Χαίρε φυτόν.

Chærefolium Offic. Dod.

Gingidium Fuchs.

Rörffel / Rörffelkraut.

Rörbelkraut.

Terrâ stercoreatâ & ali-
quantulum humente oble-
ctatur. Maio floret & semen
fert nigrum oblongum ari-
stis Auenæ simile.

Si Augusto feratur, per
totum hyemem vtile est.

Coctum crudumque Sto-
machi magna utilitate e-
st. Culinaria est herba, to-
ta dulcis & odorata, acrius-
culo quodam accedente sa-
pore vix ferè insensibili.

Grumos Sanguinis con-
cretos dissoluit, Menstrua
prouocat, affectibus Renum
& Vesicæ admodum utilis.

Corroborat Ventriculum,
Cerebrum, Intestina, & Pe-
stilentialibus febribus oc-
currit.

Chære-

Charefolium Hispanicum.

Μυρρίν Diosc. ὡς μύρρις.

Πιλοβαρηνον. Cord.

Cerefolium maius.

Myrrhis maior C.B.

Smyrrhiza Plin.

Seseli Peloponnesse

Angul.

Myrrhenfraut.

Spanischer Bdrffel.

In hortis satum diutius restat.

Odore, sapore, iucunditate, facultatibus Cherefolium imitatur.

Radix longa crassa in Cibus additur instar Petroselinii. Vrinæ potenter ducit; ob id Ictericis, Hydropicis, affectibus Renum & Vesicæ commendatur.

Aiunt eam bis teruē die potam ex vino, in Pestilentia salutarem esse, & ne contagia Morbi sentiantur, obitare.

Chondrilla Hispanica.

Chondrilla rara purpurante flore, semine nitido decido Lob.

Crupina Belgarum.

Spanische Condrillen.

Facile ex semine nascitur, neglecti vsus.

Chondrilla cœrulea Belgarum.

Blaw Condrillenfraut.

Aliunde allatum semen in hortis seritur.

Chrysanthemum Martioli.

Χρυσαλθειον Diosc.

Bellis lutea Tr.

Bellium maius Tabern.

Boaria Rom.

Chrysan. hemū segetum.

Goldblume.

Gele Genseblum.

Geel Kindsauge.

Duplex est. Maius & minus folijs profundius incis.

Aestiuā est planta, frigoris impatiens, tenera, fruticosa, oleracea, gustu nonnihil caloris indicans.

Pota in Balneis post exitum de folio Morbo regio correptis breui bonum colorem inducit.

Chrysanthemum Americanum.

Chrysanthemum Peruvianum Dod.

Helenium Indicum maximum C. B.

Planta maxima.

Corona Solis.

Gigas herba.

Kk 2

India

Indianisch Goldblume.
Sonnenfrone / Sonnen-
blume.

Ex semine ab Hispanis ex
 America allato lubenter nas-
 citur. Augusto floret.

Pediculi foliorum teneri
 adhuc pilis derasis in crati-
 cula cocti, sale oleoq; condi-
 ti, esu suaves, Oriq; grati, &
 ad Venerem promouendā
 profunt.

Ad vulnera glutinanda
 gummi & vniuersa planta
 magnæ commendationis.

Chrysanthemum America-
num proliferum.

Flos Solis maximus ra-
 mosus.

Sonnenfron mit viel ne-
 benblümlein.

Septem octoūe flores hoc
 anno in hortulo meo ex vna
 planta enati sunt.

Cicer Arietinum.

Ἐπίανθο· Diosc.

Cicer satium.

Cicer Officin.

Biechern.

Ziser Erbes.

Amat pingue solum.

Aperit, abstergit, discu-
 tit, incidit, flatus excitat.
 Calidum est & humidum, a-
 maritudinis non omnino
 expers.

Lac & semen copiose ad-
 auger, venenis resistit.

Eius decoctum Lienem,
 Iecur & Renes expurgat,
 Menses & partus pellit, Cal-
 culum frangit, Ictericos Hy-
 dropicos & Cachecticos per
 vrinas purgat.

Cichorium Italicum.

Cichorea satia.

Welsche Wegewart.

Garten Hindlenisse.

Magis quam agreste re-
 frigerat.

Olitores radices hyeme
 terra aut sabulo obruunt;
 quo artificio mirum in mo-
 dum albescent, teneræ eua-
 dunt, & in totam asseruan-
 tur hyemem, exuto magna
 ex parte amarore.

Condiuntur etiam verè
 cum saccharo ad Hepatis ca-
 lidiores affectus.

Citria Malus.

Μηλέα μινδάν, Diosc.

Malus Medica, Citrea.

Citrus, Tabern.

Citronbaum.

Citrinatbaum.

In viridarijs aliquando as-
 seruatur vasculis, sed fru-
 ctum non fert.

Folia odorata, calida &
 sicca.

Citria

*Citria Mala.**Μάλα μινδα.**Cedromela.**Citrula.**Citron öpffel.**Citronen.**Citrinatöpffel.*

Cortex amarus est, non sine acrimonia. Omnibus venenis aduersatur, & frigidum ventriculum roborat, Cor exhilarat.

Mansa oris halitū emendat, suauitatemque accersit.

Caro refrigerat, humectat, flauam bilem reprimat, sitim sedat, & Pestilentiaē cōtagia arcet.

Succus grauidarum Malaciae succurrit.

Semen amarum venenis aduersatur, Aluum mouet & lumbricos expellit, in febribus pestilentialibus magni vsus.

Cortex conditus sacch. Ventriculum, Cor & Cerebrum roborat.

*Citrullus.**Anguria, Mattiol.**Cucumer Citrullus, Fuchf.**Citrulus, Citreolus, Trag.**Citrullen.**Erdoöpffel.**Indianische Kürbis.*

Autumno fructus maturascunt, Augusto floret. Refrigerat & humectat.

Pulpa in ore commansa, Linguae in febribus asperitatem lenit & sitim compescit.

Semen internarum partium inflammationibus succurrit & bilis acrimoniam ac feruorem contemperat.

*Clematis seu vitis syluestris.**Ἀμπέλως μέλαινα, Fuchf.**Κληματὶς ὀτέεζ Diosc. Mattiol.**Vitis nigra seu Bryonia, Fuchf.**Viorna vulgò, Aduersf.**Clematis 2. Mattiol.**Lynen.**Wald Reben.**Rebling.*

In horto Laur. Scholtzj, semen fert Septembri.

Gustus feruidus & acris calidam arguit vim.

*Clematis peregrina purpurea.**Clematis Pannonica.**Purpur braun Winde.*

In hortorum est delicijs: floret aestate.

*Cochlearia.**Cochlearia Batava, Aduersf.**Kk 3**Tele-*

Telephium Diosc. Lac. &
Ronsæo.

Herba Scorbuti.

Rösselkraut.

Schorbockskraut.

Ex semine integro anno
viret in horto meo ad succi
vsum.

Facultatem euidenter ca-
lidam & siccam, virenti Na-
sturtio sapore & qualitate
persimilem obtinet.

Scorbuto efficaciter me-
detur.

Succus Hydropicis propi-
natur, nec non alijs externis
maculosis Cutis affectibus
Lienis vitio progenitis.

*Colchicum candido
flore.*

Zeitlosen mit weissen blü-
men.

In horto D. Laur. Scholtzj.

Colocynthis rotunda.

Κολοκυνθία.

Cucurbita amara cathar-
tica, Lobel.

Coloquinthen.

Wilder Kürbis.

Veheimens catharticum,
Empiricis, quibus frequen-
ter in vsu, notum.

Insigniter est amara: Ea-
propter obstructos meatus
expurgat ac aperit.

Colocynthis pyriformis.

Κολοκυνθία ὀβελία.

Colocynthis pyramidalis
seu fera, Tabern.

Coloquint weiblin.

Byren Coloquinten.

Voluptatis gratia feritur.

Colutea arbuscula.

Κολυτρία, Theoph. Aduers.

Colutea vesicaria.

Welsch Senerbaum.

Linsenbaum.

Viridarijs familiaris. Ve-
re floret, Augusto semen in
vesiculis maturescit.

Folia in maiori copia ex-
hibita, vt Sena aluum laxant.

Semen vomitorium est
sicut Genista.

*Consolida regalis caru-
lea vulg.*

Κόμμιον ὀβελία ἑρμεν, Diosc.
Tabern.

Calcaris flos, Recent.

Calcitrapa, Cord.

Consolida regia.

Rittersporn.

Sporn blumen.

Horn fummel.

Coronaria est puellis nota.

*Consolida regalis caru-
lea maior.*

Delphinium, Dedon.

Grosser blauer Rittersporn.
Flores

Flores oculorum Epiphoris & inflammationibus utiles, in aqua seu succo.

Consolida regalis purpuroniolacea.

Violbraun Rittersporn.

Consolida ex albo purpurascens plena.

Weißbraun Rittersporn mit vollen blumen.

In horto Laur. Scholtzj.

Consolida regalis incarnata.

Consolida regalis fatiua flore rubro, *Tabern.*

Delphinium 3. flore roseo, *Gesn.*

Leibfarben Rittersporn.

Consolida regalis albo flore.

Delphinium flore candido, *Gesn.*

Rittersporn mit weissen blumen.

Ad coronarum vsum a puellis feritur.

Conuolulus Asureus.

Conuolulus hederaceus vel *cœruleus exotico*, *Aduersf.*

Campana cœrulea, *Dod.*

Campana lazura, *Herbar.*

Flos Noctis.

Blawe Nachtwinde.

Potius voluptatis quam vtilitatis causa plantatur.

Cornus mas.

Kerula, *Diosc.*

Kornelbaum.

Folia & germina gustu acerba sunt valenterq; desiccant, vulnera glutinant.

Corna, Hornfirschen / Horlizen.

Acerba sunt & vehementer astringunt, Dysentericis competunt.

Coronopus I.

Keravrus, *Theoph. & Dioscor.*

Herba stella seu cornu ceruinum, *Dod.*

Coronopodium.

Pes Miluinus seu *Cornicis.*

Hirzgras.

Hirschhorn salate.

Rappensuß.

Ad Acetariorum vsum feritur.

Folia aliquantulum salum & dulcem saporem habent: Cruda eduntur in acetarijs & cocta cum aceto & sale.

Calculosis & cœliacis utilis radix.

Coronopus II.

Cornu Cerui alsiosum repens, *Dodon.*

Ambro.

Ambrosia spontanea strigiosior, Lob.

Briedhender Braensfuß.

Feld Hirtzhorn.

Wanzenfresse.

Tota æstate in hyemem multam viret. Iunio floret, semen Plantaginis ferè in spicis succedit.

Odore destituitur, sola acredine nares feriens. Estur in acetarijs vt prior.

Corylus domestica.

Nux Auellana, Pontica.

Garten Haselstrauch.

Auellana rubra, pontica, rote Haselnüsse / Ruhr nüsse / putamine extrinsecus vestiuntur barbato, nucleo intus ruffa membrana cincto, oblongiore. Gustu sunt gratiores vulgaribus & fractu minimè contumaces.

Aluum adstringunt, Cœliacis ac Dysentericis vtilis. Contra serpentum morsus valent.

Cotonea malus.

Μάλα κυπρία.

Malus cydonia.

Büttenbaum.

Quittenbaum.

Foliorum decocto fouentur Vterus & Anus procidentis. Flores ei alba Ro-

sa sylu. figurâ singuli seorsim collocati: fructus Autumno maturescunt.

Cotonea mala.

Κυδωνία μάλα, χειμῶνια.

Mala Cydonia.

Cydonia minor.

Quitten öpffel.

Bütten / kleine Bütten.

Pyra Cydonia.

Σπυροδερμια vel σπυρία, Diosc.

Quitten Byren.

Grosse Quitten.

Pyri ferè turbinatam figuram exprimunt. Magna quidè sunt, sed minus vtilia.

Ad Medicum vsu eliguntur Cydonia mala, quæ pressa sunt, & in toros ferè diuisa, Melopeponum modo, benè habita, flauescencia, lanuginosa, odorata.

Refrigerant 1. siccant 2. ordine: valenter adstringunt, cohibent, roborant.

Cocta in cineribus cum saccharo Ventriculo apta, Singultu & nauseam compescunt, calorem mitigant, concoctionem iuuant, ventriculum occludunt & vaporum exhalationem prohibent; Omnes alui fluxiones sistunt, Dysentericis ac Cœliacis vtilia.

Cruda

Cruda cataplasmatibus ad-
duntur ad cohibendam al-
uum, aut si Stomachus æ-
stuet, aut in vomitiones ef-
fundatur, ad Mammarum
inflammationes, præduros
Lienes & condylomata.

Condiuntur cydonia Sac-
charo integra vel incisa,
demptis nucleis, ventriculo
grata. Caro cum Melle aut
Saccharo vel per se vel addi-
tis corticibus Citrij, Ambra
& alijs aromatibus ad Ele-
ctuarij formam coquitur.

Vinum seu succus ad sy-
rupi vel gelu consistentiam
addito saccharo redigitur.

Crespinus I.

Ceanothus, *Theoph.*

Grossularia præcox.

Vua crispa, *Lobel.*

Vitis precia, *Plin.*

Christdorn, *Sil.*

Wegdorn.

Stechdorn.

Rauche Breuselbeeren.

Baccæ nonnihil hirsutæ
circa solstitium maturæ re-
frigerant, exiccant, roborant
& adstringunt. Viret primo
vere niuibus delapsis.

Succus immaturi fructus
Omphacij loco est. Iusculis
febricitantiū commodè in-
coquantur; sitim, calorem

extingunt & appetentiam
excitant.

Crespinus II. spinosior.

Grosselbeer.

Glatte Breuselbeeren.

Spinosior est & baccas
subluteas læues non hirsutas,
dulces habet, quæ tardius
maturescunt.

Maturæ parum aut nihil
adstringunt, & caloris exi-
guum quid obtinent.

Crocus hortensis.

Recond. Dioscor.

Crocum.

Safran.

Solum amat mediocriter
pingue.

Autumno floret; folia vi-
rent tota hyeme.

Calefacit, exiccat, frigidi
terreiq; nonnihil obtinet. A-
perit, pellit, digerit, robo-
rat, emollit, concoquit, leui-
ter adstringit.

Lætitiā affert & cordi
conducit, venenis & Pesti
aduersatur.

Immodicus vsus Capitis
dolorem, inappetentiam
cibi palloremq; facit.

Crocus sylvestris montanus
flore albo Lob.

Berg Safran mit weissen
blumen.

L1

Cucu-

*Cucumis sativus vul-
garis.**Σίτος ἡμεγρ, Diosc.**Cucumis esculentus.**Cucumis vulgaris, Dod.**Cucumern / quasi Curui-
mer à curuore.**Gorcken.*Pinguia & aprica amat
loca. Iulio & Augusto matu-
rescunt fructus.Humectant & refrigerant
Cucumeres ordine 2. Ab-
stergunt, incidunt, urinas
mouent, aluo & Stomacho
vtilis.Condiuntur fermento a-
qua & Anetho virides non-
dum maturi; si iam citrini
facti sunt, esui haud idonei.Mensis Acerariorum vice
cum carnibus assis appo-
nuntur palato non ingrati.Semen desiccatur, aperit,
abstergit, Pectoris & Pulmo-
nis inflammatione labo-
rantibus prodest, Iecinoris
obstructiones aperit, Calcu-
lo Renum & Vesicæ exulce-
rationibus subuenit. Emul-
sionibus commodè additur.*Cucumis anguinus fle-
xuosus.**Cucumis oblongus, Dod.**Schlangen Gurcken.**Lange Cucumern.**Hortis instructiorib. notus.**Cucumis asininus.**Σίτος ἄσινος, Diosc.**Cucumis sylu. Elaterij, Lob.**Welfürbis.**Springfürbis.**Circa autumnum fructus
maturescit.*Radix abstergit, digerit,
emollit; Bilem & pituitam
deijcit, præsertim in Hydro-
piscis. Succus summè ama-
rus est, calidus leuiter & sub-
tilium partium.*Elaterium, succus qui è fru-
ctu oblongo, glandi simili,
paratur, summè amarus est,
ordine secundo calidus; Men-
ses mouet, Cynanchis cum
melle illinitur, Ictericis cum
Lacte in Nares trahitur &
Cephalalgicis.**Cucurbita rotunda.**Κολοκυνθα ἰσχυρὸς seu ἡμεγρ,
Diosc.**Cucurbita seu Zuccha,
Aduers.**Cucurbita maior albo flo-
re, Fuch.**Bürbis.**Ronder Bürbis.**Loca amat rigua & a-
quosa.**Cucurbita humectat & re-
frige-*

frigerat 2. gradu. Cruda cibo insuavis, Stomacho pernicioſa & concoctu ferme inexpugnabilis.

Comesta ſitim propellit. Exiguum corpori prabet alimentum, idque frigidum & humidum: facile autem ſubſidet præcipue elixa, quæ acrimoniam contemperat & propter ſubſtantiæ ſuæ lubricitatem aluum emollit.

Cruda illita tumores & abſceſſus mitigat. Oculorum inflammationibus & Podagris bene facit.

Ramenta infantibus contra Syriam, Syncipiti illinuntur.

Semen feruorem Renum mitigat, vrinæ acrimoniam temperat, eamque prouocat.

Folia Mammis Puerperarum addita Lac exiccant.

Cucurbita oblonga.

Cucurbita longior, Dodon.

Cucurbita ſue Zucha omnium maxima anguina, Lob.

Langhalsichter Kürbis.

Zincken Kürbis.

Vraſſlauix in hortis.

Sapore eſt ſubdulci.

Cucurbita lagenaria.

Cucurbita ſeſſilis.

Glaſchen Kürbis.

Cucurbita coronata.

Cucurbita capitata.

Bronen Kürbis.

Ex horto Laur. Scholtzj.

Cucurbita Indica maxima.

Cucurbita Indica ſeu Saracenica maior.

Türkifcher Kürbis.

Türkifch fraut, Sil.

Differt hæc quantitate, figura, colore.

Paſſim in hortis ſeritur ob fructum dulcem. Eſtur vel cum juſculis elixa, vel in butyro additis Malis Ponticis aut Cydonijs pipereque; frixa. Alimentum confert exiguum.

Semen ei magnum album, in quo nucleus includitur dulcis & ſuavis.

Cucurbita Indica longa maior ex ſaturato virescens verrucosa.

Langer ſatgrüner wargen Kürbis.

Cucurbita teres ex ſauro rubens.

Lenglichter roſgelber Kürbis.

Cucurbita Indica minor.

L1 2

Cucur.

Cucurbita Indica minor
rotunda.

Kleiner Oepffel Kürbis.
Erd Oepffel.

Fructus est minimus & pi-
la instar rotundus. Viri-
darius & pensilibus hortis
solummodo nota.

Cucurbita picta.

Cucurbita varia.

Flecken Kürbis.

Oblonga est & maculis
subnigris variegatur.

Cuminum sativum.

Κύμινον ἡμετέρον Diosc. Σπὸ τῶ κέ-
ϕ, quod inter olera maximè
fruticet ac fecundissimum
sit.

Cuminum Regium, Ro-
manum.

Anethum regium seu Ae-
thiopicum.

Cyminum Offic.

Römischer Kümmel.

Bramer Kümmel.

Rechter Kümmel.

Radix tenuis post seminis
maturitatem perit. Diffici-
lè nascitur.

Semen vim habet excale-
faciendi, siccandi. Attenu-
at, incidit, aperit, prouocat,
adstringit, discutit, fluorem
Muliebrem sistit. Ad Sto-
machi nauseam, tormina in-

stationesq; conuenit, phleg-
mata lentosque incidit hu-
mores.

Vtile Pectori & Pulmoni-
bus refrigeratis cum sorbiti-
one sumtum.

Ex vino demorsis à ser-
pentibus propinatur; à Bal-
neo Regium morbum expel-
lit, vertiginiq; prodest.

Cuminum corniculatum.

Ῥήκοον, Diosc.

Hypecoon Dod. & Clus.

Cuminum sylu, 2. filiquo-
sum Aduers.

Kornkümmel.

Semen excalefacit, aperit,
penetrat.

Epotum Serpentum mor-
sibus præsidio est.

Cyanus maior.

Cyanus montanus Tabern.

Cyanus latifolius.

Verbascum Cyanoides.

Grosse Kornblumen.

Wald Kornblumen.

Hortensis est apud nos, a-
libi spontaneus.

Eadem potest quæ ar-
uenfis.

*Cyanus sativus mul-
tistlorus.*

Volle Kornblumen.

Cyanus

Cyanus ex albo violaceus.

Cyanus albus mediopurpureus.

Lichtweisse vielbraune Kornblumen.

Cyanus albus mediorubens.

Weisrote Kornblumen.

Cyanus caeruleus mediopurpureus.

Blau braune Kornblumen.

Cyclamen anguloso folio.

Κύκλαμνος Diosc. & τὸ τὸ κόκκινον.

Cyclamen vernum Lob.

Cyclaminus.

Panis porcinus.

Arthanita Offic.

Schweinbrod.

Schweintod.

Radix cal. & sicc. 3. Abstergit, incidit, venarum ora aperit, attrahit, digerit, detergit, prouocat, aluum emollit.

Cum hydromelite pota pituitam & aquam per inferna trahit.

Coli cruciatus à pituita progenitos aut ab induratis excrementis tollit.

Radix excavata oleo repleta & Cineri feruenti imposita adiecto Ceræ tantillo, vt strigmentosa fiat, vnguentū pernionibus vtilissimum.

Supposita Menses ciet.

Miscetur medicamentis, tubercula, strumas aliasque durities discutientibus.

Succus naribus instillatus Caput purgat.

Cynoglossum Creticum.

Cretische Hundezunge.

Folia sunt asperiora vulgari, flores dilute cœrulei: semine maturo planta perit. Iunio & Iulio floret, semen in theculis asperiusculis amarum, abstergendi vi præditum.

Cyperus longus

Κύπερος Diosc.

Ἰσχυρίων Ἰερ.

Cyperus longus odorati- or habitior Lob.

Iuncus angulosus, quadratus Cels.

Galanga syluestris.

Cyperwurtz.

Wilder Galgen.

Wolriechende Bingen.

Humectis latatur locis.

Eminent Iubæ Iulio & Augusto.

Radix odorata, Calefacit,

Ll 3

exic-

exiccat absq; morfu, roborat, adstringit ac simul incidit & aperit, vrinam & Menses prouocat. Calculo vexat congruit.

Cyperus dulcis.

Συριον δεινον Gesn.

Dulchichnium Dod.

Trasi Veronensium Matt.

Cyperus dulcis Theoph. Tabern.

Italianische Zuckerwurtz.

Süßer wilder Galgan.

Radix excalescit, humectat i. ordine, lenit, lenigat, emollit, acres fluxiones contemperat, genituram auget, & ad Venerem facit.

Cytisus.

Κίλτρο: Diosc.

Cytisus Maranthæ Gal.

Geeler Geisklee.

Gehörnter Geisklee.

Semine & racemis seritur.

Folia digerendi possident facultatem aquæ temperatæ mistam, sicut & Maluæ folia.

Refrigerant, tumores inter initia discutunt, si pane trita illinantur.

Floribus Apes delectantur, ex quibus plurimum Mellis excerpunt.

Damafonium nothum.

Pseudo-Damafonium

Clus. P.

Alifina αλιδάμων seu κοιλιδάμων, Thal.

Calceolus Mariæ & Sacerdotis crepida.

Helleborine punicea seu ferruginea Lugdun.

Butterballen.

Welsch Wegericht.

Graveneschuch.

Iulio floret. Sapor ei amarus.

Vulnera recentia glutinat.

Digitalis purpurea.

Δακτυλίσ

Δελβιδίς.

Campanula syluestris.

Verbasculus digitalis

Coffei.

Nola syluestris.

Braun fingerhütlin.

Braun Waldglöcklin.

In Lotharingia & Alsatia montibus sponte vmbrosis locis luxuriat.

Integra æstate flores gerit pendulos elegantes, semen in theculis paleaceum.

Vulneraria est.

Folia aluum leniunt.

Flores decocti gargarizatu faucium ardori & Inflammationi profunt.

Digita-

Digitalis candida maior.

Digitalis 2. Dod.

Schneeweisse Finger-
hutlin.Paulò serius floret quàm
purpurea.*Digitalis candida purpureis
maculis respersa.*

Weisbrauner Fingerhut.

Diptamnus germanica.

Χαμαίρηλος.

Diptamnus vulgaris seu
mas, minor.

Fraxinella Lob. Dod.

Tragium Cord.

Pceonia macula Veter.

Weisser Diptam.

Gemeiner Diptam.

Spechtwurgel.

Floret Maio.

Amara est radix, candi-
da, grauis odoris.Calefacit, siccit, aperit,
abstergit, extrahit, prouocat.Comitialibus & frigidis
Cerebri affectibus utilis.
Præstat contra Pestilentia
contagia quouis modo sum-
ta. Confert Stomacho &
Anhelosis. Antidotis utili-
ter permiscetur.*Diptamnus Italica.*

Fraxinella Italica.

Polemonium veterum.

Diētamnus maior.

Welscher Diptam.

Huius folia maiora, viren-
tiora, duriora, magisq; acu-
minata. Cætera paria sunt.*Doronicum.*

Doronicum 1. Tabern.

Doronicum latifolium

Clus. P.

Aconitum Pardalianches

1. Dodon.

Schwindelwurz.

Gembsewurz.

Flores lutei.

Radix gustu dulcis, tem-
periei mediæ ac temperatæ
proxima vicinaque. Diu in
hortis durat.*Draco hortensis.*

Draco Aduers.

Dracunculus hortensis

Mattiol.

Tarco.

Dragoncell.

Draconfrant.

Zirwerfrant.

Beysersalat.

Serpendo se propagat ra-
diculis. Tota æstate viret.
Augusto flosculos fert.Acris est cum aromatico
sapore. Calef. & siccit. Man-
sa pituitam ciet, Dentium
dolores mulcet.Estur passim in acetarijs
cum

cum Lactucis alijsq; oleri-
bus; concoctionem iuuat &
vrinas mouet.

Epimedium.

E *Πικνίδιον* Diosc. *Aduers.*
Lunaria Italica.

Monfraut.

Radix prolixis ambagi-
bus incuruatur, atq; in late-
ra diffunditur, subadstrin-
gentis & siccandis gustus.
Aestate multos flosculos
promit.

Folia multum amara.

Aiunt epotum concipien-
di spem adimere.

Eruca satina I.

Eruca satina floribus albi-
cantibus.

Eruca Offic. ab erodendo.

Ερρουειν Diosc.

Raucfelen.

Samer weisser Senff.

Flores Iulio apparent, o-
doris ingrati.

Excalefac. manifestè, sic-
cat, attenuat, aperit, flatu
pellit.

In Cibis sumpta semen ge-
nitale auget, & Venerem
excitat, Aluo perquam com-
moda.

Semen diureticum est,
Ventris tineas perdit.

Eruca satina II.

Eruca lutea maior.

Eruca sylv. *Aduers.*

Eruca Sabaudica.

Rekulla.

Koffhes.

Raucfelen.

Ad acetaria seritur. Eius-
dem facultatis, vrinam po-
tentius trahit.

Cocta addito saccharo In-
fantium tussi medetur.

Eruca satina III.

Eruca lutea minor.

Sinapi i. genus sylv. *Fuchf.*

Erucula.

Klein Koffhes.

Klein Raucfelen.

Tota minor priori.

Eruca satina IV.

Eruca Nasturtio cognata
tenuifolia Lob.

Nasturtium sylv. *Clus.*

Wilder Senff.

Eruum satinum I.

Ογγος *εμπυλδος.*

Pisum Græcorū *satini* Tr.

Phaseolus minor *satini*us

Cord.

Cicer Columbinum *Qui-*
budam.

Weisse Sam Eruen.

Eck Erbis.

Semen

Semen calefacit, ficeat.
Ratione amaritudinis inci-
dit, exterget atq; obstructio-
nes expedit. Ventrem tur-
bat sanguinemq; per urinam
ducit. Corporis colorem
commendat.

Eruum sativum II.

Vide Orobum.

Eryngium cœruleum.

Eryngium planum Dod.
Eryngium alpinum cœru-
leum Tab.

Blaw Brackendistel.

Blaw Manstrew.

In hortos elegantia caus-
sa recipitur. Capitula echi-
nata Augusto & Septembri
hilari cœruleo colore pla-
cent.

Faba maior.

K'α'μ'ος Diosc.

Faba maior sativa.

Bona siue Phaseolus maior
Dodon.

Grosse rote Bonen.

Deutsche Bonen.

Seritur in agris & hortis.

Frigida est & sicca natura.

Adstringit, discutit, abster-
git, impinguat, flatus gignit.

Insomnia tumultuosa cau-
satur, tussi confert. Farina

maculas Cutis abstergit &
nitorem ei conciliat.

Aqua ex floribus ad eos-
dem usus elicitur.

Faba minor.

Faba minor rubea.

Bleine rote Bonen.

Faba nigra.

Kλα'μος ἀ'ρειος.

Faba Latinorum Dodon.

Faba sylvestris Mattioli.

Bona syl. siue Phaseolus.

Pisum nigrum.

Pisum ἀ'ρεβ'α'ειος.

Schwartz Bonen.

Wilde Erbeis.

Mohren Erbeis.

Gustu est fabaceo, sed non
ita grato, odoris grauiusculi.

Pares cum maiore facul-
tates habere creditur.

Fegopyron.

φ'ε'γ'ο'π'υ'ρον.

Τ'ε'γ'ο'π'υ'ρον.

Erysimum Theoph. Lob.

Ocymum cereale Tabern.

Granum Parnasium Crat.

Heiden Korn.

Buchweizen.

Bockweizen.

Incultis seritur montium
locis.

Calefacit & humefiat non
multū a temperatis distans.

M m

Minus

Minus alit quàm Secale & Hordeum, plus tamen prouocat quàm Panicum & Milium. Pulticulæ ex Ptisana & farina facillè digeruntur, gignuntq; mediocrem sanguinem; Tussientibus & difficulter mingentibus prouident.

Semine Gallinarum genus pastum citissimè pinguescit.

Succus herbæ viridis expressus confert ad lachrymantem oculos.

Ferula.

Νάξος Diosc.

Ferula mas seu maior.

Streckenfraut.

Gertenfraut.

In viridarijs ex semine plantari cœpit.

Vi pollet calefaciendi, siccandi, attenuandi.

Ferrum equinum.

Sterra Cavallo Mattioli.

Lunaria minor Chemici.

Huf Eisenkraut.

Facillè ex semine prouenit.

Multa huic à Chemicis tribuuntur secreta.

Ficus urbana.

Σύκη Diosc.

Feigenbaum.

Hyeine perit, nisi in cellas subterraneas reponatur. Germina Maio erumpunt atque fructuum rudimenta. Priores Augusto, posteriores nunquam apud nos maturescunt.

Arbor tenuium est partiū.

Carica, Ficus aridæ seu passæ. Calefaciunt in fine primi gradus, tenuium partiū. Digerunt, tenuant, coquunt.

Renibus, Vesicæ, Suspiriosis, Hydropicis & Comitialibus aptissimæ. Thoracem expurgant. Ad Tonsillarum inflammationes gargarizantur vtiliter.

Folia Hæmorrhoides reserant, si ijs fricentur.

Ficus Indica.

Opuntia Plin. *Vulg.*

Tuneficifera Indorum *Aduers.*

Anapallus Petr. Bell.

Indianischer Feigenbaum.

Strachlichte Indianische Feigen.

Ficilibus alitur, à Laur. Scholtzio Vratislauiæ: in Hispaniola Noui Orbis spontanea est.

Flammula.

Flammula, seu Flammula Iouis Matt.

Flam-

Flammula surrecta.
Brennwurtz.
Blatterzug.
Cautica est & Cutim car-
nemq; exulcerat.

Feniculum vulgatius.

Μάραθρον Diosc. πρὸς τὸ μα-
ραίνειν ἀ marcescendo, quod,
vbi inaruit, ad plurima con-
dimenta aptissimum sit.

Feniculum Offic.

Fenchel.

Graven Fenchel sil.

In hortis & campis feri-
tur. Autumno semē maturat.

Coma ex aqua frigida po-
ta nauseam amouet & in o-
lere sumta Lac Nutricibus
auget.

Semen naturæ calidæ &
siccæ cum leui adstrictione.
Aperit, attenuat, digerit,
resoluit, Menses ducit, Lac
auget, vrinas ciēt, venenis
aduersatur, Ventriculum ro-
borat, flatu discutit, Regi-
um morbum expurgat. Pul-
moni & Iecori amicum: Ar-
theticis commodum: Puer-
peras purgat; Mulieres fri-
gidas steriles iuuat.

Radix Lienis & Hepatis
infarctus expedit, & viscera
ab obstructione liberat: Id-
circo difficulter mingenti-
bus, Calculosis prodest.

Succus instillatus Oculo-
rum aciem excitat.

Feniculum Romanum.

Feniculum dulce Aduers.

Feniculum Florentinum
Gefn.

Römischer Fenchel.

Grosser süßer Fenchel.

Semen vt planta vulgari
maius & sapore suauius.

Fœnugracum satinum.

Τύλλιν Diosc.

Βόναρον Theoph.

Fœnugracum Aduers.

Siliqua Columell.

Fenugreck.

Bockshorn.

Zeigehorn.

Drüsenkörner.

Solum amat pingue. Se-
men Augusto maturum le-
gitur. Digerit, resoluit, e-
mollit, abstergit, mitigat.
Excalescit ord. 2. & sicc. 1.

Ex aqua malsa coctum &
potum internas collectiones
emollit, vitia, doloremq; in-
ternorum membrorum fa-
nat & mitigat. Sorbitio fa-
rinæ exulcerato pectori &
tussi diuturnæ medetur.

Semen integrum coqui-
tur, cuius decocto spongiâ
imbuta fouentur oculi pru-
rientes.

M m 2

Fritilla

Fritillaria purpurea variegata.

Ab abaco siue abucelo, in quo scacorum ludus exercetur, quem fritillum dici existimant.

Meleagris Dodon. à coloris varietate.

Braun gescheckte Narcissen Lilgen.

Maio floret.

Galega.

R Vta capraria.

Onobrychis, Dracast.

Geiß Rante.

Glecken Rante.

Gleckenkraut.

Petechienkraut.

Aestate floret.

Vis illi peculiaris inest contra omnia venena & pestilentiam.

Succus & liquor stillatius febribus pestilentialibus, variolis, Morbillis, Pueris conuulsis ac comitiali morbo laborantibus commodissimè propinantur.

Flores decoctis ad eisdem vsus adduntur.

Genista Italica.

Σωγέριον, Diosc.

Genista iunceæ.

Spartium Diosc. Aduers.

Welsche Pfriemen.

Spanische Pfriemen.

Flores vomitum cient.

Gentiana maxima.

Ταντάριον, Diosc.

Gentiana maior flore luteo.

Entzian/Entzies/Sil.

Bitterwurtz.

Agrè in hortis manet.

Radix impensè amara, Menstrua mouet. Lumbricos enecat: Hepaticis, Stomachicis, qui cibum retinere non valent, subuenit. Venenatorum, maximè Serpentinum & Canis rabidi moribus auxiliatur.

Geranium moschatum.

Geranium myrrhinum.

Acus moschata, Lobel.

Wolriechender Storckenschnabel.

Biesemkraut.

Moschum redolet: facillè ex semine deciduo quotannis repullulat.

Recentibus cruentisq; vulneribus commodum & aduersus inflammationes incipientes vtile.

Geranium Creticum.

Geranium Creticum annum hæmatodes, Lob.

Gera-

Geranium acu longissi-
mum.

Eretischer Storckens-
schnabel.

Iunio in hortis floret acu
succrescente longissima.
Vulneribus medetur.

*Geranium macror-
rhizon.*

Geranium longius radi-
catum.

Geranium batrachioides
2. Lobel.

Geranium hæmatodes 2.
Clus. P.

Sanguinaria radix.

Langwurzlichter Stor-
ckenschnabel.

Flores rubei, staminibus
luteis Maio & Iunio conspi-
ciuntur. Radix rubra ad-
stringens.

Geranium Alabaodes.

Geranium Malacoides

Aduers.

Geranium 2. Maluatum,
Dodon.

Geranium 6. Mattioli.

Pappel Schnabelkraut.

Vulnera glutinat & fistu-
las sanat in potionib. sumta.

Gladiolus Italicus.

Ξίφιον, Diosc.

Gladiolus vtrinque flo-

riferus, Dodon.

Gladiolus fegetalis, Matt.

Welscher Schwertel.

Braun Schwertel.

Cum vino & thure spicula
& aculeos e corpore eximit.

Glycyrrhiza echinata.

Γλυκύριζα vera Diosc. Dod.

Liquiritia, Officin.

Regalitia, Barbaris.

Süßholz.

Süßwurz.

Vratislavia in viridario

Dn. D. Laur. Scholtz.

Glycyrrhiza vulgaris.

Glycyrrhiza communis,
Aduers.

Glycyrrhiza filiquosa, Lob.

Radix dulcis Francica.

Lackritz/sil.

Gemein Süßholz.

Augusto & Septembri
floret.

Gustu est dulcis modice
adstringens & subacris, ad-
iuncta leuiuscula quadam a-
maritudine.

Ad Tusses, Raucedines,
aliosque Thoracis morbos,
Vesicæ & Renum dolores
vtilis.

Acrimoniam & falsugi-
nem humorum temperat.

Gramen nodosum.

Mm 3

Gramen

Gramen bulbosum nodosum, *Aduers.*

Agrostis 2. seu nodosum

Gramen, *Dod.*

Knopffgras.

Knodengras.

Radices bulbosæ dulces, Canario medicato viribus pares. Ex vino potæ Stranguriosis succurrunt.

Gramen pictum.

Gramen sulcatum vel striatum album, *Aduers.*

Gramen Turcicum.

Gramen variegatum.

Spanisch Gras.

Margen Gras/*Sil.*

Welsch Gras.

Voluptatis causa passim in hortis alitur.

Radiculis longè lateq; reptantibus citissimè magna spacia occupat.

Hedysarum maius.

H Δύσπερον, *Diosc.*
Πελανθίνος.

Hedysarum purpureum maius, *Tabern.*

Securidaca maior, *Aduers.*

Linsenfrant.

Grosse Peltchen.

Purpurbraun Peltchen.

Semen amarum & subacribum est. Confert Ictericis, Lienosis, Urinas &

Menstrua trahit.

Hedysarum maius luteum.

Hedysarum maius Creticum.

Geele Peltchen.

Aestate floret.

Hedysarum minus.

Securidaca minor, *Aduers.*

Hedysarum 2. *Dod.*

Astragalus, *Monspel.*

Kleine Peltchen.

Geele Steinwicken.

Helleborus albus floribus atrorubentibus praecox Lobel.

Helleborus albus femina, Veratrum album floribus nigricantibus, *Dod.*

Weisse Thieswurtz mit schwarz roten blumen.

In syluis æditiorebus Hungariae sponte crescit, apud nos hortensis est.

Helleborus niger Stiriacensis.

Elleborus Stiriacus.

Veratrum nigrum Stiriacum, *Tabern.*

Steirische Christwurtz.

Præfertur vulgari in medicamentis. Eiusdem facultatis.

Helleborus niger verus.

Emm.

^{*Emélgens mélas.}

Helleborus niger, *Aduers.*

Elleborum nigrum legitimum flore albo, *Clus.P.*

Elleborus niger, *Officin.*

Veratrum nigrum, *Dod.*

Schwartzes Nieswurtz.

Garten Christwurtz.

Colligitur astate Messis tempore, semine maturo flaccescunt folia.

A vulgari parum differt, nisi quod folia eius latiora, flores albidiores sint.

Gustu est acris feruensq; adiuncta amaritudine.

Ventrem purgat tam per vomitum quam per secesum, vtramq; bilem ac pituitam detrahens.

Morbis penè inuidis, non modò Melancholicis, sed etiam merè pituitosis & sanguineis eximiū præsidium.

Scabiem illitus sanat, vitilignes, Lepras, Impetigines, ex aceto.

Helleborastrum minus.

Helleborus niger adulterrinus sylvestris.

Veratrum nigrum 3. *Dod.*

Sesamoides magnū, *Cord.*

Consiligo, *Ruell.*

Wilde Christwurtz.

Leusekraut.

Schlängenwurtz.

Commendatur ad pecorum Pulmoniam pestilentiamq; arcendam.

Lentes & pediculos interficit.

Helleborastrum magnum.

Helleborastrum maximū, *Tabern.*

Helleboraster maximus, *Lobel.*

Gros Leusekraut.

Hemerocallis rubra.

^{*Hæmeryallis, Diosc.} quod flos interdiu pulchritudinē suam tueatur, nocte appetente languidus flaccescat.

Hemerocallis flore rubello, *Lobel.*

Hemerocallis seu Lilium sylvestre, *Aduers.*

Lilium coronarium.

Heidnische Lilgen.

Rote Goldlilgen.

Elegantia sua exornat viridaria.

Hemerocallis miniata.

Hemerocallis Byzantina

2. *Lob.*

Lilium rubens seu miniatum Chalcedonicum.

Türkische Goldwurtz.

In horto Laur. Scholtzj.

Hesperis alba.

^{*Eort-}

Hesperis, Plin.
Hesperis 1. Clus.
Viola matronalis seu Da-
mascena, Aduers.

Weisse Veilichen/ Sil.

Winter Violen.

Damascenische Neglin.

Ad ferta excolitur, altero
demum à satione anno flos-
culos promens.

Thlaspi aut Rapuntium
tota sapit.

Hesperis purpurea.

Viola hyemalis flore pur-
pureo, Tabern.

Hesperis 2. Clus.

Leibfarben Winter Violen.

Braune Pfingst Negelin.

Hesperis viridi flore.

Viola matronalis flore vi-
rescente.

Grüne Winter Violen.

Iunio & Iulio floret.

Hordeum maius.

Kerdn, Diosc.

Hordeum hyemale seu
hybernum.

Winter Gerste.

Grosse Gerste.

*Hordeum polystichum a-
stinum Tabern.*

Hordeum trimestre po-
lystichum.

Grosse Sommer Gerste.
Vielzenthichte Sommer-
Gerste.

*Hordeum astinum di-
stichon.*

Δίστιχον.

Hordeum trimestre min⁹.

Hordeum Galaticum, Colum.

Kleine Gerste.

Futter Gerste.

Zwozenthichte Gerste.

Hordeum agrum deside-
rat pinguißimum & probè
stercoratum. Seritur Autum-
no, frequentius Aprili.

Refrigerat & siccatur i. or-
dine, nonnihil abstergit, vri-
nas ciet, inflationes parit.

Hordeum mundum.

Πυρελόν, καὶ τὸ πλυνν.

Hordeum mundatum,

Aduers.

Hordeum deglubutum,
Mattiol.

Gersten graupe.

Eduium est in acutis mor-
bis, febribus, dysenteria, cho-
lera, alijs omnibus frumen-
taceis præferendum.

Ab Agricolis etiam ex
Lacte coquitur, cibo haud
ingratus.

Hordei farina.

Gersten Mehl.

In a-

In aqua mulsâ cum Ficu decocta. Inflammationes & Oedemata discutit, durities cum pice, resina & fimo columbino concoquitur. Cum pyris syluestribus, Cydonijs aut Rubo, alui pfluuia sistit.

Maltum hordeaceum.

Σύν, Αἰτῆ.

Gersten Maltz.

Refrigerat remissius; exiecat, calefacit, potentius abstergit.

Ventris torminibus alijsque similib. ex frigida causa doloribus succurrit totum feruensque in sacculo appositum.

Cereuisia hordeacea.

Οἶνος κριθίνος.

Gersten Bier.

Bitter Bier.

Potus Silesijs frequens, ex aqua, Malto & Lupuli floribus decoquitur.

Si Martio coquatur, per integrum annum durat.

Præfertur Suidnicensis, Goldbergensis, Lehnensis, Gryphibergensis.

Egregiè nutrit, minustamen quàm Triticea, Valentudinem, firmitatem, colorem & proceritatem ceteraque ad bonum corporis ha-

bitum pertinentia procreat.

Cum oleo dulci & butyro largo haustu calidè pota, constipatos laxat, vrinam benigniter omnibus, imò etià calculosis mouet. Cum Pipere, Macis, Zingib. cruditates curat.

Dolentes ex pedibus manibusue, vel ex violento motu, vel alijs causis foti dolores sanat, maximè si recens fuerit.

Horminum satium I.

Ὁρμινον Diosc.

Horminum Lob. Dod.

Horminum. verius.

Garten Scharlach.

Römischer Scharlach.

Semen cum vino potum Venerem stimulare fertur.

Horminum satium II.

Salvia Turcica seu transmarina Ruell.

Horminum maius seu odoratum Mattiol.

Scarlea Aduers.

Sclarea Mattiol.

Gallitricum Officin.

Türkische oder Römische Salbey.

Scharlach / Scharley.

Iunio & Iulio floret, maturo semine interit. Grauis est odoris.

Nn

Exca-

Excalefacit, attenuat, discutit, aperit, resoluit, venenis resistit.

Medetur Epilepsiæ & suffocationi Matricis, Menses & Secundas ducit. Venerem ciet. Pulvis naribus attractus sternutamenta ciet, Catarrhum tollit & Cerebrum purgat.

Semen Oculis immissum sordibus purgatis spontè faciliè excidit & vilum clarificat.

Quidam plebeij ad zythi hordeacei confectionem addunt, Lupuli penuriam expientes & potionem vegetiorem reddentes.

Hippoglossum.

Ἱππόγλωσσον, Clus. P.

Vuularia Tabern.

Laurus Alexandrina Fuch.

Äpffentraut.

Äpfflintraut.

Zungenblat.

Hauchblat.

In hortis viret ex collibus Pannoniæ Danubianæ alatum.

Gustu subamarum & acre, calidum & siccum. Vfus communis in Angina, Vuæ procidentia & faucium vlceribus.

Radix cum vino dulci par-

tum difficilè facilem reddit.

Hyacinthus I.

Hyacinthus germanicus Liliflorus Lob.

Hyacinthus mas minor cœruleus Fuch.

Hyacinthus stellaris Cl. P.

Bulbus syluestris Lugdun.

Blaw Mergzenblümle.

Blaw gestirnter Hyacinth.

Aprili floret.

Hyacinthus II.

Hyacinthus stellaris albo flore.

Hyacinthus albicans serotinus Lobel.

Narcissus candidus Trag.

Weis gestirnter Hyacinth.

Hyacinthus III.

Hyacinthus orientalis græcus Lobel.

Hyacinthus orientalis cœruleus i. Tabern.

Blaw frembder Constantinopolitanischer Hyacinth.

Hyacinthus IV.

Hyacinthus orientalis albo flore.

Weisser frembder Hyacinth.

Rarior est & nisi instructioribus hortis notus. Maio floret.

Hyacin-

Hyacinthus V.

Hyacinthus orientalis
maior *Dod.*

Hyacinthus maior poly-
anthos *Lobel.*

Scimder Hyacinth mit vie-
len blumen.

Hyacinthus VI.

Ἰακίνθος *Diosc.*

Hyacinthus *Diosc.* como-
sus maior *Aduers.*

Hyacinthus racemosus
maior, C. B.

Hyacinth⁹ obsoleto flore.

Grosser Hyacinth.

Breunling.

Maio floret, Iulio semen
maturum.

Hyacinthus VII.

Hyacinthus botryoides
vulgaris *Lobel.*

Hyacinthus Neoterico-
rum i. *Dodon.*

Hyacinthus comosus mi-
nor *Dalech.*

Bulbine *Plin. Gesn.*

Getreubelter Hyacinth.

Blaw treubleter Nertzen-
blume.

Pruni odorem spirat.

Hyacinthus VIII.

Hyacinthus botryoides
caeruleus amoenus *Lob.*

Hyacinthus botryoides
caeruleus i. seu maior *Clus. P.*

Violbraun trauben Hy-
acinth.

Albo flore etiam in horto
D. Laur. Scholtzij obseruau.

Hyacinthus IX.

Hyacinthus Chalcedoni-
cus muscatus.

Bulbus vomitorius *Mattiol.*

Muscari Turcarum.

Frembd trauben Hyacinth.

Hyacinthus X.

Hyacinthus Chalcedoni-
us luteus *Tabern.*

Dipcadi flavum seu Mus-
cari Constantinopolitanum.

Geel Muscat Hyacinth.

Hyacinthus XI.

Hyacinthus botryoides
lacteus *Tabern.*

Tipcadi albis floribus *Lob.*

Weis trauben Hyacinth.

Maio floret.

Hyoscyamus albus.

Ἰοσκάμος λευκός *Diosc.*

Hyoscyamus candid⁹ *Dod.*

Iusquiamus *Officin.*

Altercum *Arabib.*

Weis Bilsen.

Weis Bilsenfraut.

Mitior & tutior multò est
nigro.

N n 2

Aduer-

Aduersus omnes calidas defluxiones Oculorum aliarumq; partium inflammationes adhibetur.

Semen additur commodissime medicamentis, quæ dolorum sensum auferunt, contra acutas calidasq; fluxiones, Aurium dolores atq; vuluæ mala.

Hyssopus vulgaris.

ῥοσππος Diosc. ἡ δὲ τῆς γενέσεως πλὴν à madefaciendo faciem.

Hyssopus Arabum Mef. & Offic. Aduers.

Hyssopus hortensis Fuchf.

Eisop / Isop.

Eisewig Sil.

Nota vulgo planta. Locum postulat apricum, non admodum pinguem & stercoreatum. Semine & furculo plantatur.

Iulio & Augusto floret.

Amara est, odorata & tenuium partium. Pituitam facile deiicit, nec non bilem atrum addito sale Gemmæ.

Facit ad pituitosos, tum Cerebri, tum neruorum affectus. Capitis enim pituitam expurgat. Pectus & Pulmones detergit, vnde Tussientibus, Asthmaticis: Peripneumonicis auxiliatur.

Additur Infusibus, Bal-

neis, fomentis, Clysteribus ad Colicam & Vteri affectus præscriptis.

Hyssopus rubro flore.

Hyssopus Arabum flore rubro Lobel.

Eisop mit roten blumen.

Hyssopus albis floribus.

Eisop mit weissen blumen.

Iulio in meo hortulo flores ostendit.

Iasminum album.

Gelsemium vulgatus Lobel.

Iasme albis floribus.

Iasmina viola alba.

Weisse VeilKeben.

Facile nascitur & ramulis in terram depressis & obrutis breui multiplicatur; attamen Hyemis impatiens.

Ab ætate in Autumni finem vsq; niueos flores odoris suauissimi promit, qui excalefaciunt & siccant ordine 2.

Pituitæ lentitiam senibus frigidis digerunt, Cruciatisq; ex eadem causa prouenientibus mirè prosunt.

Lentigines & Impetigines in facie abstergunt.

Iasminum luteum.

Iasme

Iasme luteis floribus.

VeilReben mit geelen blumen.

Iulio floret in viretis.

Frigus facilius fert.

Intubus maior.

Σέκς ἰνύκος Gal.

Σέκς ἡυγος Diosc.

Σέκς πάλυφος.

Intybum, Indiuum-

Intubum satium latifolium.

Seris seu Intybum satium latifolium Lobel.

Endiuia maior Officin.

Gros Endiuien.

Antisien.

Winter Salade.

Ex semine nascitur, hyeme perit.

Herba, radix, semen Hepatis calidioribus affectibus vtilissima; Oscula venarum eius extergit, obstructions aufert, Stomacho conuenientissima: mediocriter somnum inducit, Veneris appetentiam extinguit & semen genitale minuit.

Febres ex flaua bile ortas plurimum iuuat. Iulio factus in hyemen restat, & in subterraneum locum repositus Niuis instar candidus redditur, amaritie amissa ad acetariorum vsum. Vulgo

Alba Endiuia Winter Salade.

Intubus minor.

Σέκς σερύφος.

Intybum angustifolium.

Seriola aut Endiuiola

Aduers.

Blein Endiuien.

Garten Scariol.

Eiusdem facultatis, nec diuersa figura propter folia angustiora.

Intubus crispa.

Endiuia crispa.

Brause Endiuien.

Folia ampliora, rugosa, in plicas contracta, crispantia.

In hortis cultioribus.

Iris nostras.

Iris nostra vulgaris Lob.

Iris domestica flore caeruleo.

Blaw Lilgen.

Veilwurtz.

Schwertelwurtz sil.

In hortis nota locis opacis & vmbrosis variat saepe colore.

Acris est radix & amara. Pituitam & serofos ducit humores.

Succus cum spica & Syr. e Cich. c. Rhabarb. Hydropicis pro-

Nn 3

cis pro-

cis propinatur, aquas mirum
in modum per alium tra-
hens. Verum ventriculo ne-
gotium facessit.

Iris Florentina.

Iris Illyrica Cord.
Iris Diosc. Gauland.
Iris Theoph.
Iris femina Gesn.
Iris odorata.
Iris caerulea.
Violkwurtz.

Veilckewurtz.
Florentiner Veilwurtz.

In viridarijs Maio floret.

Forma à vulgari parum
differt, præterquam quod
radix solidior, candidior, &
odoratior.

Sarcotica est, acris, amara,
odorata.

Excalesc. 2. & siccat ord. 3.
incidit, abstergit, aperit, tra-
hit, concoquit, deijcit, mol-
lit, resoluit, expurgat.

Decoct. obstructions a-
perit. Renum calculos eij-
cit, Ictericos, & Hydropicos
iuuat.

Contra tussim efficax.

Manfa oris halitum com-
mendat. Dentium dolores
mulcet: Hamorrhoides fotu
elicit.

Iris Dalmatica maior.

Iris Asiatica caerulea Cl. P.
Dalmatisch Veilwurtz mit
gantz blauen blumen.

In horto meo Iunio floret.

*Iris obsoleti caerulei coloris
polyflora.*

Bleichblaw Veilwurtz mit
viel blumen.

Maio & Iunio floret.

Iris lutea.

Iris sativa floribus aureis
Mattiol.

Veilwurtz mit gelben blus-
men.

Iris lutea oris rubellis.

Geel Veilwurtz mit ges-
checkren blumen.

Geel Schwertel mit roten
ränden.

Iris Biflora B.

Iris vere & Autumno flor-
rens C. B.

Veilwurtz die zwier blühet.
In horto D. Laur. Scholtzij.

Iris pumila angustifolia.

Xapavicus Dod.

Chamae-Iris vel *Iris hu-*
milis Matt.

Iris angustifolia minor
Clus. P.

Klein schmalblettricht Him-
melschwertel.

Flos

Flos Maio apparet.
Radix vehementer calida
& feruens.

Iris pumila latifolia.

Iris agria munda malis quibus.

Chama-Iris latifolia.

Iris minor latifolia.

Klein breitblettericht Him-
melschwertel.

Maio floret & Iunio.

Excalefacit & extenuat.

Iris sylvestris angustifolia.

Iris sylvestris Byzantina
peramcena Lobel.

Klein niedrig Himmel-
schwertel.

Caulis vix dodrantalis
florem peramcenum gerit
Maio.

Iris sylvestris fatida.

Iris Diof.

Iris agria Theoph.

Iris agria.

Xyris et Iris agria Theoph.
Lobel.

Spatula foetida Dod.

Pedicularis.

Welsch Schwertel.

Leuseförner.

Wandlensfrau.

Stephansförner.

Iulio & Augusto flores dat
caeruleos, stellatos.

Tenuium est partium, A-
cris & foetida.

Calefacit, siccat, attrahit,
digerit, valenter abstergit.

Radix trita & illita ex oleo
phthiriasi prodest, Prurigini,
psoris, mala Scabiei, Papulis
& Serpiginibus. Lentès &
Pediculos enecat.

Aculeos & Spicula ex-
trahit.

Succus lecto illitus Cimi-
ces abigit.

Semen & rad. Mures in-
terficat.

Isatis sativa.

Glastrum satium Lobel.

S. Philippi herba.

Iovis naves Diof.

Weid.

Valenter exiccat, non-
dum tamen mordet: Est quo-
que simul amara atque ad-
stringens. Folia illita omnia
Oedemata & tubercula dif-
cutiunt, cruenta vulnera
glutinant.

Lactuca lata.

Iridis naves Diof.

Lactuca sat. Scariola fo-
lio Lobel.

Lactuce.

Salat sil.

Lattich.

Schmalz

Schmalzfrant.

Toto anno feritur ad vsum acetariorum, Olitoribus nota.

Humidum & frigidum est olus. Amaricat tamen non-nihil: ideo abstergendi facultate non vacat.

Aestuante ventriculum refrigerat, à bile infestatum iuuat, sitim arcet, somnum conciliat, aluum emollit, Lac euocat mulieribus calidis & siccioribus.

Succum gignit humidum & frigidum, non tamen vitiosum.

Verum frequens eius esus frigido ventriculo & oculis nocet.

Succus illitus capitis dolores ab æstu febricitantibus mulcet, genitalibus nocturnas pollutiones & seminis profluuium compescit.

Semen ardoribus vrinae opitulatur & asiduis libidinum in somno imaginationibus.

Lactuca crispa.

Lactuca crispa non capitata, *Lobel.*

Lactuca Cœciliana, *Colum. Krauser Lattich.*

Tota tenerior & olere gratior habetur. Olitori-

bus diligentioribus cognita.

Lactuca Iniybacea.

Lactuca Romana.

Endiuien Lattich.

Roman Salat.

A vulgari distat folio nigriore nec perinde scabro, semine nigro.

Tota tenella gustu dulcior, eaq; gratior, aptior ventri mouendo.

Lactuca capitata.

Lactuca sat. sessilis, seu capitata, *Lobel.*

Lactuca sessilis, *Plin.*

Lactuca satina maior.

Böppfel Lattich.

Weisser Lattich.

Bropff Salat.

Rarior hæc & nisi instructioribus nobiliumque hortis nota.

Primæ in acetarijs commendationis.

Lactuca fusca.

Lactuca purpurei coloris.

Lactuca nigra, *Casalp.*

Schwartzter Salade.

Florentiner Salat/ *Hortul.*

Nonn.

Minus palato sapit, vt prior.

Lactuca syluest. Herb.

Lactuca sylu. costa spinosa, *C.B.*

la, C.B. Seris domestica 2.
Aduers.

Seriola Italica, ob spinulas
acutas ferræ modo.

Scariola Officin.

Σελδαξ ἀγρία, Diosc.

Wilder Lattich.

Wilder Saladr.

Scariol.

Flores, semen & tota fa-
cies Lactuæ, valde amara
est, & cum humido sit paulò
tenuiore, & minus excre-
mentoso, melius referat &
abstergit.

Menses trahit. Ad Ieci-
noris inflammationes, &
morbum regium commo-
dè vsurpatur, calorem liqui-
dem temperat, & meatus
expurgandos aperit.

Semen in officinis passim
pro Scariolæ semine prostat.

Lagopus sanguineus.

Lagopus coma sanguinea.

Koter Blutflee.

Adstrictoria est faculta-
tis. Ad sanguinis profluvia
immodica, & Dysenteriam
utilis.

Lapathum domesticum.

Hippolapathum s. Rha-
Monachor. Dod.

Lapathum hortense.

Rhabarbarum Monachor.

Franciscanorum.

Patientia, Nonn.

Ἰαπολάπαθον, Diosc.

Münch Rhabarbara.

Rhabarbaren wurtz/Sil.

Frequenter in hortis seri-
tur, & sponte semine se pro-
pagat.

Radix lutea est, amara
gustu, & facultate deiectionis,
Rhabarbarum imitatur.

Vfus haud contemnendi.

Aperit, prouocat, digerit,
mundat, abstergit, nonnihil
adstringit.

Bilem flauam, & serosos
humores educit, proinde
Ictero, febribus biliosis &
scabie affectis utilissima.

Folia tenera in oleribus
eduntur ad emolliendam
aluum.

*Lapathum domest. ro-
tundifolium.*

Lapathum rotundum, A-
liquibus Rhabarbarum, Gesn.

Hippolapathum rotundi-
folium.

Pseudo-Ra Recentiorum,
Lobel.

Falsch Rhabarbaren mit
ronden blettern.

Lapathum sanguineum.

Ἐρυθρολάπαθον.

Lapathum rubens seu ni-
grum,

O o

grum, *Dodon.*

Sanguis Draconis.

Drachen Blut.

Blutfrant.

Addictoria vi pollet. Additur Clysteribus in Dysenteria.

Semen menses immodicè fluentes cohibet.

Lathyrus.

Advers., *Diosc.*

Cataputia minor, *Officin.*

Treibkörner.

Springfrant / *Sil.*

Flores aestate pusillos & semen Augusto & Septembri ædit.

Semen calidæ est & siccæ naturæ, extenuat, menstrua & urinam ciet.

Grana 7. aut 8. deuorata aluum purgant, Bilem, pituitam, & mixtos humores trahunt, vomitum prouocant. Paganorum, qui Philtra aut alia veneficia deuorant, medicina: verum Ventriculum valde lædit & corpus debilitat.

Lauandula maior.

Lauandula, *Dod.*

Pseudonardus, *Lobel.*

Nardus Italica, *Mattiol.*

Spica alba, *Tabern.*

Garten Spick.

Spicanard.

Iunio & Iulio flores exeunt.

Calef. sicc. ord. 2. Aperit, attenuat, resoluit, concoquit. Tenuum est partium, ex multis aëreis, spirituosis partibus constans.

Valet contra Vertiginem capitis, Spasmodum, veterum, tremorem, stuporem & resolutionem Artuum.

Flores ex vino ventriculorum roborant, Ictericis ex Iecoris infarctu auxiliantur. Stranguriæ & difficultati urinæ prosunt: Vterum calefaciunt, Menses & secundas educunt.

Lauandula minor.

Lauandula femina.

Spica lauandula, *Lob.*

Pseudonardus f. *Lauandula*, *Matt.*

Lauendel.

Lafander.

Flores Cardiacæ medentur, flatus discutunt, affectibus Matricis ad suffocationem & ascensum ex vaporibus putridis cum potu tum infessu auxiliantur.

Laurus.

Δάφνη, *Diosc.*

Lorberbaum.

Lorbaum.

In va-

In vasculis asseruatur, sed raro fructum fert.

Folia in Balneis aut infusu vteri ac vesicæ vitij conueniunt.

Baccæ calefac. & siccant vehementer, emolliunt, digerunt, subtiliant, ventriculum frigidum calefaciunt, concoctionem iuuant, crassum phlegma extenuant & Colicæ medentur.

Lens.

Λένος, Dioscor.

Linsen.

Calidiore solo & sudo siccoq; cœlo proferi gaudet.

In caliditate & humiditate medium tenet, desiccatur tamen ord. 2. valenter quoque adstringit, ventrē sistit.

Decoctum verò prouocat, inflat, lenit, glutinat, extinguit, purgat, discutit.

Lepidium Pauli.

Ἀν λεπίδιον, Diosc.

Lepidium maius, Cord.

Raphanus sylu. Offic. Nonn.

Zingwer fraut.

Senffraut.

Pfefferfraut.

Römische fresse.

Rosfresse.

Vere folia erumpunt. Iunio & Iulio floret.

Calef. & siccant vehementer, cutem exulcerat & vesiculas excitat, vtpote feruida & acuta gustu.

Vfus eius in acetarijs.

Leucoium luteum.

Viola lutea petraea, Tab.

Leucoium aureum, Matt.

Keyri, Officin.

Λευκίον, ἰκκίον, Diosc.

Gele Veilichen.

Gelbe Niesel Veilen.

Passim in hortis & fistilibus vulgatissimæ cognitionis. Aprili, Maio & Autumno floret.

Flores amari sunt, calidi, & sicci. Aperiant, extenuant, menstrua & vrinam cient.

Ex vino Ictericos iuuant vitij Hepatis & Renum apprimè viles.

Aqua maculas faciei delet.

Leucoium luteum duplici flore.

Keyri duplicato flore.

Viola muraria multiplex.

Doppel geel Veilen.

Gefülte geel Veilen.

Rarius occurrit.

Leucoium album.

Leucoium candidum maius, Dodon.

Viola candida, Trag.

O o 2

Weiss

Weisse Viole.

Welsch weisse Veilichen.

Voluptatis potius quam
utilitatis causa seritur. Ex-
tergendi facultate donatur,
actenuium partium.

Succus purgat oculos &
maculas discutit.

Leucoium rubrum.

Leucoium purpureū, *Matt.*

Viola purpurea, *Trag.*

Rote veilichen.

Leibfarbene Violaten.

Leucoium violaceum.

Leucoium purpuro-cœ-
ruleum.

Veilbraun Veilichen.

Welsche Veilichen.

Leucoium cinereum.

Viola cinerei coloris.

Aschfarb Veilen.

Welsch Violaten.

Leuisticum.

Ligusticum, *Trag.* à Ligu-
riæ montibus, in quibus na-
scitur.

Σίλφιον, *Theoph.*

λίγυστικον, *Dioscor.*

Leuisticum seu Laspitiū
germanicum, *Aduers.*

Hipposelinum *Diosc. vulgo*
Leuisticum *Matt.*

Liebstöckel.

Badefraut.

Nullum solum respuit; a-
mat tamē vmbrosum magis.

Radix pulu. & instar con-
dimenti in cibo sumta, ven-
triculo frigido utilis, conco-
ctionem iuuat, omnesq; su-
perfluas humiditates exic-
cat, doloresq; internos soluit.

Semen & Radix puerpe-
ras optimè purgant.

Ex vino pota, venena ex-
pellunt, vrinas & menstrua
eliciunt.

Folia in Balneis sudores
mouent, cutis sceditates tol-
lunt & menstrua prouocant.

Tussi pecorum medetur
herba recens, pabulo com-
mixta.

Libanotis cachryfera.

Λιβανotis, 2. *Diosc. & Gal.*
παρα τὸ ὄζειν λιβανος, quia thus
redolet.

Λιβανotis καρυοφάγε.

Libanotis 3. *Dodon.*

Cachrys verior Libanotis
Gal. Lob.

Rosmarinum ferulaceum.

Rosmarinfraut.

Weirauchefraut.

Ex semine, sed difficilè
nascitur.

Radix odorata est, thus
redolens, calefacit & siccatur.

Ligustrum.

Κύσπος.

Kl. m. Diof. Lobel.

Phyllirea, Dodon.

Cyprus, Mattiöl.

Beinhölzlin.

Schulweiden.

Reinweiden.

Berngerren.

Geißholz.

Folia mista sunt temperata, commanducata oris ulceribus, & puerorum aphthis medentur.

Acini contra Phthiriasin & gallinarum pituitam profunt.

Aqua florum inflammationibus utilis.

Lilium album.

Lilium candidum, Aduers.

Rosa Iunonis.

Κεῖνον καὶ λεῖον, Diof.

Weisse Lilgen oder Gilgen.

Solum desiderat pingue non omnino apricum.

Iulio flores niueos elegantes explicat, Augusto folia exeunt, tota hyeme virentia.

Vniuersa planta mucagineo turget succo. Radix foliaq; desiccant, abstergunt & digerunt moderatè.

Radix inassata & ex Rosac. trita igni ambusta sanat, vuluam emollit, Menses ciet, ulcera cicatrice obducit.

Folia recentia ignibus sacris, ambustis & alijs pustulis opitulantur.

In puerperis papillarum fissuras sanant recenter imposita.

Flores mista sunt facultatis. Constant enim partim ex tenui, partim ex terrena essentia, partim ex aquea, eaq; temperata. Lien, ruptis & conuulsis profunt.

Croceis flaminibus cum saccharo & aqua Cinam. Mulierculæ delicatæ ad partum accelerandum vtuntur.

Succus folior. Melle & aceto mixtus in aëneo vase coctus, veteribus & recentibus ulceribus vtile est medicamentum.

Lilium rubens.

Κεῖνον ἐρυθρόν.

Lilium cruentum sec. can. lem bulbulis donatum Clus.

Lilium-rubens seu croceum.

Martagon Chymistarum.

Goldgilgen.

Goldgelbe Lilgen.

Rote Lilgen.

Foret paulo ante candidum Lilium.

Emollit & maturat abscessus.

00 3

Lili-

*Lilium rubens summo alis
diviso caule.*

Lilium cruentum polyanthes.

Goldgilgen mit vielen blumen.

Lilium miniatum.

Hesperisyllis, ab vnus diei pulchritudine.

Lilium aureum.

Heimerocallis Diosc.

Pomerantzfarbe Lilgen.

In viridario Dom. Laur. Scholtzj.

Lilium Persicum luteum.

Lilium f. Corona imperialis flore luteo.

Lilium Persicum 1. seu Tufai Clus. P.

Corona Imperialis Dod. F.

Bönigslilien.

Bönigsefron.

Radix crocea grauem odorem vibrat. Flos Maio exhilarat, nouus & veteribus incognitus.

Lilium Persicum rubrum.

Tufai f. *Lilium Persicum* 2. Clus. P.

Röthichte Bönigslilien.

Nunc in hortis nostris coli inceptit.

Lilium non bulbosum luteum.

Liliasphodelus Clus. P.

Liliasphodelus luteus liliiflorus Lob.

Liliago vel *Liliastrum*.

Asphodelus luteus Liliiflorus Aduers.

Geel Lilien.

Geel Affodill lilien.

In hortis elegantiae causa.

Lilium non bulbosum phoenicium.

Lilium non bulbosum purpur. Dod.

Liliasphodelus phoenicius Lob.

Asphodelus Liliaceus rubens 2. Tab.

Lilium Ephemerum.

Braunlilgen.

Feuerlilgen.

Sterbende Lilgen Sil.

Rot Affodill lilien.

Flos matutino tempore dehiscens obsoletè rubeus, vesperi dein mox marcescit & perit.

Linaria Beluidere.

Linaria Italica.

Orveis Græc. Dod.

Aëveis Anguill.

Scoparia Aduers.

Scopæ Paduanæ.

Welsch

Welsch Harnfraut,
Studentenfraut.

Exotica est, & in hortis ac
stilibus ætate viret, &
viget.

Amara est & obstructio-
nes expedit.

Abstergit scabiem & Cu-
tis sordes, quibus studiosi
frequenter infestantur ob a-
ëris & vitii mutationem.

Linaria lutea Austriaca
minutissimis flosculis.

Linaria peculiaris lutea
Aichholij.

Linum sylu. Pannonicum
3. Tabern.

Ungrisch Harnfraut.

Harnfraut mit geelen blu-
men.

Ætate flosculi emicant
aurei.

Linaria cœrulea.

Osyris purpurocœrulea
repens Lob.

Linaria Pannonica 2.
Clas. P.

Linaria minor Dalech.

Blaw Harnfraut.

Blaw flachsfrant.

Linum sativum.

Linum germanicum Tr.

Αἶνον Diosc.

flachs.

Lein.

Duplex hoc. *Aliud Sativum*
domesticum.

Auslauffender flachs.

Leuffer flachs. *Aliud*

Sativum fluestre, Wilder
flachs/ Drescher flachs/ aus
welchem der Same nicht
leisset.

Huius generis est linum,
cuius semen ex Belgio affer-
tur, vulgò Seeflachs.

Duplo maius est vulgari.

Seritur in campis Solo
probè attrito Maio, Iunio,
Iulio floret, vbi maturitatem
adeptum fuerit, euellitur ad
Telarum vsum: vnde mag-
num commodum & lucrum
Incolis cedit.

Semen excalescat. i. ord.
in siccitate & humiditate
quodammodo medium. E-
mollit, resoluit, concoquit,
abstergit, maturat.

Esu flatulentum est, vt-
pote excrementitiâ humidi-
tate plenum. Stomacho &
concoctioni repugnat, te-
nuiter Corpus alit.

Farina cum melle delin-
cta Pectoris vitia extrahit,
tussim lenit, & lateris dolo-
res mitigat.

Vtile in defectionibus ad
vulvæ inflammationem &
interaneorum erosionem.

Fotu

Fotu Pleuriticos, Nephriticos & Dysentericos iuuat.

Oleo expressio vulgus loco butyri tempore. Quadragesimali vitur incibis.

Cochlear vnum per se, vel in brodio haustum, remedium in Colica efficax plebeium.

Aqua florum exhibetur ad variolarum & morbillorum expulsionem.

Lithospermon maximum.

Lithospermon arundinaceum *Lugdun.*

Lithospermon Plinianum maius *Aduers.*

Arundo Lithospermos *Gesn.*
Lachryma Hiobi seu Christi *Dod.*

Grosser Steinhirse.

Candischer Steinhirse.

Ad calculum commendatur semen.

Lotus odorata.

Lotus hortorum odora, *Lob.*

Trifolium odoratum 2. *Dodon.*

Lotus sylu. *Angul.*

Tei quoniam reprobior.

an xillos huius *Diosc.*

Siebengezeit.

Nardes *Sil.*

Stundfraus.

Wolriechender Blee.

Floret Iulio & Augusto: solum amat mediocre. Calefacit; digerit leuiter, & nonnihil abstergit. Summitates ex vino pleuresi, stranguriae medentur & urinas prouocant.

Reponitur arida vestimentis, ne à tineis arrodantur.

Septies in die odorem mutare vulgus credit, quamdiu in hortis creuerit, decerpum autem perpetuo retinere, sed imminente tempestate pluuiosa vehementioris esse.

Lotus tetragonolobus flore ruberrimo.

Trifolium siliquosum rubrum.

Sandalida Cretica *Italio.*

Koter Samerklee.

Bis floret, Iunio & Autumno.

Lunaria graca Recent.

Lunaria rotunda *Gesner.*

Viola latifolia *Dod.*

Bulbonac *Aduers.*

Nonveil.

Silberblumen.

Glitterp.

Mai & Iunio floret.

Calido, acri & amaro est gustu, praesertim semen.

Tritum

Tritum cum aq. appropriatis exhibetur Epilepticis.

Lunaria aspera.

Λ'πίδιον.

Λ'λυσον Diosc. ab ἀλλογεν quia aduersus rabiem canum defendit, seu, quod singultus sedet ac tollat.

Septembri folliculos ostentat, flosculis luteis percurrentibus.

Pota singultus sine febre discutit: idem efficere creditur, si quis eam teneat aut odoretur.

Domibus appensa salutaris censetur & hominibus & animalibus fascini amuletum superstitiosum.

Lupinus satiuus albus.

Θέριον λευκόν Diosc.

Lupinus sat. Advers.

Faba lupina.

Weisse Feigbonen.

Wolffsbonen.

Insigniter amarus est, medijs saporis inter Cicer & Absinthium. Excal. sic. abstergit, aperit, digerit, resoluit.

Decoct. seminis Iecur & lienem expurgat. Lumbricos interficit.

In aq. pluuiali dec. donec in cremorem lentescat, faci-

em abstergit, scabiem & liuores tollit.

Cum aceto Strumas & tubercula dissipat, ac carbunculos rumpit.

Lupinus luteus.

Θέριον κίτρινον Diosc.

Lupinus Hispanicus Matt.

Lupinus luteo flore Advers.

Lupinus sylu. luteus Dod.

Spanische gelbe Veilaten

Sil.

Studenten Veilichen.

Gelbe Feigbonen.

Odoris & coronarum gratia feritur.

Semen aduersus viperæ morsum valet.

Lupinus flore cœruleo.

Lupinus Hispanicus flore cœruleo.

Blau Feigbonen.

Flores ei sunt eleganter cœrulei.

Lupulus mas.

Ρέζον, Βρυωνία.

Lupus salictarius sat. Lob.

Humulus.

Hopffe.

In hortis & campis cultu latior euadit maioribus capitulis & semine copiosiore.

Capitula Augusto & Septembri colliguntur & co-

Pp

guntur

guntur in saccos ad Beræ
confectionem.

Cacumina seu surculi, qui
primum è terra Aprilii erum-
punt, decerpuntur grati a-
cetarijs.

Lupulus calidæ & siccæ
naturæ, Caput tentat.

Lychnis coronaria
rubra.

Lychnis coronaria Dod.

Λύχνης στεφανώματα, Diosc.

Διὰς αἰθρῶς.

Rosa mariana Tr.

Lucernula.

Iouis flos Gesn.

Veilrosen Sil.

Sammetröslin.

Rote Marienröslin.

Iunio, Iulio, & Augusto
florum exortus. Bilem per
alium trahit, vulnera recen-
tia glutinat.

Radicum succus attractus
Naribus sternutamenta ciet;
Cerebrumque efficaciter
purgat.

Lychnis coronaria albo
flore.

Lychnis candida.

Rosa Mariana sat. 2.

Weisse Veilrosen.

Weisse Margenröslin.

Lychnis alba maculis ru-
bris aspersa.

Eingesprengte Veilrosen.

Lychnis subpurpureo
flore.

Bleich rote Veilrosen.

Lychnis peregrina mi-
niata.

Lychnis Chalcedonica f.
Constantinopolitana minia-
ta Lob.

Flos Constantinopolita-
nus Dodon.

Ocymoides peregrinum
Gesn.

Πόθος Theoph.

Türkische Negelin.

Jerusalemblümlin.

Spornblumen.

Ungriſche Röslin/Sil.

Zinober Röslin.

Florum elegantia hortos
exornat, sed inodora & vñs
neglecti.

Lychnis viscosa sat.

Muscipula seu Armoraria
2. Adversf.

Sesamoides magnum Sal-
mantium Clus.

Bleber Negelin.

Magistrantia.

Imperatoria Tab.

Astrantia Dod. F.

Ostrutium Lob.

Lafer-

Laserpitium Germani-
cum *Fuchf.*

Meisterwurtz.

Magistrentz.

Iunio umbellam floribus
onustam gerit.

Radix frigoris patiens
multo tempore viuit, serpen-
do progrediens.

Excalefac. & sicc. 3. recef-
su. Incidit, trahit, aperit,
attenuat, prouocat, resoluit,
venena dissipat.

Præstat ferè ad omnia ve-
nena & omnes venenosarum
ferarum morsus atq; ictus.

Asthmaticos, anhelosos
iuuat; Hydropicos ac lienos-
fos curat. Ventriculi, & Inte-
stinor. flatus mirè discutit.
Vnde coli cruciatibus &
Ventriculi torminibus utilis:
Menses ciet atq; vrinas; Vte-
ro præfocatas reficit. Con-
cretum lac & sanguinem dis-
solvit, febrium rigores dis-
cutit & Quartanas curat.
Mansa è capite pituitam eli-
cit. Oris halitum emendat.
In summa Zedoaria facultatibus
similis.

Herba vulnera glutinat,
& rabidi canis morsus, nec
non carbunculos cum po-
lenta trita & imposita sanat.

Magistrantia nigra.

Imperatoria nigra *Tab.*

Astrantia nigra *Aduers.*

Sanicula fem. *Fuchf.*

Σπονδύλιον, ὑπὸ τῆς σπονδύλου.

Veratrum nigrum 2. *Cl. P.*

Ostrutium.

Schwarze Meisterwurtz.

Schwarzer Sanickel.

Siccatur & adstringit, simul
tamen aluum laxat instar
Myrobalanorum.

Educit leuiter bilem a-
tram potionibus addita.

Maiorana vulgarior.

Ἀμύρακος *Gal.* παρὰ τὸ μὴ μα-
ραίνεισθαι. Perpetuò enim vi-
ret.

Σάμψυχον *Diosc.* ὑπὸ τῆς σάμψυ-
χης, ἢ demulcendo ani-
mum, quia suauitate odoris
reficit ac recreat animum.

Maiozan.

Meiron.

Culinis nota herba.

Tota est odorata, tam in
cibis, quàm Medicamentis
vñs non contemnendi.

Tenuium partium, ac di-
gerentis facultatis. Desic-
calefacit, digerit, attenuat
aperit, roborat.

Omnibus capitis & Ner-
uorum frigidis affectibus
mirè utilis. Valet ad Pectoris
& Stomachi vitia. Iecinoro-
sis & Lienosis salubris. Vteri

Pp 2

flatus

flatus resoluit. Menstrua pro-
uocat. Suggillata delet; luxa-
tisq; tumoribus imponitur.
Succus caput purgat naribus
infusus, cerebrum roborat.

Lethargicos & Comitiales
iuuat.

Maiorana perennis.

Amaracus sempervirens.

Maiorana frutescens.

Gepfropffter Maioran.

Winter Meyran.

Surculo plantatur vt Ros-
marinus. In fictilibus alif-
quot annis perdurat.

Maiorana tenuifolia.

Amaracus 3. f. tenuifolia,
Tabern.

Maiorana gentilis & mi-
nuta, Aduersf.

Ἀνδρομαλάχης, Theoph.

Edler Maioran.

Zarter Maioran.

Fragrantior est & in ole-
re aptior. Seritur Maio.

Malua hortensis I.

Malua crispa, Dod.

Malua crustatis oris, Lob.

Malua sativa laciniola,

Cord.

Brause Pappeln.

Graven Stab.

Römischer Widerthon/ Sil.

In hortis inter olera luxu-

riat, ex semine deciduo quo-
tannis repullulans.

Plus habet aqueæ humi-
ditatis quàm agrestis: vnde
magis emollit: gustu tota
dulcis, lubrica & glutinosa.

Esui aptior, quàm sylu. fa-
cilè subit ventriculum, vesi-
cam, Thoracè, Renes iuuat,
Raucedinem lenit.

Succus cum farina hor-
deacea calidis, Hepatis, Lie-
nis & Matricis tumoribus
imponitur.

Pabulo pecori miscetur
aduersus veneficia.

Malua hortensis II.

Malua arborescens.

Malua arborea sylu. Aduersf.

Ἀνδρομαλάχης, Theoph.

Baum pappeln.

Perficam arborem æquat
altitudine & crassitie stipi-
tis. Flores purpurei: semen
Maluæ.

Ad quadriennium in hor-
tis restat, priusquam emo-
riatur, facile tamen à frigo-
re læditur.

Malua hortensis III.

Malua rosea fruticosa,

Aduersf.

Malua maior vnicaulis.

Ἀνδρομαλάχης, Gal.

Μαλάχης κηπούδ.

Stens

Stengel Rosen.

Pompel Rosen, Vulgò.

Rosen pappel.

Breun Rosen.

Reperitur flore simplici, vt plurimum rubro colore, puniceo, dilutè purpureo, candido, aut vtriusq; confusis coloratur. Calidæ sunt & humidæ naturæ.

Rubentes ex vino rubro decocti, Menses mulierû nimium fluentes sistunt.

Ex aqua add. DiaMoro faucium inflammationibus collatu profunt.

In vino veteri ablutione porriginis sanant.

Malua hortensis IV.

Malua hortensis rosea multiplex.

Malua Romana floribus multiplicibus.

Volle

Weisse

Rote

Leibfarbene

Schwartz

Braune

Gesülte Winter Rosen.

Hæc vt simplex colore variat.

Ad inflammationes tam internas quàm externas, Anginam, Sacros Ignes, alios-

que tumores non contem-
nendi vsus.

Malua hortensis V.

Μαλάχη ἀρχία, Theoph.
Lugdun.

Ἀλθαία, Diosc. πικρὰ τὴν ἀλθαί-
αν, à medendo.

Ἄλθαία.

Ἐλισκος, Gal.

Eibisch.

Zbisch.

Buffwurtz.

Humido pinguiq; nasci-
tur solo. Floret Iulio & Au-
gusto, Autumno & Vere ra-
dices colliguntur.

Calefacit, siccatur, emollit,
laxat, mitigat, concoquit.

Radix decocta pectoris
vitijs, Alui profluuiio, Men-
struis immodicè fluentibus,
Vrinæ difficultati, Calculo-
sis, Dysenteria, Ischiadicis,
tremulis & ruptis auxiliatur.

Ad strumas, abscessus, in-
flammationes, contusiones,
neruorum distensiones, ru-
pta, conuulsa, vesparum, A-
pium ictus efficax.

Semen valet ad Dyfente-
riam, sanguinis reiectionem,
Phthisin & alui fluores.

Folia fomentis & cata-
plasmatis, ad lateris, calculi,
Ventris, Vesicæq; dolores ac
cruciatus utiliter adduntur.

Pp 3

Mucca-

Muccago radicum oleis,
vnguentis, emplastris laxan-
tibus & dolorem sedantibus
admiscetur.

Malua hortensis VI.

Althæa luteis floribus, *Lob.*

Althæa Ibisus, *Aduers.*

Abutilon Gesn. *Dod.*

Welscher Eibisch.

Samet Pappeln.

Sub finem ætatis floret.

Glutinosa & vulneraria est.

Malua hortensis VII.

Althæa palustris, *Tabern.*

Althæa palust. Cytini flo-
re, Aristolochiæ vtriculis,
Aduers.

Sidon, Theoph.

Wasser Eibisch.

Flos illi purpureus satu-
rior Maluæ satior. Autumno
floret.

Malua hortensis VIII.

Alcea vesicaria, *Dod.*

Alcea Venera, *Mattiol.*

Alcea peregrina solsequia,
Aduers.

Wémoor, Diosc. Mattiol.

Römischer Fellsys.

Wetter Röslein.

Julio flores Maluaceis si-
miles subalbidi: semen au-
tumno nigellæ ferè.

Emollientis est facultatis.

Ad Maluæ videtur tempe-
riem accedere.

Malus domestica.

Μηλέα ἡμερος.

Samet Apffelbaum.

Prædijs & hortis perquam
familiaris & nota, cuiuslibet
cœli admodum patiens.

Folia omnis Mali adstrin-
gunt, cum refrigerandi fa-
cultate.

Recentia tusa, imposita
inflammationibus incipien-
tibus profunt.

Malus humilis.

Χαμαιμηλέα.

Johannis Apffelbaum.

Fruticis modo adolescit,
& sua natura fert poma præ-
cocia mediocriter dulcia, co-
lore admodum dilutè flaua.

Mala acida.

Ὀξύμηλα.

Scurlinge.

Saueröpfel.

Frigida sunt & tenuium
partium. Alimentum par-
chis subministrant, idq; cru-
dum & frigidum, ventrem
inhibent, urinam pellunt,
humores incidunt & tenuât.

Mala dulcia.

Μελιμηλα, Diosc.

Γλυκὺ

Γλυκύμηλα.

Mala mustea.

Süsse öpffel.

Honig öpffel.

Mediæ sunt temperaturæ,
minus humida & frigida.
Ventre emolliunt, minus
facile descendunt per aluū.
Præstant ad Melancholicos
affectus & pleuriticos.

Mala vinosa.

Ὠξύμηλα.

Weinsauere öpffel.

Weinlinge.

Calefac. nonnihil & re-
frigerant, ventriculū re-
creant: saporis grati, febri-
citantibus vtilia.

Ex his parantur Eleætuaria
non aliter atque è Cydonijs
præstantissima, palato gra-
ta, in febribus haud con-
temnendi vsus.

Mala acido-dulcia.

Ὀξύμυρμηλα.

Mala Borsdorffiana.

Mala Misnensia.

Borsdorffer öpffel/Meiße-
nische öpffel.

Saporis sunt gratissimi,
stomacho vtilia, minimè fla-
tulenta.

Eliguntur præ cæteris ad
Syrupī de pomis & confect.
Alcherme compositionem.

Mala Augustea.

Mala præcocia dulcia.

Augst öpffel.

Früe öpffel.

Magdalenen öpffel.

Mala Episcopia.

Bischoffe öpffel.

Mala Annabergica.

Anneberger.

Herren öpffel.

Mala Cydoniata.

Mala Appiana.

Quitten öpffel.

Bitten öpffel.

His color, odor magnitu-
doque Cydoniorum.

Mala rosea.

Πατιμήλα.

Rosen öpffel.

Mala parelia.

Parles öpffel.

Acida sunt & grati saporis.

Mala Carbonaria.

Bol öpffel.

Mala angulosa.

Zapffen öpffel.

Mala Duracina.

Läger öpffel.

Harte öpffel.

Mala

*Mala rubentia.**Strimlingeöpffel.*

In summa innumerabilis est pomorum varietas, ut superiorem ætatē nostra vincat. Nam insitio & inoculatio plura genera peperit.

Malus punica.

Malus granata.

Granat öpffelbaum.

In viridarijs florem ostendit nullo sequente fructu.

Folia hyeme amittit.

Mala punica.

Poiæ.

Granatöpffel.

Margrandenöpffel.

Mala punica { acida,
austera,
suavia.

Acida manifestè refrigerant, resiccant, adstringunt, nauseam ventriculi corrigunt, appetentiam excitant. Æstuantī stomacho auxiliantur. Choleram morbum reprimunt.

Succus ad oris vlcera utilis cum melle.

Malicorium, Zidior, Psidium

Granatschalen.

Spissat, adstringit, sanguinolenta glutinat, humida gingivarum vitia corri-

git, mobilesq; dentes firmat.

Marrubium Creticum.

Marrubium Creticum angustiore folio, odore gratiore, Aduers.

Cretischer Andorn.

Candidius est & odoratius, folijsque quandoq; angustioribus & minoribus.

In horto Domini Heintij pharmacopola Suidnicensis.

Valentius omnia perficit quàm sylvestre.

Medica cœrulea.

Medica sativa Lugdun.

Dodon.

Fœnum Burgundiacum,

Aduers.

M. S. u. n. Diosc.

Burgundisch hew.

Blaw Schnecken Flee.

Refrigerandi vim habet.

Medica cochleata.

Trifolium cochleatum 3.

Dodon.

Medica Anglica, Tabern.

Schneckenflee.

Iulio floret.

Medica Arabica.

Frembd Schneckenflee.

Ex semine in horto meo enata.

Melilotus Italica vera.

Melilo-

Melilotus Cretica, *Nom.*
 Melilotus nobilis.
 Trifolium frutescens.
 Trifolium Italicum folli-
 culis rotundis, C. B.

Welscher Steinflee.

Schöner gelber Honigflee.

Seritur in hortis & quo-
 tannis ex semine renasci o-
 pus habet.

Calefac. sicc. digerit, con-
 coquit, nec adstrictione
 prorsus caret.

Commodè in vsum medi-
 cum recipiuntur flores, qui
 colorem & odorem Mellis
 diutissimè retinent.

Colliguntur Iulio & Au-
 gusto.

*Melilotus Italica vul-
 garis.*

Melilotus Italica & Pata-
 uina, *Lobel.*

Trifolium corniculatum
 2. *Dodon.*

Melilotus maior.

Ander Welscher Steinflee.

Eiusdem cum germanica
 facultatis.

Melissa vera.

Μελισσόφυλλον καὶ
 Μελίφυλλον *Diosc. Gesn.*

Melissa, *Officin.*

Apiastrum, *Lobel.*

Citrageo, *Citraria.*

Bienfraut/ *Sil.*

Mutterfraut.

Melissen fraut.

Hertzfraut.

Herba vulgo nota, api-
 bus grata.

Radix restibilis, primo
 vere noua folia atque inde
 cauliculos promit.

Tota citrium redolet. Ca-
 lida & sicca 2. gradu, discu-
 tit, sanat, glutinat.

Animum & Cor exhila-
 rat, vitalesque spiritus robo-
 rat. Humenti ac frigido ven-
 triculo auxiliatur, conco-
 ctionem adiuuat. Cerebri
 obstructions referat, Pro-
 dest Melancholicis, ab atra
 bile vexatis, Dysentericis,
 Celiacis, Orthopnoicis, Lie-
 nibus & vlceribus Thoracis.
 Pota, illita contra serpen-
 tum & canis rabidi morsum,
 Araneorumq; ictum prodest,
 Cum nitro fungorum stran-
 gulationibus. Folia trita ma-
 nibus, eas ab apum ictu præ-
 feruant.

Melissa Moldauica.

Melissa Turcica.

Citrageo Turcica.

Türkisch Melissenfraut.

Facile ex semine nascitur
 cœruleo & niueo flore.

Tota Melissæ odorè adeò
 Q 9 imita-

imitatur, imò & superat, vt
penè præ nimia fragrantia
fastidium faciat.

Melo vulgarior.

Μελόπιπρον, Diosc. Lobel.

Melon-cucumis veterum,
Cord.

Pepum, Mattioli.

Melonen.

Melaunen.

Pfeben.

Solum amat latum & ap-
pricum, Soli expositum.

Carnem habet duriores,
magis firmam & solidam
quàm Pepones.

Refrigerat, humectat, vri-
nas ciet: verùm frequens e-
ius vsus in corpore vitiosum
gignit succum, vnde febres
nascuntur.

Semen ab officinis habe-
tur inter quatuor maiora
vocata primæ commendati-
onis, & frequentioris vsus:
mitigat ardores & Renum
dolores.

Melo Saccharinus.

Melo saccharatus Lob.

Zucker Melonen.

Sin cœlum fuerit pluui-
sum, ad maturitatem non
perueniunt fructus.

Artis inuentum.

Semen priusquam seritur,

saccharo, aut aquâ sacchara-
ta irrigatur.

Mentha crispa.

Mentha vulgaris seu fuf-
ca sacra aduers. 2. Dod.

Mentha simplex Offic.

ἡδύστυμος Diosc.

Μέντη Græc. ἡ τὴν μίτλη, à
stercoris foetore, per ἀλλοτρί-
αν q. minimè foetida.

Sisymbrium hortense.

GartenMünze.

BrauseMünze.

Brauser Balsam.

Augusto floret. Omnibus
farè hortis nota.

Tenuium est partium. Ex-
calefacit & exiccat in fine 2.
ordinis.

Attenuat, digerit, resoluit,
aperit, incidit, prouocat.

Flatus & lumbricos pellit,
vomitum compescit. Cœ-
liacis & ventriculi Vteri-
que doloribus à flatu prouenien-
tibus competit.

Mentha vulgarissima.

Mentha vulgaris serpens
rotundifolia.

Mentha hortensis verti-
cillato Ocymii odore.

Cruciata Mentha Lob.

Mentha rubra.

BalsamMünze.

Rote Münze.

Balsam

Balsam vulgo.

Folia breuiora, angustiora, serrata, in caulibus quadratis rubentibus.

Flores per interualla purpureo verticillato ambitu. Pulegij. Radix longè lateque sub terra repens se propagat. Nulli hortorū deest.

Eadem præstat quæ superior.

Purgationes feminarum inhibet, & præsertim aduersus album Menstruorum fluxum commendatur.

Mentha Cardiacæ.

Mentha Romana angustifolia Lobel.

Mentha 2. Mattiol.

Mentha acuta Tabern.

Herz Balsam.

Herzmünze.

Spitz Münze.

Minus vulgata ac prior.

Odore & vi peramica cordi. Cerebro & ventriculo commendabilis.

Omnis Mentha vtiliter additur fomentis, defectionibus, balneis, sudatorijs & clysteribus, vbi excalescentia & resolutione opus est.

Mercurialis sativa.

Mercurialis mas & femina.

Mercurialis testiculata & spicata.

Ἑρμῶν ῥίζα seu ὁλόδιον.

Λιχάρις Diosc.

Mercurius fraut.

Bingelfraut.

In arcis hortorum cultis tota æstate viget, hyeme intercidit.

Femina à masculo solo fructu differt, qui racemosus spectatur.

Sapore est subnitroso, & nonnihil viroso succo multo, porraceo, purgante, & medicato.

Ciet aluum, digerit, bilem & aquam in potionibus sumta detrahit.

Herba Clysteribus utilis.

Mespilus.

Μεσπίλη Theoph.

Mespilus domestica Lob.

Nesselbaum.

Floret Maio, sub finem Octobris maturescunt fructus.

Asperis gaudet & incultis. In hortis apud nos colitur.

Si inferatur Oxyacanthæ, magna fiunt Mespila.

Folia adstringunt, glutinant, sanguinis profluvia sistunt.

Fructus acerbus & χαλκὸς ὅμαχος ventrem strenuè coërcet.

Cum mollescit, Mensis fe-

Qq 2

cun-

cundis imponitur.

Oscula contrita, calculos Renum valenter pellunt ex decocto Petroselini.

Meum.

Μῆον Diosc.

Meum vulgare *Clus. P.*

Meum Athamanticū *Guil.*

Tordylium *Cord.*

Anethum tortuosum.

Daucus Creticus *Fuchs.*

Beerwurtz.

Hertzwurtz.

Bärdille.

Sewfenchel.

Bärmutterwurtz.

In horto meo Maio flores, Iunio semen in umbella ostendit.

Excalefacit 3. siccatur 2. Incidit, aperit, digerit, urinas prouocat & menses. Venenis aduersatur.

Radix foris nigricans, intus candida, crassos & lentos pectoris humores extenuat & educit. Lienem & Hepar obstructione liberat, ventriculum frigidum & vterum calefacit & roborat.

Torminibus, vterinis affectibus, Articulorumq; cruciatibus medetur.

Additur vterinis infestibus & ad Renum calculos ordinatis.

Caput tamen offendit immodicus eius vsus.

Milium candidum.

Κέρκεος Diosc.

Παρδάνη.

Milium Lob. *Dod.*

Hirse.

Solum amat pingue limosum & glutinosum.

Refrigerat, siccatur, adstringit, difficilis digestionis.

Agricolis cibis suavis, multum nutriens, ventrem cohibet & urinas prouocat. Valde accommodum est Cerebri fluxionibus, item ad fluxiones Articulorum flatusq; intestinorum magno leuamento.

Milium nigrum.

Milium semine nigro & latiore iuba.

Schwartzes Hirse.

In hortis feritur, potius voluptatis quam vsus gratia.

Millefolium luteum.

Millefolium minus seu stratiotes Chiliophyllos *Deodon. F.*

Elychrysium Italicum *Matt.*

Geel Garbe.

Morus.

Μορέα ἢ συκὰ μύρος Diosc.

Morus

Morus celsa Offic. Lob.

Morus vulgaris.

Maulbeerbaum.

Loca amat calida & sabulosa.

Arbor tota videtur mistam obtinere vim ex restringente & purgante compositam.

Mora immatura refrigerant & nonnihil resicc. adstringuntq; vnde ad Stomachica medicamenta perquam commoda.

Matura aluum subducunt.

Folia ex aceto ambustis medentur.

Myrtus.

Μυρτίνα.

Μυρτίνα.

Myrtenstrauch.

Welsch Heidelbeerstrauch.

In viridarijs.

Vim habet adstringendi, siccandi temperatam in colore & frigore.

Napus.

Βορίαι. Diosc.

Bunias f. Napus Lob.

Napus veterum Trag.

Napula.

Sterckrüblin.

Merseburgische Rüblin.

In hortis feritur, solutam terram postulat.

Rapo est paulò siccior, minusq; facile concoquitur, aut descendit, paucioresque flatus ingenerat.

Semen potum venenorum vires hebetat: quare Antidotis miscetur.

Ex Adianthi decocto Morbillos & Exanthemata ad cutim propellit, & morbi malignitatem superat.

Narcissus mediocroceus l.

Νάρκισσος καὶ λεῖκος Diosc.

Narcissus albidus medioluteus vnico flore Lob.

Narcissus veterum Tr.

Sternblumen.

Spanische Rosen.

Narcissen röslein.

Flos stellatus Maio pdit.

Amari est saporis, calidæ & siccantis naturæ, vulnera glutinat: habet & quiddam absterfium attractoriumq;.

Narcissus medioluteus II.

Narcissus medioluteus pluribus floribus.

Narcissus mediocroceus ferotinus polyanthos Lob.

Narcissus l. Matt.

SternRosen.

Hunc à Domino Dominico Heintz habeo Schvidnicio.

Q 9 3

cio.

cio. Iunio floret & Iulio.

Narcissus luteus.

Narcissus montanus luteus.

Narcissus totus luteus montanus Theoph. Lob.

Pseudonarcissus r. Clus. H.

Geel Narcissenblumen.

Mertzenblumen.

Aprili floret.

Nasturtium hortense.

Κάδυστος Diosc. Lobel.

Cressio.

Bresse.

Gartenfresse.

Seritur Vere ad Acetario-
rū vsum: quamuis omne an-
ni tempus ad sationem ap-
ptum sit, hyeme excepta.

Calefacit, siccit, aperit,
attenuat, mundat, prouocat,
incidit, vrit, resoluit.

Semen Lienem imminu-
it, Menses ciet, Ventris ti-
neas excutit, Aluum turbat,
Bilem ex aqua subducit, vi-
tia capitis purgat. Tussi ex
melle medetur. Sorbitioni-
bus incoctum pulmonum vi-
tia extrahit.

Ex alto delapsis aut præ-
cipitatis datum confert, san-
guinē coagulatum dissoluit,
& ne alicubi in corpore coë-
at, præcauet, sudores mouet.

Calefacientibus Empla-
stris additur.

Herbæ, ad scorputum non
minor quàm Cochleariæ, fa-
cultates & vis.

Nasturtium Indicum.

Nasturtium peregrinum
Perunianum Lugdun.

Nasturtiū Orientale Nonn.

Indianische Bresse.

In horto Dom. Laurent.
Scholtzj.

Sapore Nasturtium refert.

Nepeta Germanica.

Cattaria s. Mentha Catti
Aduers.

Nepeta Off. Trag.

Herba Cattaria Mattiol.

Bazennept.

BazenMüntz.

Sorant.

Rechter Sorant Sil.

Viret mox ab ipso Vere.
Iulio & Augusto floret.

Odor acutus Caput ferit.

Gustu constat feruido cū
amaritudine haud obscura.

Præstat ad omnes Capitis,
Pectoris, Ventriculi aut V-
teri morbos à pituita ge-
nitos.

Menses elicit, fœtus & se-
cundas expellit, conceptus
facilitat, prolificumque vte-
rum reddit.

Ex vi-

Ex vino vel aceto ruptis,
ex alto deuolutis commodè
propinatur.

Succus pituitam è nari-
bus trahit & visum acuit.

Additur balneis.

Aduersus veneficia apud
vulgum magnæ commen-
dationis.

Nepeta Hispanica.

Cattaria folio lōgiore *Dod.*

Cattaria angustifolia.

Spanische *Nep.*

Odor est vehementior &
sapor acrior.

*Nicotiana maior la-
tifolia.*

Hyoscyamus Peruvia-
nus *Dodon.*

Tabacum maius latifoliū.

Petum 2. *Clus. P.*

Tabaco *Hispanis.*

Sana sancta Indorum seu
Nizotiana Gallorum *Lobel.*

Herba Regina *Chirurg.*

Indianisch Wundkraut.

Peruanisch Walwurz.

Beinwelle.

Großerechte Tabaco.

Autumno flores in summo
caulis fere purpurascens:
semen succrescit minutissi-
mum in vasculis acutis.

Gustu est acris. Calefacit
& siccatur, resoluit, expurgat,

cum exigua adstrictione. Ad-
est ei narcotica vis, per al-
uum expurgatoria & alexi-
pharmaca quædam.

Saluam commanducata
folia cient ac pituitam de-
trahunt.

Vlcera vetera expurgat,
detergit, & ad sanitatem
perducit.

Aduersus scabiem cutisq;
foeditates & ad vulnera vti-
lis. Omnium venenatorum
morsus sanat.

*Nicotiana maior lon-
gifolia.*

Tabacum Angustifolium.
Langblettrichte Indiani-
sche Beinwell.

Eiusdem naturæ.

Nicotiana minor.

Hyoscyamus vulnerarius
minor.

Hyosc. dubius luteolus
Solanifolius *Lobel.*

Petum 3. *Clus.*

Priapæia *Ital.*

Kleiner Wundbilsen.

Klein Tabaco *Sil.*

Gerrenkraut *Sil.*

Notis. in hortis Nobiliū.

Maiore imbecillior. Tota
planta admodum acris est
dum floret. Diutius odorata
caput temulentum reddit.

Pedi-

Pediculos & inprimis pulices necat. Nam folijs huius affricatis Cuti, vel succo illito tanquam incantamento fugati decidunt.

Insignis est vulneraria.

Nigella Romana.

Μελάνθιον Diosc. ἑπὶ μέλανος ἄνθος.

Nigella Romana odora f. Melanthium Lobel.

Melanthium hortense.

Schwartzzer Kummel.

Schwartz Coriander.

Römischer Coriander.

Schabab.

Solo gaudet pingui: semen Augusto maturescit.

Tenuium est partium, incidit, extergit, calefacit & siccatur ad 3. gradum.

Flatus discutit, & pituitam incidit. Cum vino petus expurgat, & difficultatem spirandi aufert. Menfes & urinas prouocat. Lac Mulieribus auget continuò sumta, & oculos purgat. Lumbricos ventris interimit, calculos Renum & Vesicæ minuit, Destillationes ex capite resiccat calefactum nodulo illigatum & assidue olfactum, recentes Oculorum suffusiones discutit. Cum aceto maculas, lenti-

gines, durities tumoresque vetustos tollit.

Nigella Citrina simplex.

Χευστομαλάνθιον.

Melanthium Citrinum flore simplici Tabern.

Geeler Römischer Coriander.

Flore, non semine à priori differt.

Nigella citrina plena.

Nigella citrina vulgo vocata flore albo multiplici, Lobel.

Melanthium luteum multiflorum.

Doppel geel Römischer Coriander.

Flos ei plenus pallide luteus.

Nux iuglans.

Καρύδα.

Nußbaum.

Welsch Nußbaum.

Non nisi in hortis, latis collibus viget, humiliores amat tractus.

Folia digerunt, adstringunt & sudores cient. Ad balnea, corporisque lotiones adhibentur.

Arboris umbra caput dolore afficit. Pannicula sicca

cxvi-

ex vino albo vteri praefoca-
tionibus auxiliatur, addita
ol. succini guttula vna. Co-
licis etiam doloribus ac Ne-
phriticis utilis.

Cortex radice medianus
Dentium dolores sopit.

Nux iuglans.

Nux regia.

Κάρυον βασιλικόν, Diosc. quia
Caput lædit.

Welsche Nüsse.

Triplices habentur.

Maxima, equina.

Ros Nüsse.

Grosse Nüsse.

Mediocris, vulgares.

Gemeine Nüsse.

Offea, minima.

Stein Nüsse.

Recentes calef. 1. & sic-
cant 2. gradu, humectant
nonnihil.

Eduntur nuces salubrius
minoriq; incommodo recē-
tes & succulentæ quàm ari-
dæ: tūc enim concoctu diffi-
ciles, stomacho inutiles, val-
de biliosum succum procre-
ant. Capiti grauedinem af-
ferunt, tussientibus inimicæ
& pectori.

Vtiles censentur maximè
à piscium esu, vnde illud:

*Post pisces nuces, post carnes
caseus adsit.* Ob vim cale-
faciendi & siccandi.

Ieiuno stomacho come-
stæ latos lumbricos pellunt.
Cum ficu ruta & grumo salis
contra venena & Pestilentia
manè sunt cōmendantur.

Mammarum inflamma-
tionibus cum mellis exiguo
& ruta illinuntur.

Rancidæ efficacissimæ il-
litæ, linores in corpore tol-
lunt.

Cum cepa, sale & melle,
Canis hominisque morsui
conueniunt.

Putamen combustum Ca-
pillum nutrit, Alopecias
replet.

*Ligna membrana intercur-
sans, Nauci vocatur, aduer-
sus calculum vulgi experi-
mento laudata, das böglin in
der Nuss.*

Succus exterioris corticis
adstringit. Ad oris inflam-
mationes utilissimus.

Aqua corticum viridum
aduersus pestem commen-
datur.

Ocimum maius.

Οκνον, Diosc.

*Ocimum Caryophyllatū
maximū ac citratum, Aduers.*

Ocimum i. magnum, Tab.

Basilica maior, Trag.

Gros Basiliens fraut.

Rr

Gros

Gros Basilge.

In H. L. S.

Totum odorem Caryophylli cum citrio confusum fundit.

Calefac. & siccandi vi poller.

Corroborat, & Lipopsychiam tollit.

Datur atram bilem colligentibus, suspiriosis, agrè mingentibus.

Ocimum medium.

Ὀκίμης μέγας.

Ocimum, Dod.

Ocimum 2. seu medium, Mattioli, Cam.

Ocimum seu Basilicū medium vulgatius, Aduers.

Mittel Basilien.

Basilien fraut.

Hoc duplex in hortis & fœtilibus seritur. Vnum vulgatius & abiectius, minus suauem odorem vibrans: alterum citrinum seu citratum dictum, ab odore gratiore & cordi amabiliore.

Calefac. attenuat, resoluit, humores crassos discutit, pellitussim, auxiliatur difficilem spiritum trahentibus, vrinas ciet & menstrua prouocat.

Huius semen officinis notum, ad cordiales composi-

tiones multi vsus.

Ocimum minimum.

Ocimum minus caryophyllatum.

Ocimum satium minus, Dodon.

Ocimum minimum Amara-
raci figurâ.

Ocimum Caryophyllatum, Aduers.

Ocimum citratum.

Kleinst edel Basilien.

Nigel Basilien.

Citron Basilien.

Minor tota plantula & rari-
or, Caryophylli halans fra-
grantiam.

In fœtilibus asseruatur.

Quantò cæteris odoratus;
tantò ad omnia efficacius.

Animo lapsis spiritus lan-
guidos recreat.

Olea Bohemica.

Ἐλαια βόημος, Theoph.

Oliua Bohemica, Lugdun.

Oliua Syl. Septentriona-
lium, Lob.

Ziziphus alba Colum. Bell.

Böhmischer Oelbaum.

Flores lutei, odorati.

*Oleander Purpureo
flore.*

Νέανδρος πορφυρεός.

Rhododendrum, Dod.

Laurus

Laurus rosea, Lob.
 Oleander baum.
 Unholden frant.
 Aspectu lato viridaria ex-
 ornat, vsus neglecti.

Oleander flore albo.

Nerion candidum.
 Rhododendrum album.
 Weisser Oleander.

Ornithogalon lacteum.

Ornithogalon, Diosc.
 Ornithogalon vulgare,
 Clus. P.
 Bulbus leucanthemus mi-
 nor, seu Ornithogalon,
 Dod. F.

Weisse feldzwiebeln.

Kleine Erdnüsse.

Floret Maio.

Radix cruda cocta q; man-
 ditur. Est enim dulcis &
 suavis.

Duplex maius & minus.

Ornithogalon spicatum.

Ornithogalon Narbonen-
 se, Doden.

Asphodelus Hyacinthinus
 fortè Gal. Aduersf.

Ornithogalon 2. Panno-
 nicum, Tabern.

Ungerisch feldzwibel,

Iunio floret.

Orobis vulgaris Herb.

Orobis, Diosc. Officin.

Orobis receptus Herba-
 rior. Lobel.

Eruum, Mattiol.

Cicer Orobæum.

Mochus seu Cicer sat.
 Diosc. Dod.

Eruen.

Ad Medicos vsus in hor-
 tis seritur.

Saporis est amari, Cale-
 fac. 1. siccatur 2. digeritur, ape-
 rit, abstergit.

Flos ex decocto sanat pe-
 des frigore vltos & cutis
 pruritus.

Ex Orobi farina fiunt iu-
 scula Nephriticis, & calcu-
 losis, Cachecticis, cacochy-
 micis pituitosisq; omnibus
 salutaria.

Orobis venetus.

Eruum Venetum.

Venedische Eruen.

Oryza Germanica.

Tibon, Theoph. Tabern.

Rizum germanicum.

Zea genus, Oryza dicta,
 C. B.

Tragus frumentaceus seu
 Cerealis.

Reißgersten / sil.

Teutscher Reiß.

Seritur cum alijs trime-
 stribus seminibus.

Rr 2

Agrum

Agrum amat lætissimum. Temperamento & facultatibus Tritico & Speltæ respondet.

Calefac. adstringit, siccatur, resoluit.

In cibis cocta optimè alit. Lacte incocta saccharo addito plurimum & optimum alimentum suggerit, eoque sanguinem & semen auget. Aluum leuiter sistit. Dysentericis, diarrhœa laborantibus & tabidis commodum edulium.

Farina cum Rosis Mammarum inflammationes cohibet.

Peonia femina simplex.

Παονία ἁπλῆ.

Rosa Sancta.

Peonien Rosen.

Benignien Rosen/vulgò.

Palsim in hortis Maio floret.

Radix desiccatoria & calefactoria est facultatis, subtilium partium, leuiter adstringit quadam cum dulcedine acrimoniam quampiã habens subamaram.

Expurgat Iecur obstructum & Renes. Feminas à partu purgat, ciet Menses, Regium morbum & Vesicæ

dolores sanat, Ventris doloribus auxiliatur.

Peculiariter Epilepsia & alijs affectibus Cerebri, potissim. frigidis & vertiginosis, qui affinitatem quandam habent cum Epilepsia, vel in eam faciliè mutantur, egregiè confert. Colligitur Septembri folijs flaccidis & arescentibus, Luna inclinante.

Multa de collectione nocturna plena superstitionis nugantur Quidam.

Grana nigra nocturnis auxiliantur suppressionibus, vteri strangulationi atq; dolori in aqua mulsâ aut vino.

Peonia femina polyanthos.

Peonia femina multiplex Dodon.

Volle Peonien Rosen.

Gefülte Peonien blumen.

Hæc adeò multiplicatis folijs visitur, vt vnus floris super ducenta foliola numerari contingat.

Peonia albo flore.

Peonia leucanthemos.

Peonien mit weissen blumē.

In horto meo. Tota vulgari minor.

Pani-

Panicum vulgare.

Ἑλυμνος, Diosc.

Panicum, Herbar.

Mel frugum.

Fenich.

Heidelpennich.

Fenchel Hirsche / vulg.

In campis & horris.

Refrigerat, siccat, adstringit, aluum cohibet, difficile digeritur, sanguinem procreat crassum.

Plebres & agricolis edulium gratum laete decoctū.

Aluum sistit & dysentericis prodest, Tostum ex lintheo sacculo impositum tormina ventris sedat.

Panicum pannicula maiore.

Panicum maius peregrinum.

Panicum Indicum pannicula villosa, Lob.

Frembder Fenich.

Grosser Indianischer Fenich.

Papauer sativum album.

Μάκων ἡμερῶν, Diosc. πρὸς τὸ μὴ ποιεῖν, à non ministrando, quòd suis fungi munijs vescentes non patiantur.

Papauer hortense, Mattioli. Cam.

Papauer album, Dod.

Papauer flore niueo.

Weisser Mohn.

Weisser Magsamen.

In hortis & campis seminis causa seritur. Iunio floret, Augusto perficitur.

Capita cum melle ad formam Eclegmatis decocta, tussi ex tenui materia, Arteriarum fluxionibus & coeliacis affectibus auxiliantur.

Semen nigro tutius usurpatur, quo etiam præstat. Refrigerat modicè, somnum conciliat, vertiginem sistit, Additur amygdalatis, hordeatis & Emulsionibus in calidis affectibus.

Nimius tamen usus nocet.

Vulgus ex eo placentas conficit & panes Papauera-
ceos dictos.

Mohnfuchen / Mohnbrod.

Papauer sat. nigrum.

Papauer nigrum sat. flore Maluarum hortensis aut pæonia, Aduers.

Schwarzer Mohn.

Grauer Mohn.

In vigilijs fronti illinitur ex aqua Rosarum Semen tritum per se vel cum vino tritum aluum, & feminarum profluvia cohibet, tussim lenit & alias calidas fluxiones.

Rr 3

Papa-

Papauer sativum maximum capite.

Grosser Welscher Moh'n.
Magsamen mit grossen
köpfen.

Semen quod nonnihil al-
bicat, præfertur priori ad
eosdem vsus.

Ex lacte decoquitur vel
Melle ad somnum infanti-
bus conciliandum, acresque
& calidas ad pectus deflu-
xiones.

In vigilijs fronti illinun-
tur seminis cremor & cali-
ces. Adduntur & lotioni-
bus pedum ad eosdem ef-
fectus.

*Papauer fluidum hor-
tense.*

Μήκων ὀρεῖος, Diosc.

Papauer albo & nigro se-
mine.

Papauer spontaneū hor-
tense.

Papauer patulum.

Außlauffender Moh'n.

In hortis spontè luxuriat.

Huius capitula hiantia
maturum semen effundunt.

Prima germina olerum
modo coquuntur & addito
butyro deuorantur.

Papauer fimbriatum.

Papauer Cristatum album
& nigrum, Lob.

Papauer { albo,
fimbriatum { rubro,
incarnato, (re.
variegato flo-

zerkerster Moh'n mancher-
ley farben.

Papauer polyanthos.

Papauer multiplici flore.

Papauer pleno flore albo,
rubro, purpureo, violaceo,
cinereo, miniato, & ex his
mixto.

Allerley farben gefülter
Moh'n.

Voller Magsamen.

Mixta natura florum varie-
tate ludere solet.

Voluptatis ergò in hortos
recipitur.

*Papauer corniculatum lu-
sco flore.*

Μήκων καρπῆτις, Diosc.

Papauer cornutum, Cord.

Papauer sylu. cornicula-
tum, Trag.

Horn Mohnsamen.

Gelber gehörnter Moh'n.

Gelmagen.

Vis eius calef. & sicc. in-
cidens & absterforia.

Radix ijs utilis, qui crassa
& arenosa cū lotio reddunt,
& difficulter mingunt.

Papa-

*Papauer corniculatum
rubrum.*

Papauer cornutum flore
phoenicio, Lob.

Koter gehörnter Möhn.

*Pastinaca sativa la-
tisolia.*

Pastinaca domestica vul-
gi, Lobel.

Σταφυλῖος κηπάριος, ab vua-
rum figura. Inuersi enim v-
uarum formam habent.

Elaphoboscum Diosc. Lob.

Sam Pestnachen.

Hirschmöhren.

Seritur ab olitoribus in
hortis ad vsum ciborum.

Floret Iulio & Augusto se-
cundo demum anno.

Terram requirit pinguem
ac solutam alteq; perfossam.

Radix Autumno & Hye-
me vsq; in proximum ver e-
sui aptissima. Gustu dulcis,
inflat & ventrem replet, vri-
nas mouet, & menses prouo-
cat, venerem stimulat.

Semen calidius & siccus
laterum doloribus, aut qui-
bus aqua cutim subiit, ser-
pentumque moribus auxi-
lio est.

*Pastinaca sativa tenui-
folia lutea.*

Pastinaca sativa, Diosc.

Baucia hortensis.

Daucus niger Theoph. &
Carotta vulgaris flaua, Ad-
uers.

Gele Rüben.

Mören/ Sil.

Culinis nota. In hortis &
campis ob radices plurima.

Radix dulcis, grata & ori-
iucunda. Calef. & siccatur, a-
perit, inflat, venenis resistit.

Alimentum non multum
quidem sed minus vitiosum,
quàm alia pleraq; suggerit.

Flatulentum quoq; quid-
dam obtinet, sed minus quàm
Rapa, quibus etiam minus
cito descendit.

Coquuntur plerumq; cum
aquâ, lacte vel carniū pin-
guum iure. Profunt ventri-
culo.

*Pastinaca sativa tenui-
folia alba.*

Staphylinus albus.

Carotta alba, Mattiol.

Weisse Möhren.

Saltem radice à priori
discrepat.

*Pastinaca tenuifolia
rubra.*

Carotta radice rubra.

Carottis rubra.

Pastina-

Pastinaca sativa atrorubens, Lobel.

Kote Rüben.

Kote Pasteney.

Carotten.

Solum requirit pingue.

Calef. humectat, lenit aluum, pectus faciliat, tussim mitigat.

In cibus sumta inflat & concoctu non adeo facilis.

Coquuntur radices, & aceto Anethoq; seu Carueos femine condiuntur, quæ hybernis mensibus acetariorum locum suppleant.

Pastinaca polyrrhizos.

Σίονος, Diosc.

Sisarum, Lob. & Dod.

Siser sativum.

Secacul Arab.

Zucker Möhrlein.

Grizel Möhren.

Gierlein.

Minus frequens ut priores; facile radiculis propagatur.

Calefacit nec acrimoniâ destituitur.

Omnium pastinacæ generum saluberrimum.

In cibo stomacho gratissimæ radices, appetentiam inuitant, genituram augent, & venerem stimulant, facile concoquuntur, nec tardè

descendunt, nutriunt mediocriter, nec pravi sunt succi. Eduntur coctæ & quandoq; cum aceto sale & exiguo oleo acetarij in modum, sæpe in oleo aut butyro fixæ, & alijs modis.

Pepo rotundus Melonis effigie.

Πίπρον.

Pepo rotundus.

Pepo ventricosus ab ipso pediculo usque ad oculum striatus.

Plutzer.

Konter Plutzer.

In hortis instructioribus Vratislaviæ.

Peponum multa sunt genera ab ipsorum sapore & figuris petita.

Pepo oblongus.

Pepo, Brunfels.

Pepo femina,

Pepo maior oblongus,

Dodon.

Lenglichter Plutzer.

Solum desiderat pingue & soles æstivos. Maiores sunt Melepeponibus striati. Carnem habent molliorem, leuiorem & insipidiorem.

Peponum natura frigidior cum larga humiditate. Abstergunt, eijciunt urinas, Aluum

num facilem ac lubricā reddunt, verūm facillē corrumpuntur.

Perfoliata.

Perfoliatum vulgatius flore luteo, folio umbilicato, *Aduers.*

Διάφωλον.

Durchwachs.

Stropsloch.

Gustu est amaro & adstringente. Calidæ & siccæ naturæ.

Ad fracturas, hernias, strumas, exostofin, Erysipelata magni vsus.

Datur & ruptis seu ex alto deuolutis.

Periclymenum I.

Περικλυσμον, Diosc.

Περικλυσμον, id est, circumflexum & circumuolutum.

Periclymenum vulgò.

Matrisylua.

Caprifoliū germanicum,

Dodon.

Lilium inter spinas.

Speckhilgen.

Waldmeister.

Wald Lilien.

Je lenger je lieber.

Plantatur in hortis voluptatis causa & in topiariorum vsu.

Floret à Maij fine per æstatem in Autumnum vsque.

Calefac. & siccantis naturæ; vehementer incidit, vrinæ ducit.

Odorati sunt flores.

Vlcera sordida & humida sanat & exiccat, Lichenes curat & alias cutis sordities & maculas faciei emendat. Additur vnguentis, quæ ad capitis vulnera parantur.

Periclymenon II.

Periclymenum perfoliatum, *Dod.*

Periclymenum perfoliatum calidarum regionum *Offic. Lobel.*

Welsche Specklilien.

Latius omnino fruticat in viridarijs.

Persicus.

Μυλέα πικρον.

Persica arbor.

Pfersichbaum.

Primo floret vere.

Folia amara excalefaciunt & resiccant, digerunt, viscerum obstructions aperiunt, ac purgandi potentiam obtinent.

Succus vermiculosis ac purulentis auribus utilis.

Flores aluum deijciunt, siccati & infusi mira facilitate humorem aqueum, ex vniuerso corpore per ven-

ss

trem

trem educunt, neque vllam
noxam inferunt.

Gummi aceto bullitum
illitu Lychenes & papulas
sanat.

Persica mala.

Περσικὰ μᾶλα, Diosc.

Pfersen.

Quadam rubent, alia au-
reo colore fulgent, alia vi-
rescunt.

Frigida sunt & humida
naturæ. Praui succi, facile a-
cescunt, & corrumpuntur.
Ventriculum refrigerant,
phlegma generat copiosum,
ac putres febres excitant.

Sicca aluum cohibent, Al-
ui stomachique fluxiones si-
stunt.

Nuclei persicorum ape-
riunt, extergunt, vrinas pro-
uocant, somnum conciliant.

Gummi temperamento
mediocre, substantia lentum
ac glutinosum, tenuium hu-
morum acrimoniam obtun-
dit. Hæmoptoisi, Phthisi,
raucedini medetur & calcu-
losis confert.

*Persicus Armeniaca
maior.*

Μυρτα Ἀρμενικὰ.

Johannis Pfersingbaum.
Marillenbaum.

*Persica Armeniaca
maiora.*

Περσικὰ πρᾶκόνικα.

Persica præcocia.

Sommerpfersfen.

Goldtpferssing.

Marillen.

Mallilen.

Johannis Pfersfen.

E genere sunt persicorum.

Maturescunt ineunte æ-
state.

Eiusdem naturæ & dotis
cum Persicis sunt, minus ta-
men humida: suauiora, de-
lectabiliora, stomacho gra-
tiora.

Minus nocent ventriculo,
nec tā facile corrumpuntur.

*Persica Armeniaca
minora.*

Armeniaca minora.

Kleine Marillen.

Salbe Sommerpfer sing.

Minora sunt, coloris au-
rei subrutilantis & odoris
iucundi.

Nuclei amaricant, abster-
gunt, vrinas prouocant, cal-
culosis salutare.

Ex his elicitur aqua con-
tra calculum & vrinæ reten-
tionem magnæ utilitatis.

*Peucedanum Germa-
nicum.*

Fœnicu-

Fœniculum Porcinū, Lob.

Πουκέδανον.

Haarstrang.

Radix crassa succum fundit flauum odoris grauis & fœtētis.

Excalef. sicc. attenuat, incidit, digerit, ventrem emollit, Lienem absorbit, difficiles partus extrahit. Facit ad vesicæ cruciatus & Renum distentiones potum.

Phalangium ramosum.

Φαλάγγιον, Diosc.

Crinagrostis.

Lilium gramineum.

Asphodeli sylu. species.

Graslhilgen.

Erdspinnen fraut.

Weisser Wiederrhon.

Saporem habet glutinosum & nauseosum aliquantum. Naturæ siccantis & penetrantis, potum phalangionum icibus, ventrisque torminibus medetur.

Phalaris.

Gramen Canariense.

Φαλαρίς, Diosc.

Canarien sahmen.

Semen Luteolis Canariensis gratum: In siccis fomentis Milij vsum habet.

Etiā contra calculum farctusq; vesicæ vsurpatur.

Phasiolus vulgaris.

Σμίλαξ κηραία, Diosc. Aduersf.

Smilax hortensis.

Faba Turcica multicolor.

Dolichus, Hippoc.

Türkische oder Welsche bohnen.

Saseln.

Seritur ad Topiariorum ornamenta.

Gaudet pingui & aprico solo.

Augusto maturescunt.

Multa inueniuntur Phasiolorum genera flore & semine variantia.

Nivei, Weisse.

Flauescētes, gelbe Bohnē.

Rubei, rote Bohnen.

Ex Cœruleo nigricantes, blawe Bohnen.

Cinerei, aschgraw Bohnē.

Alij sunt variegati, gescheckte Bohnen.

Siliquæ integræ teneræ elixatæ cum butyro, pipere longo, galanga, Zinzibere in cibum veniunt.

Candidi adduntur fucis, quibus mulieres faciē concinnant.

Excalefaciunt & humectant 1°. Aluum emolliunt, pectus dilatant, ventriculo laborem faciunt, bruta & terrifica insomnia gignunt,

Ss 2 sanguis

sanguinemque Melancholicum procreant.

Piper Indicum.

Καλινδρ, *Actuar.*

Piperitis seu Siliquastrum Peruvianum, *Cord.*

Capicum, *Clus.*

Piper Siliquis oblongis recuruis.

Calecutischer Pfeffer.

Schotten Pfeffer.

In hortis & fœtilibus Augusto floret.

Excalefac. & siccant. 4. gradu. Vrit valenter & exulcerat corpus admotum recens.

Vulgus vititur loco piperis cum pane tostato pulu. verum maligni quid obtinet.

Pistacius Germanica.

Σταφυλίδενδρον.

Staphylo dendron, *Dod.*

Nux vesicaria.

Pimpernüssle.

Elegantiae causa potius quam utilitatis in hortos venit, cum nuxes non sint edules, nauseam excitent, & ventriculum perturbent.

Pisum vulgatius maius.

Πίχος.

Λίχουρος.

Pisum hortorum.

Pisum maius, *Martiel.*

Welsche Erbsen.

Büschel Erbsen.

Garten Erbsen.

Terram desiderat facilem ac solutam, à frigore citò offenditur.

Exicc. refrig. detergit & minus flatulentum est.

Recens decoctum cum vaginalis delitiae sunt palato.

Pisum hortor. angulosum.

Pisum quadratum *Plin.*

Tabern.

Pisum angulosum hortor.

Aduers.

Pisum Romanum.

Römische Erbsen.

Stock Erbsen.

Gasel Erbsen.

Semen in siliquis, angulosa est & quadrata corporatura. Cicere maius medio-crem fabam æquat ruffo colore.

Minus frequens in hortis ob gustum minus gratum, nonnihil amaricantem Ciceris.

Calef. siccant, aperit, abstergit.

Decoctum ex iure pingui add. Macis & Rosmar. puerperas à partu purgat. Auriginosos sanat, & incipientibus Hydropicis succurrit.

Pisum

Pisum arvense.

Πίσον.

Pisum minus, *Mattiol.*Pisum minus ex luteo vire-
scens, *Aduers.*In agris minori cultu se-
ritur.Vix vllum legumen in cu-
linis frequentius.Maioribus delicatesiores &
pinguiore, citius elixantur,
& facilius concoquantur. A-
lunt, multumque nutriunt,
præsertim corpora valentio-
ra, qualia sunt Agricolarum,
sed status procreant, stoma-
cho & capiti onerosa.*Pisa leptoloba.*

Pisa cortice edibili.

Dünne subtilheutige Erb-
sen.Hæc simul cum folliculis
eduntur.*Pisum cordatum, Aduers.*

Καρδισπιμον.

Halicacabus peregrinus,
*Dodon.*Vesicaria seu Halicacabus
repens.Concordia *Simleri.*

Hertzshmen.

Münchsöpfflin.

Schwarze oder Welsche
Schoten.

Ad topiaria seritur.

Semen ad cordis affectus
valere creditur.*Plantago rosea.*

Plantago multiplex.

Blumen Wegerich.

Gefülter Wegerich.

Voluptatis ergo in hortos
recipitur. Eiusdem cum
plantagine latifolia vsus.*Poma amoræ.*Aurea Mala, *Dod.*Pomum Indum, *Mediolan.*

Solanum pomiferum.

Goldöpfel.

Lieböpfel.

Poma autumnno mature-
scunt, hyeme perit vniuersa
planta, tetrum halat spiri-
tum, frigida & humida na-
tura.Nonnulli esitant poma,
non secus ac Melones. Cor-
pori alimentum exiguum,
prauum ac vitiosum.Succus Erisypelati, igni-
bus sacris & alijs calidis flu-
xib. vehementer obluatur.*Porrus capitatum.*Πράσον κεφαλατὸν, *Diosc.*Porrus, *Pallad.*

Cepa sterilis.

Lauch.

Lenschel.

Ss 3

Sapor

Sapor & facultas cepæ fed-
mitior.

Inflat, noxium succū creat,
tumultuosum somnium pa-
rit. Oculis nocet & calidior-
es ac biliosiores naturas of-
fendit.

Portulaca.

*Ανδράχυν, Diosc.

Portulaca domestica.

Burzelkraut.

Partim in hortis ab olito-
ribus feritur. Estur in ace-
tarijs. Refrigerat 3. hume-
stat 2. gradu, viscosum et-
iam quid obtinet. Succum
gignit modicum, eumq; fri-
gidum, humidum & gluti-
nosum.

Commanducata hæmo-
diam dentium sedat à rebus
acidis & acribus.

Succus stomachi & inte-
stinorum astuationem & flu-
xiones mulcet. Linguae fis-
suras in Febribus mirificè
sanat & sitim mitigat.

Prunus domestica.

Κοκκυμλία, Diosc.

Pflaumenbaum.

Floret Maij initio.

Folia refrig. exiccant, ad-
stringunt. In vino decocta
collutu, Oris, faucium & ton-
sillarū fluxiones reprimunt.

Prunorum Gummi.

Pflaumbartz.

Potum ex vino calculos
comminuit.

Prunorum multiplex dif-
ferentia.

Pruna Hungarica maiora.

Pruna Brunensia, Pruna
pannonica.

Brunner Pflaumen.

Ungrische Pflaumen.

Omnium sunt præstantis-
sima, Ori grata, in cibo &
medicina conuenientia, ven-
triculum mediocriter refri-
gerant, bilem leniunt eius-
que acrimoniā obtundunt,
Aluum molliunt.

*Pruna Hungarica mi-
nora.*

Tzwetschfen.

Kleine Pflaumen.

Dulcia sunt & ori gratio-
ra. Resiccata & decocta ven-
triculo grata, Aluum emol-
liunt.

Pruna asinaria.

Rosspflaumen.

Magna sunt, rubore per-
fusa, viliora.

Pruna cerea minora.

Pruna cerea præcocia.

Geele Pflaumen.

Geele

Gele Spillinge.

Aluum subducunt recentia. Nimiustamen eius ventriculum grauat, & humores putredine obnoxios gignunt, vnde dysenteria & febres putridæ nascuntur.

Siccata aluum sistunt, & dysenteria cœliacisq̃ue profunt.

*Pruna cerea maiora.**Moraunen.**Maruncen.*

Hortis instructioribus saltem nota.

Maxima sunt, eiusdem naturæ cum minoribus.

Prunidactyla.

Pruna oblonga & cœrulea.

*Blawe lange Pflaumen.**Bilsen Pflaumen.**Blawe Spillinge.**Blawe Maruncen.*

Ex semine prunorum cœreorum maiorum nascuntur.

*Pruna canina.**Hunds pfeumlin.**Weisse pfeumlein.*

Parua sunt pallida, nonnihil rubentia.

Dulcia sunt.

*Pruna parua autumnalia.**Pruna serotina.**Pruna Auenaria.**Herbstpflaumen.**Briechen/ sil.**Zipparten.*

Minora sunt & cœrulea.

Hortis Rusticorum nihil frequentius: Ex quibus additâ farinâ edulia parantur haud ingrata.

Salubria putantur, & visceribus vtilia, verum recentium vsus nimius Dysenteriam procreare solet.

*Pruna parua vinosa.**Weinpfeumlin.**Tarrnickel/ Vulgè.*

Viridia sunt, vinosi saporis.

Condiuntur saccharo febricitantibus grata.

*Psyllium Herbarijs.**Pulicaris herba, Lobel.**Ψύλλιον, Diosc. Gal.**Psillienkraut.**Glöbkraut.*

Refrig. humectat, emollit, inspissat.

Muccago ad calidas defluxiones valet, Sitim extinguit, laeuigat linguam, & faucium scabritiem in ardentissimis febribus.

Pyrethrum.

Περὶθρον, Diosc. à seruido sapore ignea vi vrente.

Pyre-

Pyrethrum Officin. Lob.

Saluaris herba.

Dentaria.

Bertram.

Geisewurtz.

Speichelwurtz.

Flos ei bellidis maioris
feu chamæleontis albi. Nus-
piam in hisce montibus oc-
currit, sed aliunde affertur,
& hortensis est planta: sæpe
in millefolium degenerauit.
Quidam decepti nomine
Bedram, quod Valerianam
syluestrem sonat: in Sudetis
montibus sponte prouenire
scripserunt.

Radix calida vehementer
cum adurenti acrimonia.

Manfa pituitam elicit.
Dentium cruciatum placat,
& scorbutum sanat.

Miscetur Antidotis.

Pyrus sativa urbana.

Amos Diosc.

Birnenbaum.

Pyra.

Amos, Birnen.

Pyra omnia frigida. Adest
& omnibus adstringendi
quædam ac terrena substan-
tia. Alimentum amplius &
copiosius quàm Mala s. Po-
ma conferunt, sed hoc ipsum
frigidum ac reprobum.

Qui flatibus obnoxij sunt,

non ab esu Pyrorum modo,
sed etiam crudorum omni-
um abstinere debent, vt quæ
flatu gignant.

Cocta, flatu deponunt,
gratiora & salubriora cen-
sentur, præsertim cum dis-
cutientibus flatu.

Magnam varietatem dili-
gentia Hortulanorum pe-
perit.

Pyrum *ἀμύριον, ὄξυς*.

Pyra præcocia Früebirnen.

Pyra Auenaria Haberbir-
nen.

Pyra farinacea Meelbir-
nen.

Pyra Mariana Margen-
birnen.

Pyra Moschatellina Mus-
catellerbirnen.

Pyra Mellea (Melapia)
Honigbirnen.

Saccharapia Zuckerbirnen.

Pyra Lardina Speckbir-
nen.

Pyra Nobilium Jungfer-
birnen.

Pyra Hyemalia, serotina
Winterbirnen.

Pyra olsea Steinbirnen.

Pyra stragulatoria Streng-
lunge/würgende Birnen/Ris-
terbirn.

Pyra adiposa Schmeera-
birnen.

Hydrapia Wasserbirnen.

Pyra

Pyra coccineo succo & aspectu mitantia Blutbirnen.

Quinquefolium luteum erectum.

Πεντάφυλλον Theoph.

Quinquefolium Theoph. maius Tabern.

Pentaphyllon vulgare Lob.

Geel auffstehend Fünfffingerfraut.

Gros geel Fünfffingerfraut.

Eiusdem cum sylu. facultatis.

Quinquefolium erectum album.

Quinquefolium maius album Lob.

Pentaphyllon albū Theoph.

Gros weis Fünfffingerfraut.

Quinquefolium flore Alchimilla.

Heptaphyllon montanū.

Stellaria argentea Matt.

Argentaria petræa Gesn.

Alb Fünfffingerfraut.

Berg Sinnaw.

Ad vulnera glutinanda efficax.

Ranunculus albus multiflorus.

Ranunculus niueus polyanthos Lob.

Ranunculus coronarius albus.

Gefülter weisser Ranensfuß.
Weisse Brantz Schmirgeln.

Ranunculus luteus multiplex.

Ranunculus dulcis multiflorus 4 Tabern.

Ranunculus syluest. 2. flore multiplicato Dod.

Gefülter Ranensfuß.

Geel tausentschön.

Blein Kuckerzu.

Maio, Iunio & Iulio foliorum denso stipatu collucescit.

Reptante coliculo se propagat.

Raphanus rotundus.

Ῥαφανὶς ῥοῦν καὶ ῥαφανὶς Diosc.

Raphanus magnus Aduers. Kettich.

Konder Kettich.

Post æstatis solstitium Iunio & Iulio commodissime feritur.

Raphanus acerrimus est, Ori suavis sed stomacho inimicus, concoctu difficilis, flatu gignit, ructus & vrinam ciet, aluum emollit, pituitam extenuat. Calefac. 3. siccatur.

Tt

2. gra-

2. grad. In cineribus decoctus, expressus succus cum melle vel saccharo candi contra veterem tussim & pituitæ crassitiem in pectore efficax.

Salutaris contra fungorum venena.

Obsoni potius, quàm nutrimenti nomine vescimur crudo minutim conciso cum salis pauxillo.

Radix cum sale trita in malignis febribus sub pedibus ligatur.

Raphanus longus.

Raphanus vulgaris *Gesn.*

Radicula sativa minor *Dodon.*

Langer Kettich.

Süßer Kettich.

Vt minor sic esu suauior. Multum enim acredine illa ac soporis vehementia recedit, & salugine imbutus linguam vsq; adeò non vellicat.

Appetitum excitat primis mensis sumtus.

Succus Asthmaticis & calculosis utilis.

Raphanus sessilis.

Raphanus orbiculatus minor.

Klein Scheibel Kettich.

Blein Beulichter Kettich.

Delicatioꝛ cæteris Vratiflauræ ab Olitoribus in foro venum fertur.

Raphanus rusticanus.

Ῥαφανὶς ἀγρία Dod.

Raphanus magnus *Dod.*

Raphanus marinus *Gesn.*

Thlaspi maius *Cord.*

Armoracia *Plin.*

Meerrettich.

Breen.

Passim humidis & umbrosis hortorum locis. Extremæ planè est acredinis. Aperit, pellit, incidit, prouocat, attenuat, abstergit.

Teritur cum vino, aceto & melle condimenti vice.

Appetentiam facit. Verum caput lædit & nidorosas eructationes mouet. Biliosis & caput dolentibus noxius.

Vrinam & arenas valenter pellit, Menstrua prouocat.

Rapum longum vulgatum.

Ῥαπὺν *Diosc.*

Ῥαπυρίς.

Rapum oblongius *Dod.*

Rapum tereti, rotunda oblongaq; radice *Lob.*

Küben.

Lange stopffel Küben.

Vbiuis notissimum.

Seri-

Seritur post demessam segetem. Terrā postulat mediocrem & solutam.

Culinis notissimum, Calefac. humect.

Elixa radix alit, sed flatus gignit, humentem ac mollem carnem creat, fauces lenit atque thoracem.

Raporum assator. succus cum saccharo, ad tussim infantium vsus non contemnendi.

Semen calidum, siccum, nonnihil amarum.

Abstergit, aperit, prouocat.

Valet ad faciliorem, Scabiei, Morbillorum & Variolarum eruptionem. Nam humores ad cutim propellit 3j. pondere potum. Miscetur Antidotis.

Rapum orbiculatum.

Rapum orbiculatum, scil. turbinatum maius, *Aduers.*

Rapum rotundum s. fessile, *Mattiol.*

Runde Rüben.

Rapi sub cinere calente assifimus orbiculus calidissimus, post aures applicitus magna efficacia reuellit, capitisque & dentium dolores citissimè sedat magno secreto.

Rapum sylvestre.

Rapaceum semen.

Gelsamen.

Autumno seritur feminis causa. Aprili floret, succrescente semine copiosissimo.

Ex semine oleum extunditur, pauperum culinis inferuiens.

Auiculæ eo pascuntur etiā.

Reseda Plinij.

Reseda lutea.

Eruca peregrina.

Welscher Rauken.

Tota gustu & nonnulla tenui acrimonia adstringit.

Ribes satium.

Ribes vulgare, *Matt.*

Ribesum fructu minore.

Johannis treublin.

Frutex sepiendis hortorum puluini idoneus.

Flosculi ex herbaceo pallidi: fructus racematim dependent circa solstitium rubentes, subacidi saporis, sylvestribus minores. Sapore acidiusculo astuantem stomachum refrigerant & sitim febricitantibus restinguunt.

Ricinus maior.

Hebræis *Kindor.*

Geranium regium.

Tt 2

Palma

Palma Christi.

Cataputia maior, *Officin.*

Kλη, Diosc. κρότων.

Grosser Wunderbaum.

Zeckenbaum.

Römischer Hanff / *Vulg.*

Species videtur Tithymalli.

Semen in viridarijs Autumno maturescit, planta frigoris impatientissima.

Semen calefac. siccat, expurgat, detergit, digerit pituitam, bilem aquamq; per aluum extrahit, vomitum mouet, sed ventriculum vehementer subuertit.

Hanc fuisse stirpem à Deo preparatam pro vmbraculo Ionæ prophetæ, ostendunt Benedictus Ariamontanus & alij.

Ricinus minor.

Cherua minor.

Klein Wunderbaum.

Abrahams baum.

Rosa candida.

**Ρόδον, ὡς ῥόδον ὀδμήν,* quod largum odoris fluuiū emittat.

Rosa albicans, *Matt.*

Rosa vulgarissima.

Weisse Rosen.

Weisse Garten Rosen.

Hortis nota. Iulio flores promit.

Refrigerat, adstringit. Cor ventriculum, Iecur & renetricem facultatem roborat.

Præstat cæteris ad aquæ destillationem, quæ ex hac odoratissima colligitur.

Rosa suauè rubens.

Rosa lacteola.

Rosa Strigensis.

Strigische Rosen / *vulgò.*

Hæc candore & rubore confusis rutilat, virgineis genis & malis concolor.

In hortis circa Strigam oppidum frequens, placet odore & colore.

Rosa Moschata.

Rosa Muscata.

Rosa Syriaca.

Muscat Rosen.

Biesen Rosen.

Minor est, candida, fragrantia commendatione in hortis instructoribus nota.

Aluum iucundius ciet & animi deliquia, stomachi cordisque lincinationes accersit.

Rosa incarnata maior.

Rosa Damascena, *Lob.*

Rosa Alexandrina, *Gesn.*

Rosa prouincialis maior.

Damascenische Rosen.

Prouinz Rosen / ab Agendico;

dico, vulg. Prouins.

Oppido Campaniæ in Gallia.

Leibfarbige Rosen.

Ad vsum Medicum hortis fiunt familiares.

Præferuntur cæteris ad syrûpi Rosati solutiui confessionem.

Condiuntur etiam flores saccharo.

Rosa incarnata minor.

Rosa Damascena minor.

Rosa præcox.

Pfingst-Röselin.

Türkische Röselin.

Flores purpurei Damascenis similes; verum minores in cauliculis tricubitalibus rubentib⁹, totis spinosis.

Circa Pentecostes festum floret.

Rosa Cinnamomea.

Rosa de canelle, Lob.

Rosa Mariana.

Öivôççodor.

Simmet Röselin.

Canell Röselin.

WeinRöselin.

Foliolis sunt omnium minimis.

Rosa lutea.

Rosa aureo colore, Matt.

Rosa Agyptia seu Affricana.

Gele Rosen.

Rosæ inodoræ sunt, folia fruticis odorata.

Rosa rubra plena.

Rosa intensè rubens.

Rosa rubra.

Rosa muricata.

Rote Rosen.

Blutrote Rosen.

Rosarum omnium præstantissima & ad medicamenta omnis ferè generis vtilissima.

Plus habent terrenæ substantiæ & resiccantis adstringentisq; facultatis.

Robur cordi conciliant, ac tremori & palpitationi eius succurrunt, ventriculum, Hepar, renes & alia viscera confirmant, Sanguinis vnde quaq; eruptiones sistunt, sudores reprimunt.

Antidotis miscentur.

Rosa in rubro nigricans.

Rosa carbonaria.

Sametrosen.

Kolrosen.

Eiusdem vt prior facultatis.

Rosmarinū Coronarium.

Αἰθαντὶς στεφανωµατικὴ Diosc.

Rosmarinus Coronaria Mattioli.

Tt 3

Liba-

Libanotis coronalis.

Rosmarin.

Omnibus ferè hortis notum, cum ad coronas, tum ad culinarium vsum.

Maio crescente lunâ surculi è cacumine decerpti & terræ immissi facillè radices agunt. Quæ in re valde industriæ sunt mulierculæ Leobergenes.

Interim tamen vitandus Martius Sol, & paulatim cœlo vmbroso primùm committendus, donec radículas egerit.

In vicina loca, Bohemiam & Misniam magno earum lucro deferri solet.

Floret primo vere & Autumno.

Fragrantissimi est odoris. Excalescit, siccatur, attenuatur, digerit, resoluit, aperit, roborat, incidit, abstergit, venenis repugnat, sanguinem purgat.

Ad Capitis affectus mirè efficax, præsentaneam vim obtinet in expurgando morbo regio.

Omnes Vteri diuturnos fluxus sistit.

Odor animum reficit, præsertim Balsamus eius, naribus illitus, Cerebrum & omnes sensus languentes reficit.

Liquor stillatitius Ceruici illitus verriginem & dolores capitis tollit.

Rubia sativa.

Ῥοῦβις σατινὴ Diosc.

Rubia maior *Aduers.*

Rubia tinctorum *Officin.*

Rôte vulgò.

Serber Rôte.

Solum amat pingue: quale in agro Vratislaviensi.

Sapor ei acerbus cum exigua quadam dulcedine, quam acerbæ & adstringens mox excipit qualitas.

Iecur & Lienem extergit, vrinam trahit crassam.

Radices tingendis lanis aptissimæ.

Herba, vasa ex plumbo candida extergit.

Ruscus.

Ῥοῦσκον Diosc.

Myrtacanthæ Aduers.

Myrtacantha *Aduers.*

Ruscum *Dod.*

Bruscus *Offic.*

Ruscen.

Bruscen.

Myrtendorn.

Radix viuacissima est, multos annos perennat. Aromatica, aliquantû amara.

Semen calculum frangit.

Cauliculi recentes Asparago-

ragorum vice in acetarijs
fumuntur.

Ruta domestica.

Πράνον Diosc. πρὸς τὸ μὴ γένει
τὸ γόνιμ' à contrahendo & co-
gendo.

*Pulu à εὐεδοῖς, à præseruan-
do & custodiendo, quòd ve-
nera arceat.

Ruta sativa maior seu la-
tifolia.

Samraute.

Rauten.

Hortis familiaris. Iulio &
Augusto floret.

Grauis est odor, gustu a-
cri & amaro: tenuium par-
tium, crassos lentosq; hu-
mores incidit & attenuat.

Facit ad lateris thoracisq;
dolores, spirandi difficulta-
tem, tusses, pulmonis in-
flammationem, Coxendi-
cum & Articulorum crucia-
tus, Hydropicis auxiliatur.

Semen lethaliū vene-
norum antidotum.

Ruta leptophyllos.

Ruta tenerior.

Wein Rauten.

Folia sunt teneriora & an-
gustiora.

Olfactu cum aceto Epi-
lepticos & feminas utero
strangulatas excitat.

Sabina femina.

Βράδυσ, Dioscor.

Sabina genuina.

Sabina Baccifera.

Sabina Mattioli.

Sadelbaum / Sil.

Sadenbaum.

Sagbaum.

Seuenbaum.

Sebenbaum.

Semper viret, tenuis ef-
fentia.

Excalefac. siccatur, gustu a-
maro, acri, adstringente:
Urinam ducit, Menfes pro-
uocat, & si quid aliud, ab-
ortus facit.

Folia pulu. cum butyro
bubulo illita Achores in ca-
pitibus puerorum sanant.

Ex melle & butyro Asth-
maticis medentur.

Sabina hirsutior s. mas.

Βράδυσ 2. Diosc.

Sabina humilis folio Ta-
maricis.

Sabina vulgatiore, Lobel.

Sabina sterilis, Matt.

Sadelbaum mennlin.

Folia huic Tamaricis, sed
rigidiora, pungentia, tetrum
odorem halant, perpetuoq;
virent.

Valenter excalefac. sic-
cat, digerit, resoluit, aperit,
abster-

abstergit, prouocat, parum-
que adstringit.

Salvia maior.

Salvia latifolia, Trag.

Salvia, quod multis sit salutaris.

Salvia maior scabrior,

Aduers.

Ἑλίσσακος, Diosc.

Grosse Salbey.

Saluien.

Floret Maij fine & Iunio.

Durat per hyemem.

Semine & surculis feritur.

Euidenter calefac. siccatur
& leuiter adstringit.

Salvia capiti & cerebro
omnibusque pituitosis affe-
ctibus utilis.

In vino pota venenum o-
mne expellit, tussim miti-
gat, pleuresi medetur: Iecur
& Matricem excalefacit, v-
rinam & Menstrua ducit.

Sensuum ac memoriae vim
intendit, neruos roborat.

Salvia minor pinnata.

Σπάκελος, Theoph. à tabe seu
syderatione.

Salvia auricularis.

Salvia nobilis, gentilis seu
minuta, Romana.

Creutz Salbey.

Edle Salbey.

Spitze Salbey.

Præstantior & nobilior

maiori æstimatur, eiusdem
facultatis.

Salvia syluestris.

Scorodotis, Plin.

Salvia agrestis, Officin.

Salvia bosci.

Scorodonia 1. Scordium
montanum Cord. Thal.

Wald Salbey,

Wild Salbey.

Hic hortensis; alibi spon-
tanea.

Odorē habet scordij non-
nihil Teucrij referentem.

Satureia perennis.

Θύμρα, Diosc.

Satureia seu Thymbra 2.

Lobel.

Thymbra vera, Dodon.

Hyssopus vera, Guil.

Saturey.

Sedeney.

Demuth.

Gustu est acris, odorata.
Cibis magnam gratiam ad-
dit. Eadem quæ Thymus
præstare valet.

Satureia vulgaris.

Satureia hort. *Aduers.*

Hyssopus Ceparius.

Pipirella.

Pfefferfrant/ Sil.

Zwiebel Zsop.

Acris est, odoris iucundi.

Coqui-

Coquitur cum carnibus & piscibus.

Calefac. sicc. incidit, discutit flatus, appetentiam excitat, ventriculum calefacit, hebetes oculos exacuit, venerem stimulat, & vteri ex flatu strangulatus mox sedat.

Satyrium Erythronium.

Dens caninus, Dod.

Dentali I. Clus. P.

Pseudohermodactylus, Matt. Cam.

Schoenwurz.

Rote Stendelwurz.

Maio floret H. M.

Calefacit & hum. mediocriter. Sapor est dulcis non ingratus Ori. Libidinem excitat.

Scabiosa Hispanica I.

Scabiosa peregrina folijs non dissectis, Tab.

Grembd Scabiosen.

Scabiosa Hispanica II.

Scabiosa Hispanica maior, Clus.

Scabiosa maior alba, Tab.

Spanische Scabiosen.

Scolymus.

Vide Artichocus.

Scorpioides Plinij.

Σκορπιος, Plin.

Scorpioides folio Bupleuri.

Scorpioides repens folio Bupleuri, Advers.

Raupenfraut.

Circa æstium solstitium flores exeunt, semen succrescit Galegæ in corniculis filiquosis scorpionis caudæ imitatur reflexis.

Gustu est trifolij pratensis.

Scorzonera Hispanica.

Scorzonera s. viperaria, Lobel.

Scurzonera latifolia sinuata.

Spanisch Gifftraut.

Ex horto Imperatoris Praga hanc habeo, quæ Iunio & Iulio flores promit.

Radix gustu dulcis & iucunda.

Foliorum, radicum & succus præsentaneo remedio potandus datur aduersus viperarum cæterorumque animalium ictus: quin etiam ad quoscunque pestiferos morbos. Conserua in febribus Epidemicis capitifque vertiginosis affectibus utilissima.

Secale Herbariorum.

Ρείζα, Ρεύζα, Gal.

Rogga, Dodon.

Vu

Siligo

Siligo veterum, *Trag.*

Korn.

Rocken / Rockenforn.

Secale vernum, biennale,
Aprili teritur.

Sommerforn / Minore stipula, culmis, spica, grano, & ad alendum efficacia.

Secale Hybernum, Autumnale, Winterforn.

Robustius est, maius, & vegetius.

Quocunque solo nascitur, Iunio floret, Augusto metitur. Nullum granum frequentius fabulosis & macilentis agris ad Panificium feritur, quam secale.

Refriger, humectat, emolliat, abstersione non vacans, pus mouet, vnde cataplasmatibus ad id destinatis, farina commodè miscetur.

Confusanea farina diuturniores capitis dolores lenit, in linteo capiti circumligata.

Panis Secalinus, Secalicius.

Ἀρτος σικαλίδος.

Rockenbrod / Hausbrod.

Temperata est naturæ, minus quam Triticeus calefacit, plus quam Hordeaceus. Optime nutrit atque satiat, nec adeò facile aëre exuccus & aridus redditur, atq; is qui ex Tritico & Spel-

ta conficitur. Alimentum corpori præstat solidum, firmum ac laudabile; præsertim si ex bono frumento coctus fuerit.

Secale luxurians.

Mater secalis, *Thal.*

Clauis filiginis, *Lonic.*

Rockenmutter.

Neelmutter.

Ex succi abundantia fortè nascitur. Sanguinem sistere vulgus credit.

Sedum stellatum.

Aizoum stellatum.

Aizoum peregrinū, *Cam.*

Thelephium, *Nonn.*

Gestirnter Wintergrün.

Vulneribus vtile.

Sinapi sativum I.

Sium.

Sinapi rapicea fronde,

Mattiol.

Sinapi sat. Erucæ aut Rapi-folio, *Aduers.*

Geeler oder roter Senff.

Iulio & Augusto semen maturum quod acerrimi saporis. Calefac. & sicc. vehementer, extenuat, incidit, extrahit.

Mansum pituitam capitis elicit, comitialibus auxiliatur, adiuuat concoctionem & dis-

& distributionem Ciborum
crassarum partium.

Sinapi satium I I.

Sium agreste Apij aut po-
tius Laueris folio Lob.

Sinapi luteum satium 2.

Trag.

Wilder Senff.

Geeler Senff.

Semen cum Melle & Mu-
sto ad intinctus hyberno
tempore commodum.

Sisarum Peruvianum.

Papar Hispanorum.

Solanum tuberosa radice.

Tartufole Quibusdam.

Indianische Zuckerwurtzel.

Lieböpfel.

Grüblingbaum.

Floret Augusti fine: Au-
tumno poma fert.

Radicem sub cineribus as-
sam nonnulli tuborum mo-
do esitant.

Solanum Halicacabum.

Ἡλικακάβος Diosc.

Solanum vesicarium Dod.

Halicacabum vulgare.

Alkekengi Officin.

JüdenKirschen.

BlasenKirschen.

Erdbirschen.

Fructus miniatus in folli-
culo rubenti & leuiter tur-
binato haret.

Locis vmbrosis aliquan-
tum humentibus delectatur.
Iunio fleret, Septembri
maturefcit fructus.

Baccæ ad Renum vitia &
lotium ciendum eiusq; acri-
moniam obtundendam præ-
stantissimæ. Morbum regi-
um expurgant: Calculosis,
Podagricis, Hydropicis,
Asthmaticis proficua.

*Solanum Indicum pul-
chrum.*

Flos Mexiocanus Dod.

Marabillas de Peru. Clus.

Magnæ admirationis her-
ba Peruviana.

Mandragora Theoph.

Casalp.

Wunderblumen.

Geschechte Indianische
Nieglin.

Florum elegancia hortos
exornat Septembri. Causti-
ca est planta. Radicem val-
de discutere tumores frigi-
dos Historia stirpium Lug-
dunensis annotauit.

*Solanum Indicum ru-
brum.*

Isaminum rubrum Lugdun.

Viola Peruviana rubra.

Spanischer Anstrich.

In hortis & fœtibus: sed

V u a hyc-

hyeme perit, nisi intra ædes
reponatur.

Solanum Indicum
album.

Gelsiminum Indicum al-
bo flore.

Weisse Indianische Neglin.
Quandoq; luteum florem
exhibet.

Solanum frutescens.

Solanum Americum
Dalech.

Στοχάδιστος Gesn.

Pseudocapsicum Dod.

Amomum Plin. Lob.

Baumichter Nachtschatten.

In viretis & pensilibus
hortis elegantiæ causa alitur.

Facultas eius nondum ex-
plorata.

Solanum Pomiferum.

Mala Aethiopica Dod.

Mohrenäpfel.

In fictilibus.

Sorgho.

Sorgo Melica Ital.

Sorgum Tabern.

Milium Indicum Mattiol.

Sorgsamen.

Welscher Hirse.

Spestandi causâ seritur in
viridarijs.

Stœchas Arabicum.

A Stœchadibus insulis è
regione Massiliæ sitis.

Στάχας Diosc.

Stichas Arabum Cord.

Sticados, stœchados Offic.

Stœchesfraut.

Ex semine nascitur, sed
difficulter.

Calefacientis & siccantis
naturæ, Cerebrum, nervos
& sensuum organa mundat
ac roborat.

Antidotis miscetur.

Syringa alba.

Σβεργ.

Syringa flore albo odo-
rato.

Philadelphus.

Syringabaum / Spani-
scher Holunder sil.

Pfeiffenbaum.

Frutex est coronarius. Iu-
nio floret & Iulio.

Syringa cœrulea.

Syringa Lusitanica.

Lillach Dod.

Blauer Syringebaum.

Spanischer Pfeiffenbaum.

Flores dilute cœrulei Ma-
io viridaria exornant.

Squilla.

Squilla Mattiol.

Cepa Marina Lob.

Σκίλλα, à σκίδναι, ab infe-
stando,

stando, seu molestando.

Meerzwibel.

Meusezwibel.

Radice rubra & alba discernitur.

In fistilibus sabulo merfa folia promit languidiora; nec diu durat, utpote succo & pabulo consueto defraudata.

Squilla acris est & amara. Calefacit, siccatur, aperit, abstergit, incidit, subtiliat, extrahit, exulcerat. Stomachicis, Hydropicis, suspiriosis, Torminibus & Regio morbo subuenit. Tussi veteri laborantes & reuomentes iuuat. Ex melle sumta Comitialibus & resolutis auxiliatur.

Præstat assam aut elixam sumere.

Asa inuncta prodest verrucis & pernionibus. Cum pice illita ad canis morsus rabiemq; valet.

De aceto & Oxymelle Scillitico lege Galenum.

Tanacetum Anglicum.

Tanacetum speciosum cristatum Angl. *Tabern.*

Tanacetum odoratum.

Wolriczhender Keinfarn.

Odoratum est admodum.

Semen aduersus lumbricos datur pueris ex lacte, non frustrato successu.

Tatula.

Solanum spinosum *Tabern.*
Strammonium peregrinum *Auers.*

Nux Metella. *Matt.*

Schöpfel.

Zgelesolben.

Refriger. 3. siccatur sine 2. non carens perniciofa qualitate.

Teucrium.

Chamædrys maior.

Chamædrys legitima maior *Clus.*

Chamædrys vera mas *Fuch.*

Trissago.

Teucrium *Diosc.*

Je lenger je lieber.

Rechter Ehrenpreis.

Summertrost.

In hortis frutescit: difficile hyemem ferens.

Odoratum est cum amaritudine acrimonia cuiusdam particeps.

Thlaspi Creticum.

Thlaspi Iberidis folio *Lob.*

Drabæ aut Arabis aut

Thlaspi Candia *Dod.*

Thlaspi Candia umbellatum

Vu 3

tum

tum Iberidis folio Lobel.

Cretischer Bawern Senff.

Semen Augusto & Septembri maturum.

Acerrimi saporis. Calef. & siccans vehementer.

Thymus.

Serpillum Italicum Tr.

Δύμος οὐρανόπτερος Diosc. ἀπὸ τοῦ
δύειν ab excitando, quia animum
excitat.

Thymum durius Dod.

Thymell/Tymichen.

Welscher Quendell.

Calef. siccatur, aperit, urinam & Menses prouocat, viscera expurgat. Bilem atram & pituitam acremq; saniem euacuat.

Tythimalus Myrsinites.

Tithymalus Myrtifolius.

Esula Myrtifolia.

Μυρσίνη τὸ θυμάριος.

Myrten Wolffsmilch.

Vomitiones ciēt.

Tordylium maius.

Τορδύλιον, Diosc.

Seseli Creticum 2. Tab.

Caucalis maior.

Cretischer Sesel.

Æstiuālis planta.

Semen latum, rotundum clypeoli speciem refert, odoratum ac nonnihil acre,

Calidum & diureticum est. Augusto maturefcit.

Tordylium minus.

Seseli Creticum 1. Tabern.

Tordylium, Dodon.

Caucalis minor.

Candischer Sesel.

Semen calefac. siccatur, aperit, urinas prouocat.

Tragon.

Tragus, Mattioli.

Τράγος ἢ οὐρερίος.

Meerstachelkraut.

Scorpionkraut.

Crithmi Salicornij f. Kali congener planta.

Ad vsum Acetariorum se-ritur. Venenis aduersatur.

Tragopogon Purpureum.

Barbula hirci 2. Mattioli.

Tragopogon, Dodon.

Braun Bocksbart.

Blauer Morgenstern.

Radices rec. hyeme in acetarijs vtilis. Succus dulcis cohibet, firmat, & modice adstringit.

Trifolium bituminosum.

Τρίφυλλον ἀσφάλτιον, Diosc.

Trifolium Asphalthæum f. bituminosum.

Trifolium odoratum Plin. Aduers.

Gartze

Hartzflee.

Vniuersa planta odorem
bituminis Iudaici spirat.

Menses trahit & partus.
Venenatorum moribus suc-
currit.

Trifolium vesicarium.

Trifolium halicacabum.

Blasenflee.

In horto Dom. Laurent.
Scholtzj.

**Trifolium acetosum cor-
niculatum.**

Oxys flore luteo, Cl. p.

Oxys lutea corniculata
repens.

Geeler gehörnter Sauer-
flee.

Eiusdem cum Acetosa tri-
phylla facultatis.

Triticum hybernium.

Peeds, Dioscor.

Triticum, Dodon.

Siligo spica mutica, Lobel.

Robus, Colum.

Weitzen.

Winterweizen.

Solum amat pingue & la-
tius, minimè viginosum,
magis in planis quàm mon-
tosis campis, vbi plurimum
degenerat in Secale.

Triticum omne firmissi-
mi est alimenti, succumque

admodum crassum gignit.

Excalefacit ordine 1. fie-
cat, humectat non manife-
stè, quiddam lentoris habet
& obstruentis naturæ.

Panis Triticæus, ætos & bevos.

Weisbrod/Weizenbrod.

Semmel/vulgò.

Plus nutrit quàm cibarius,
laudabile ac plurimum nu-
trimenti corpori suggerit.

Viuimus arte, fouet nos omni tem-
pore Panis,

Nec sapiunt lauta, si sine Pane
dapes.

Cereuisia Triticæa, Weizen-
bier.

Ex Malto, additis paucio-
ribus Lupulis quàm in Hor-
deacea, per integrum annū
in vniuersa Silesia coquitur.

Plus calefacit & magis
nutrit, quàm Hordeacea,
minus penetrat, & si nō pro-
bè defæcata fuerit, crassos
flatus gignis & ventrē inflat.

Omnium præstantissima
Vratislauiensis, quæ vulgò
Schöps appellatur: dein
Suidnicensis, Stregomien-
sis, Lignicensis, Fridbergen-
sis, &c.

Fermentum excalefacit, tra-
hit, callos pedum, & furun-
culos cum sale, & tubercula
concoquit & aperit.

Fæces Triticææ cereuisiæ
illitæ

illitæ ambustis medentur
certo experimento.

Triticum aestiuum.

Triticum trimestre.

Olyra, Dodon.

Πυρός τριμηνίος.

Πυρός τριμηνίος, Diosc.

Setanium Colum.

Sommer Weizen.

Mansum & illitum canum
morsibus prodest.

Panis leuiorē cibum præ-
bet, & qui faciliē in membra
demandatur.

Triticum typhinum.

Triticum aristis circum-
vallatum, Lobel.

Typha cerealis, Dodon.

Gebarter Weizen.

Welscher Weizen.

*Triticum multiplici spicâ a-
ristis circumvallatum.*

Triticum multiplici spica,
Lobel.

Römischer Weizen.

Vielsährichter Weizen.

In horto meo.

Triticum lucidum.

Triticum lucidum Gallo-
belgarum.

Triticū lora Gallobelgis.

Simmelforn/ vulgò.

Semen est longiusculum,

lucidum. Spectaculi po-
tius quàm vtilitatis causa se-
ritur.

*Triticum Indicum au-
reum.*

Triticum Baſtrianū, Cord.

Milium Indicum Plin. Lob.

Mais Occidentalium.

Indianisch Korn.

Türkisch Weizen/ vulgò.

Maio satum maturat Se-
ptembri.

Colitur in hortis magis
oblectationis quàm panificij
causâ.

*Triticum Indicum
rubrum.*

Maizum Indicum rubrum.

Türkisch Korn.

Semen ex America pri-
mum allatum. In nutriendo
omnibus triticeis ipsoque
Secali & Hordeo longè est
inferius.

Tulipa lutea I.

A Dalmatico pileo, cuius
formam referre patens flos
videtur.

Ἀνθεὶς λευκὴ, Theoph.

Narcissus 6, Mattioli.

Lilionarcissus luteus, Lob.

Café, Lalé, id est, flos café.

Geeler Tulipan.

Gelbe Türkische Narcissen.

Ex Thra-

Ex Thracia ad nos translata, Aprili floret.

Tulipa lutea II.

Tulipa lutea polyanthos.
Geler Tulipan mit vielen blumen.

Tulipa purpurea pracox.

Lilionarcissus sanguineus puniceus ſue 2. *Lobel.*

Leibfarbener Türckischer Tulipan.

Tulipa pracox rubra.

Tulipa rubra.

Narcissus 5. *Mattiol.*

Lilionarcissus purpureus sanguineus.

Lilionarcissus puniceus ſue 5. *Lobel.*

Roter Türckischer Tulipan.

Tulipa rubella candidis oris.

Lilionarcissus rubellus, ntidus, candidis oris, *Lobel.*

Roter Tulipan mit weissen spizen.

Tulipa Bononiensis.

Narcissus 9. *Matt. Cam.*

Lilionarcissus Bononiensium.

Tulipa minor lutea Italica.

Welsch geel Narcissen *Liliē.*

Tulipa Bulbifera.

Lilionarcissus bulbum ferens. In horto meo.

Valeriana maior.

Nardus arvensis.

Pho, *Diosc.*

Phu ponticum f. maius.

Valeriana domestica.

Nardus sylvestris seu agrestis, *Trag.*

Theriacaria *Theoph. Paracels.*

Grosser Baldrian.

Spickwurtz.

Zebrfraut / *Sil.*

S. Georgen fraut.

Augenwurtz.

Wilder Nardus.

Passim in hortis vberri-
mē luxuriat radice supra ter-
ram eminente. Humectis
gaudet. Floret Iunio, Iulio.

Suaue olet nardum, sed
tantillum grauitatis mixtum
prodit.

Calefac. & siccāt 2. ape-
rit, attenuat, concoquit, pro-
uocat, vrinas & menses ciet.

Miscetur Antidotis, quod
venenatis bestiis & pesti re-
sistat. Pectoris viriis medetur.

Oculorum claritatem ad-
iuuat, si aqua eius oculis in-
stilletur.

Additur vulnerariis potio-
nib⁹ contra tabem vulgi ex-
perimentum.

xx

Vale-

Valeriana græca.

Phu græcum f. peregrinum, *Lugdun.*

Valeriana cœruleo flore.

Grembder Baldrian.

Hortorum exornat margines, in quibus plurima æstate floret.

Valeriana rubra.

Been rubrum *Herbar. Dod.*

Ocimastrum *Valerian-
thon, Lobel.*

Polemonij 2. species.

Roter Baldrian.

Radix acris est, & odorata.

Veronica recta.

Veronica assurgens maior.

Lyfimachia cœrulea hortensis, Lobel.

Lyfimachia Cœrulea, Dod.

Auffrecht stehender Ehrenpreis.

Iulio flores cœruleos spicatos egerit.

Viribus vulgari inferior.

Parcioris & rarioris usus.

Viola Mariana.

Γερβάν ἀγλά.

Medium, *Mattiol. Cam.*

Rapum sylu. *Diosc. Lugdun.*

Weis / braun Marien-
glöcklin.

Radix naturæ est frigida

& sicca cum adstringendi vi.
Æstate floret.

Viola Martia plena purpurea.

Ἰὼν δαρδανικὴ.

Viola Martia flore multiplici.

Viola purpurea multiplex.

Dolle blawe Veilathen.

Vivacissima est & radicibus sese propagat in hortis.

Vere & Autumno floret.

Minus odorata est & viribus sylvestri inferior.

Viola Martia plena albo flore.

Dolle weisse Nierzen Viole.
In horto meo.

Vitex.

Ἄγνος καὶ ἀβύσος, Diosc.

ἐλ. ἀβύσος, Theoph. Aduers.

Agnus castus, *Officin.*

Salix Americana.

Beuschbaum.

Beuschlamb.

Münchspfeffer.

Pfefferbaum.

Semen ijs, qui se à venereis pueros conservare cupiunt, accommodum. Liosis & venenatis ijsibus auxiliatur.

Calefacientis & siccantis naturæ.

Vitis.

*Vitis vinifera.**Ἀμπέλως οἰνοφύτης, Diosc.*

Vitis mansueta s. cultiva.

Weinrabe.

Weinstock.

In Silesia inferiori circa Crossenam, alibi minus frequens ob cœlum algidius.

Folia refriger. adstringunt potenter, acidum sapiunt. Aduersus hæmorrhagiam, Alui fluores, dysenterias, stomachi ardores commendantur.

Florum odor, cor & cerebrum recreat.

Cinis sarmentorum, τήφρα, Diosc. Kāb asche/ ex contrarijs qualitatibus constat. Vrendi vim habet; ad cauteria vsurpatur lixiuiū, & contra fungorum venena valet.

Gigarta, γήαρτα, vinacea Lat. nuclei acinorum, Körnlein in Weinbeeren.

Siccant, adstringunt, dysentericis & stomacho resolutis profunt.

Stemphyla, στέμφυλα, vinacea Nonn. Träbern.

Recrementa sunt ab vuis expressis reliqua, membranosi videlicet acinorum folliculi & vinacea seu nuclei cum scapis.

Adstrictoria sunt faculta-

tis, mammis inflammatis & turgentibus imponuntur, fotu podagricos iuuant. Decoctum dysentericis, cœliacis & diarrhœa laborantibus infunditur.

Vua immatura, acerbæ sunt & austeræ; refrigerant, siccant, aluum sistunt, appetitum excitant, præsertim calido ventriculo, sanguinem crudum & frigidum generant.

Omphacium, Agresta Offic. Agrest / succus vuae acerbæ, in condiendis obsonijs commodus & salubris. Ori, ventriculo gratus, nauseam ac cibi fastidium tollit, appetentiam excitat.

Æstuantibus & sitibundo à bile stomacho aut Hepati mirè prodest. Calidis morbis magno commodo adhibetur.

Vua dulces, σαφύλα, Süsse zeitige Weintrauben. Omnibus fugacibus magis nutriunt, laxam & flaccidam carnem gignunt. Aluū subducunt, stomachum inflant, & capiti nocent.

Vua pensiles, innocentiores sunt, minus inflant, caterisque facilius concoquuntur, contraëta & trita recentibus ambustionib⁹ mirè profunt.

XX 2

Vnum.

Vinum.

Oñoc.

Wein.

Calefacit 2. humectat, nutrit, sanguinem generat copiosum & purissimum: ocys-
simè in alimentum vertitur,
genuinum ac naturalem ca-
lorem refocillat. Cor exhi-
larat.

Modicè potum ad alimo-
niam corporis conseruatio-
nemque valetudinis maxi-
mè commodum.

Suaue Dei munus Vinum est: ho-
mirumq; saluti

Conducit: præsfit dummodò so-
brietas.

Immodico sed si tibi proluat ora

Lyao,

Pro dulci potas tetra aconita
mero.

Lora.

Lorea.

Δουτερία, Græcis.

Potio secundaria, Vinum
operariorum, Lauer.

Sic dicta à lotis acinis. Fit
ex maceratis aqua vinaceis
post Mustum acinis expres-
sum.

Vrtica Romana.

Ἀγρίδιον, κίλιν, Diosc.

Vrtica sylu. semine Lini,
Lobel.

Vrtica vera, Fuchf.

Römische Nesseln.

Welsche Nesseln.

Semen lini ferè in pilulis
rotundis fert.

Digerentis facultatis est,
& tenuium partium, Thora-
cem expurgat, & aliu soluit.

FINIS LIBRI SECVNDI.

Πάντοτε δόξα Θεῷ.



Fossi.

Fossilium Silesiæ
CATALOGVS,
OMNIS GENERIS MI-
NERALIA, METALLICA, METAL-
LA, SVCCOS, TERRAS, LAPILLOS, FONTES
medicatos & Thermas continens:

Concinnatus opera & studio

CASPARI SCHVVENCK
FELT, Physici Hirsbergensis.

• Hiobi 28. vers. 1. 2. 6. •


Habet Argentum venarum suarum principia : & est
locus Auro quod liquant Metallarij. Ferrum è strictu-
ris seu glebis venaque ferraria sumitur : & lapide æro-
so funditur Æs. Terræ eius lapides loco Sapphiri;
Pulueres verò sunt illi.



Anno

M. DC.

MAGNIFICO, STEMMA-
TIS ANTIQVITATE, AMPLITVDI-
NE, ERVDITIONE ATQVE VIRTUTE
Clarissimo viro Dn. CONRADO ab HOHBERG. in
Fürstenstein, Freiberg, Friedland, Gotsberg, &c.
Domino ac Mæcenati suo,
S. D.



ANNVS IAM AGITVR QVIN-
tus, Vir Magnifice, ex quo primùm in Arcem
tuam, antiquitate & Principum olim sede cla-
ram, Fürstenstein, ob vlcera Crurum, quibus
summè molestabatur M. T. diuturna dys-
pulota, curatu difficilia, in consilium voca-
tus veni. Quæ quum ex membris superio-
ribus excrementa sua eò impellentibus, foue-
ri, conseruari & augeri aduerterem: persi-
stente cacochymia & viscerum principalium doxeadæ, nullo modo à
Chirurgo solis topicis perfectè curari & consolidari posse prædixi. Cui
mea sententia M. T. facile acquiescente, corporeq; per conuenientia
medicamenta, vena incisionem, victumq; rectè institutum & serua-
tum, à prauis humoribus liberato, periculum quod ex inflammatione
imminebat, studio & industria Chirurgi facile repressum & vlcera diu-
turna, qua antea consolidationem respuebant, mox, accedente vsu Ther-
marum Hirsbergenstium, sponte coaluerunt. Quoniam verò post, Cru-
ra iterum, (vt frequenter in corporibus fieri assolet) ob neglectam dia-
tam, excercitationes ac solitam Euacuationem intermissas, accedentibus
curis domesticis exulcerarentur, Natura aggrauata consueto modo se-
se exonerante & prauos humores ad pedes iam imbecilliores impellente,
omniindò necessarium fore monui, vt præter exactam ac probam victus ra-
tionem, purgetur & sapius expurgetur corpus, præcipuè verò instante
vere & autumnino, antequam moueri ad debiliorem locum excrementa
incipiant. Ante biennium cum vena sectioni præessem, inter alia colloquia,
pagi cuiusdam M. T. vulgò der Salzbrunn sit mentio. De erymo
inqui-

inquirens, à fonte falso illic scaturiente nomen accepisse intellexi: mox aqua (quam M. T. apportandam curauit) degustata rem ita se habere deprehendi: & paulo post, cum pagum ab arce P. M. III. circ. distantem adissem, fontis origine diligentius perspecta, Aquam eius non simplicem, sed mineralibus imbutam ex colore, odore, sapore & decoctione exploravi, ac certo didici. Quapropter, vir magnifice, Earum rerum, quæ Terra Silesiaca patria nostra visceribus innata & fibris infixæ vel sponte effluunt vel arte effodiuntur, Observationes seu potius Catalogum, Amicorum hortatu & impulsu congestum M. T. inprimis, Antiquorum consuetudinem amulatus nuncupare libuit. Cum, quod singulari eruditione præditus bonas literas earumq; cultores semper magni feceris ac promouere soleas: tum quod Territorium M. T. Metallicis plurimis sit refertum. Gottesbergum enim Metallicorum priuilegijs gaudens oppidulum, Argenti, Aëris, Plumbi nigri metallis nitet: inprimis Lithanthrace seu fossili Carbone abundat, qui plurimus à Fabris ferrarijs vicinis, ubi ligna desunt, aliunde deuehitur. Extra Freibergum etiam ad radicem Arcis situm oppidum Ditionis M. T. Saxum Calcarium, fragmentis Carbonum fossilium aliàs reiectis & inutilibus, nouo inuento hodie vritur. Quem breuem tractatum, Vir Magnifice, qualemcumq; ut T. M. in me beneuolentia testimonium, quæ me soles vultus serenitate suscipe. Oro aeternum DEVM animi, corporisq; æxiæ, ut M. T. & nobilissimam familiam tuam quamdiutissime florentem & benè ac rectè valentem seruet, tegat, gubernet. Vale. Dabantur Cerniber-gomi, Anno Salutis recuperata 1600.

M. V.

A.


Caspar Schvvenckfelt
Medic.

IN Fos-


IN FOSSILIA SILESIAE,
 CASPARI SCHWENCKFELDI
 Med. D. ac Physici Hirsberg. Ordin.

*E*ffodiuntur opes, delectamenta bonorum,
 E varijs terræ visceribus variæ.
 Cuiq; suæ dotes terræ sunt, vnde triumphet,
 Quærat, & vnde nouum nomen in orbe sibi.
 Hæc ferrum, argentum tellus fert illa vel aurum,
 Hæc alias; alias illa ministrat opes.
 Quas Tu Slesia opes gignas, quâ laude nitescas,
 Obscurum proauis, Miq; Tibiq; fuit.
 Ecce patet cuius. Schwenckfeldius ille medentum
 Sidus, in exiguo monstrat habetq; libro.
 Hic vnus reparat Tibi Slesia nobile nomen,
 Et quo præcellas munere, sola docet.
 Qui tantas Tibi monstrat opes, dignus sit ille,
 Quem rursum his opibus muneribusq; bees.

DE Fos-




Humi-



Ty 2

Sponte



FOSSI-



FOSSILIVM

S I L E S I A E,

Liber tertius,

Achates.

AB Achate fluuio Siciliae
eiusdem nominis.

Achatstein/ Achat.

Lapis est varijs coloribus
constans & se inuicem inter-
cursantibus zonis lineisq; a-
deo vt quandoque varias ef-
fingant imaginum formas
naturæ penicillo.

Aliquot genera in mon-
tanis ad ripas fluuicrum in-
ter glareas inueniuntur.

*Iaspiachates sibi aut wie
ein Zaspis.*

*Leucachates frequentior;
per quem venæ albæ transe-
unt, ein weisstreiffiger Achat.*

*Kerachates Agat wie ein
Born.*

*Sardachates, Sardæ modo
ruber.*

*Hamachates. Hunc san-
guineæ venæ pingunt, Ein
blutstreiffiger Achat.*

Omnem Achatem vene-
nis pestiferis, Araneorum

atq; Scorpionum ictibus ad-
uersari fertur. Gestatur con-
tra Quartanam & febrile
incendium.

Acidule.

Seurlinge.

Bierbrunnen Sil.

Bini existunt fontes intra
Sudetes ad Silesiorum fines,
in angulo occidentali Luza-
tiam versus, acidum quid-
dā respicientes qui ob colo-
rem & gustum Cereuisiæ se-
cundariæ, ab Accolis Fontes
Cereuisiarij nominantur.

Prior non procul à Quisso
fl. ad dextram, quâ itur ad
pratam Ileræ, iuxta pagum
Fegesbeutel vnterm Boh-
walde vdo scaturit solo, tri-
bus in locis, vix pedem v-
num atq; alterum à se inui-
cem distantibus: scatebra
fonticuli Quissum versus
cum sonitu & murmure quo-
dam veluti aqua feruens e-
bullit.

Y y 3

Aqua

Aqua in fonte purpurea apparet, ex vitro Vini Vngarici veteris flauum repræsentat colorem: Pota acidulum sapit, linguam acrimoniâ tantillum feriens, *schmecket wie geringe scharff Tischbier* / quæ tamen mox perditur.

Per decoctionem dulcescit & rubicundum prorsus acquirit colorem Zythi ex Hordeo decocti instar; residua exigua fuligini fornacum similis, ingrati amariusculi saporis.

Saporem & colorem mutat, turbido ac pluuioso cælo; Hyeme sapidior, limpidior quàm Aestate: forsan quòd vligo ab externo frigore densata, aquam sordibus minus inficere possit.

Agricolæ vicini hanc salubriter bibunt. Deportatur etiam fœculibus in vicina loca ad Aegros, maximè febricitantes & calidioribus Morbis affectos. Sitim enim delet, appetentiam lapsam mirificè reuocat & famelicos reddit: non inflat ventrem, facillè penetrat, aperit, roborat, abstergit. Cholericis auxiliatur pota. Calidiori ventriculo Cibumq; fastidienti salutaris.

Narrant Accolæ turbare aquam, si à desperatis hauriatur.

Alter longo ab hoc milliarium in pago Liebwerda territorij Friedlandensis Generosi ac Magnifici Dom. Melchioris à Redern, prodit perspicuus, clarus: gustu suauit acidiuscule priori gravior & præstantior. Muro circumdatus est.

Der Liebwerder Bierbrunnen vulgo.

Eiusdem cum superiori facultatis & effectus. Deferri aquam doliolis Dresdam curauit Augustus Saxoniae Elector.

Adamas.

Adamas Bohemicus.

**Adamas.*

Ein Demuth / Demant / Diamant / Böhmischer Demuth.

Plurimus reperitur ad castrum Kynast in agris, piscinis, per quas riuuli ex montibus decurrunt: in prato Iseræ: prope Gryphibergam, Gufmansdorff & alijs plerisque locis Riphæorum montium. Aliquando matricula Oui gallinacei & anserini magnitudine includuntur.

Silesiaci Adamantis expositi co-

liti colore & nidore Indicis adeò respondent, vt eos vix nisi duritie discernere queas. Annulis inseruntur ad ornatum potius quàm vsum Medicum. Amuletum contra venena vulgatum. Brachio sinistro vt carnes tangat alligatus, nocturnos inhibet timores. Cardan.

Aeris vena.

Kupffergänge.

Aeris mons, vulgo Cupferbergum intra Riphæos montes ad Boberum fl. oppidulum metallicū vetustum; olim Aeris venis ditissimis celeberrimum; ex puteis ac Cuniculis in montem actis profundiss. coniectari licet. Ferunt vltra septuaginta officinas, in quibus Aes fuit excoctum, in valle, quæ à scorijis nomen retinuit der Schlackengrund extitisse: quod & ingentia scoriarum agmina ad Bober. fl. coniecta demonstrant. Hinc ei nomen celsit der Kupfferberg. Vnica superest hodie.

Goldbergæ in Lygijs, ad Brunsuicium & Haselam.

Altstadij Ducatus Nissenfis. In Zuckmantela.

Gotsbergo.

Schmotschiffen pago ter-

ritorij Hirschbergensis.

Gieren, Querbach, ad fontes Quissi fl. auff der Bupfferzeche vnd S. Urban.

Schatzlarij, in Crönsdorff ad fontes Boberi. In Hermansciffen sub monte nigro versus Bohemiam.

Aes purum fossile statim suum.

Gediegen fein Kupffer.

Kupffer Euglin.

In Pyrite, ex vena D. Urbani zum Gieren, item in vena ab Aere seu Cupro denominata, etiam in altera, quæ à litibus nomen habet die Laderzeche, inter lapides Plumbi candidi zwischen den Zihnzwittern, Aeris natiui sui coloris granula emicant. In Quartzo circa Lehnnum opp. territorij Leobergensis.

Aeris bractæ tenuissimæ amplectuntur Saxum cornutum intercurrentibus venulis rubeis in Crönsdorff.

Aeris venulæ vel fibræ in lapide rubro & spatho.

Kupffer Euglin in einem roten Spath.

Lauantur grana Goldbergs, Kupffer Börner so Gold halten.

Aes

Aes rude sui coloris.

Gediegen Kupffer-Ertz/rot
Kupffer-Ertz / rote Kupffer-
blumen.

Braun beschlagener Kup-
ferkys.

In Metallis Kupferbergi.

*Aes rude plumbei & vio-
lacei coloris.*

Kupfferglas Ertz.

Reich violbraun Kupferkys.
Ibidem.

*Aeris vena Ferri par-
ticeps.*

Eisenschüssig Kupffer-Ertz.
Cupferbergi.

*Aeris vena Chrysocolla &
caeruleo tincta.*

Kupfer-Ertz mit angeflo-
genem Berggrün vnd Lazur.
Goldbergæ, Cupferbergi
& Schatzlarij.

*Aeris ferax Pyrites aurei
coloris.*

Schöner Goldgeeler Kup-
ferkys.

In Gieren & Kupferberg.

*Aeris vena in lapide
fissili.*

Kupferreicher Schiefer.
In Hermansfeiffen ad

thermas D. Iohannis.

*Aeris vena in Marmore
& Pyrite.*

Kupffer-Ertz in einem spat-
tigen Kyß/ welcher auch Sila-
ber helt.

Gottesbergi & in Zisch-
dorff.

Aes.

Χαλκός.

Cuprum.

Kupfer / rot Kupfer-Ertz
in Biblijs.

Excoquitur hodie Cup-
ferbergi & Gabelæ : olim
Goldbergæ in Lygijs.

Acia, salsa, acetosa, pin-
guia, dulcia preparata in
vasis aneis prorsus incom-
moda sunt naturæ, maximè
si in ijs morentur, siue po-
tentur siue comedantur.

Aesustum.

Χαλκός πεκαυμένος Diof.

Gebrand Kupfer.

Eligitur rubrum, quod
tritum calore Cinabarin i-
mitatur, Officinis & Chir-
urgis notum.

Adstringit, siccatur, repri-
mit, acre est, absomit.

Aeris recrementum.

Χαλκὸς μαγιά.

Kupfer-

Bupferschlacken.

Ex Aeris scorijs balnea fiunt seu infusus Schlackenbader Cupferbergi contra scabiem, pustulas vlceraq; maligna.

Appetitum restaurant & Articulis robur addunt.

Aeris flos.

Χαλκὸς αἰθερ. Diosc.

Bupferförlin.

Grana sunt minutissima Milij effigie, quæ aquâ frigidissima Aeris candenti massâ affusâ, derepentè exiliunt ac erumpunt.

In officinis vbi æs liquant Metallarij,

Aeris squama.

Χαλκὸς λεπτός. Diosc.

Bupfer Hammerschlag.

Duplex est. Crassior Grob Hammerschlag: Tenuior, Aeris squama purissima Bupferbraun/ Bupferstaub. Hæc Chirurgi & Figuli ad vasa viridi colore tingenda vtuntur. Apud Aerarios reperitur.

Aerugo fossilis liquida.

Grün Bergschmer vulgò.

Viriditas huic remissior, liquida prorsus & instar pulvis fluida.

Ante quadriennium aliquot Centumpondia ex puteo deserto Cupferbergi, Metallici extraxerunt. Exiccata pallet Aere non prorsus carens.

Abstergit, siccatur, Lichenes & vlcera inueterata sanat, Carnemq; putridam exedit, facto experimento.

Aerugo nativa rasilis.

Ἰδὸς ἑστὸς Diosc.

Aerugo nativa in Pyrite ærario Kentman.

Bupfergrün an einem Bupferfyz.

Cupferbergi in metallis ærarijs ex Pyrite efflorescit.

Aeris est crassarum partium. Mordet, non tamen vehementer, detrahit, liquat, digerit, siccatur.

Aetites.

Αἰθίς λίθος.

Aidler Stein.

Aetites mas.

Rotundus est lapis vt galla concavus alium in se lapidem continens Coallimum dictum; qui ex parte Crystalli colorem pellucidum, ex altera nubilum cœruleum ostentat.

Glareosis ad ripam Bobe-
Z z ri re-

ri repertum vidi. Partum accelerare femori adalligatum vulgi persuasio.

Aetites femina.

Erdsstein/Blapperstein.

Varius est. 1. Fuscus, aliquando rotundus, interdum latiusculus compressus, bolum luteum subtilissimum continens; qui commodè preparatus datur vt Sigillata, Dysentericis, Alui profluvio laborantibus & contra venena.

Ad pagum Schmotsseifen territorij Leobergenensis eruitur.

2. Puteus, inæqualiter rotundus, oblongus, argillam candidam includens Blapperstein mit weisser Erden.

Ibidem.

3. Ferrugineus Aetites nothus.

Drüsen.

Lapis concavus ferrei seu ferruginei coloris. Binas, ternas, quaternas cavitates habet; quarum alia Ochra ferruginea, altera Aëre repleta cernitur.

Ad Goldbergam in Lygijs.

Aluminis vene.

Pyrites aluminosus In

Schreiber Awo ad Zacum in Zischdorff ad Boberum.

Terra nigra aluminosa in Leussersdorff propè Goldbergam: in Seifersdorff territorij Hirschberg.

Sunt & vene Aluminis in Comitatu Glocensi.

Alumen.

Alumia.

Allaun.

Olim coquebatur in Leussersdorff & Schreiberau.

Craffarum est partium. Calefacit, adstringit, abstergit, expurgat, extenuat, vlcera putrida emendat, humida exiccat, pruritus tollit, scabiem sanat, vlceribus cicatricem inducit.

Alumen vstum.

Gebrandter Allaun.

Exiccat vehementer, Carnem supercrescentem coërcet, & humida vlcera corrigit.

Amethystus.

Amethystus Bohemicus.

A'védus or.

Hyacinthus Agricol.

Deutscher Amethyst.

Böhmischer Amethyst.

Ad Gigantum montem reperitur.

Visum

Visum coloris suauitate reficit.

Ammochryses.

Gold glimmer.

Geeler glimmer.

Bazengold.

Arena potius quam lapis, Auro colore simillima, nihil tamen auri in se continet. Passim in metallis, ad ripas Zaci fl. & in piscinis nonnullis sub castro Kynast.

Aphronitrum.

Spuma Nitri.

Schaum Niter / Mauern Niter.

Salpeter an den Felsen vnd Mauern.

Exudat passim ex parietibus vetustis Murorum.

Nitrum ex hoc fit factitium.

Aphroselinus obscurus.

Specularis lapis obscurus.

Glacies D. Mariae Plebeis.

Graw/tunkel Grawen Eise.

Marien Eis.

Lapis est vitri modo translucens: facile in tenues finditur laminas.

In Lygijs circa Brusnitium multus ad riuulum.

Candidus Epilepticis, dysentericis, difficulter parturientibus ppinatur, siccatur Hæ-

morrhoides & fistulosis vlcibus carnem generat. Miscetur dentifricijs.

Crucis aut cordis figura infantibus aduersus Comitialem morbum appendit plebecula.

Aqua strumas procreans.

Aqua Pyrite infecta, Metallicis.

Bieffige Wasser.

Tropffbrunnen.

Circa Schmiedeberg & in Hermansseiffen limpidi scaturiunt fontes saporis & odoris expertes, qui poti strumas seu hernias Gutturis procreare solent.

Aqua per decoctionē absumpta limum datat flauescentem subtilem Ochrae ferrugineae non absimilem, quē circulus ambiebat pinguis subnigricans acerrimi saporis, Nitri modo acrimoniā penetrante linguam feriens.

Aqua Sulphurea.

Schwefelichte wasser.

Plerisq; locis Riphæorum montium. In Neundorff prope Leobergam.

Therma Hirsbergenses.

Arena.

*Apuos.

Zz 2

Sand

Sand.

Arena fossilis candida subtilissima, Schöner weißer / subtieler känlin Sand / Gries sand.

Passim. In Ducatu Glogouiensi, prope Gryphibergam & alijs multis locis.

Ad vasa Plumbi candidi expurganda utilis.

Arena fossilitia lutea seu flaua. Schön fleiner geeler Sand.

Extra Gryphibergam in tumulo arenario.

Arena fluuiatilis, Wasser Sand.

Ad riuos & amnes notissima: quædam à vitrarijs ad vitri confectionē colligitur.

Arena crassior fluuiorum, Sabulum vocatur, idq; vel durum quod mas; vel molle quod femina appellatur.

Glarea, fragmenta sunt Tophi, Silicis, Saxi non adeò magna.

Argenti vena.

Silbergänge / Silber Bergwerck.

Silberbergum, Silberberg opp. Duc. Münsterbergensis, Argento nomen accepit, idò olim venæ Argentariæ illuc fuerint celebres.

Bythonia opp. vetustum

metallicum ad radices Carpathi.

Goldberga, vbi olim lauabatur. Tarnouitium.

Gotsbergum, Gotsberg. Reichesteinum.

Dietmansdorff prope Suidnicium.

Isera pratum.

Smotsseiffen.

Zischdorffium.

Gabela, die Gabel / pagus ad Landeshuttum. Argenti venis ditissimis hodie celebratur.

Gigantæus mons, der Riesenberg.

Argentū rude candidum in Marmore, Gediegen weiß Silber Erz in einem Spath. Weiß güldin Erz.

In Gabela. Centum pondio octo, nouē, decem marca argenti insunt.

Argenti vena in Cadmia metallica, Silber in einem harten Cobalt.

In valle Gigantum & Smotsseiffen.

Argentum in Plumbario lapide.

Blayglantzig silber Erz.

In Reichestein, Gotsberg, Dietmansdorff, Smotsseiffen, Tarnouitz.

Argentum continent lapides, ex quibus plumbum

bum candidum excoquitur.

Zwitter so Silber halten.

Im Gieren.

Argentum purum statim suū, Gediegen sein Silber/hactenus in Silesia vspiam fuisse in propria vena repertum, non memini. Ante quadraginta circiter annos, bractæ purissimi Argenti in montanis non procul à Quisso fluuiū cum instrumentis Monetariis inuentæ, & ad Nobiliss. Dn. Iohannem Gutschium, Dom. in Greiffstein & Kynast delatæ fuere. Credibile Monetarium propè, Argenti puri statim sui proprias venas nouisse.

Argentum.

Argentum excoctum.

Ἀργυρ., ἀργύρεον.

Silber/geschmeltzt silber.

Metallum post Aurū preciosissimum. Olim excoquebatur in Silberberg, Dietmansdorff, Zischdorff. Hodie Gabelæ. Hoc in bracteolas latefcit & foliatum redditur, aliàs laminatum, Argentum foliatum, Blatt Silber / gesölagen Silber.

Vel in scobem abraditur & vocatur Scobs.

Limatura seu Ramentum Argenti.

Silberfeil.

Argentum proximum ab Auro bonitatis locum obtinet; cuius vires quodammodo imitatur. Refrigerat 2. gradu. Roborantibus Medicinis ad cerebrum & Cor præscriptis miscetur. Melancholicis, Cordis tremori & oris fœtori confert.

Argenti scoria.

Ἀργύρεα σκωρία, Diosc.

Ἐλκωσμά, Galen.

Silber Schlacken.

Recrementum est Argentariæ venæ, quando excoquitur.

Molybdanæ vim habet & Emplastris exiccatoriæ facultatis, quæ cicatricem obducunt, commisceri potest.

Argenti spuma similis fossilis Res.

Wispickel in Zwittergruben auffm Gieren.

Argilla.

Ἀργίλλος.

Thon/Don.

Terra figularis, viscida & lenta est, vasis figulinis formandis apta.

Huius varia genera varijs coloribus distincta passim reperiuntur.

Zz 3

Argil.

Argilla candida, weisser Thon.

Nigra, fohlschwarz Thon. Effoditur in sylua extra Hirschbergium; ex qua vasa, in fornace cocta fiunt candida.

Lutea, gelber Thon.

Cinerea, Aschgrauer Thon.

Punicea seu rubea, roter Thon.

Refrigerat, repellit, Mammarum tumores imposita reprimat. Cum Ovi albumine permista, Ceruici imposita, Hemorrhagiam Narium compescit.

Vasa figulina, Thon gefesse/præ ceteris bonitate commendantur Boleslauensia; in Luzatia, Görlicensia; in Misnia VValdeburgica.

Armenium.

Albos Aquilios, Diosc.

Aquienard, Gal.

Lapis Armenius.

Blaw grüne Erde.

Blaw Berggrün.

Lapis est seu terra coloris viridis cum Cæruleo communis, facile friabilis: à quo, modico candore differt.

In Lygijs ad Goldbergam in folsis & puteis vetustis Aeris: Cupferbergi cum Pyrite.

Efficaciter purgat. Atra

bile vexatis maximè confert, ijs vomitum & aluum ciens, etiam parua quantitate.

Abstergit, & cum Ophthalmicis miscetur: subtiliss. tritum Palpebrarum pilos auget.

Astroites.

Astims.

Lapis stellatus, victorialis.

Lapis est non gemma, stellulis distinctus ac pictus, rarior inuenta. Nonnulli pro stellis habent quosdam linearum ductus vndarum ferè amulos.

Venena suspensus arcere creditur & Caduco morbo correptis prodesse.

Aurivena.

Goldgenge.

Aurimons, der Goldberg/opp. nobile Ducatus Legnicensis ab Auro denominatum, ad Cattum fluium, schola celeberrimum. Claruit Metallis tempore Henrici Pij Ducis Silesiaci, qui cum congregaretur cū Tartaris ex Asia per Poloniam in Silesiam irruentib⁹, quingentos Metallicos sub signis habuit.

Zuckmantela der Zuckmantel opp. olim Auri venis clarum,

clarum, sic dictum, quod Latrones ibi Viatoribus pallia detrahare soliti sunt.

Reichensteina Reichenstein oppidulum Metallicum Ducatus Munsterbergensis.

Leoberga olim clauit Auri fodinis, In der Zeche.

Strigonium vrbs Ducatus Suidnicensis. Restant fodinae Auri veteres.

Vallis Gigantum Der Riesengrund/ Goldgrund.

Langenouia Langenau pagus districtus Hirschbergensis.

Grünau pagus extra urbem Hirschbergam: pertinet ad Senatum amplissimum Hirschbergensem.

Smotzseiffen.

In Schvartzenthal seu Neudorff versus Boemiam.

Freihet opp. vicinum Thermis D. Iohannis ad Oupam fluu.

Aurum purum putum
αυρογον.

Aurum statim suum, igne non expertum, Gedigen fein Gold.

Aurum purum statim suum Iuglandis ferè magnitudine Silici candido implicitum.

Blar gediegen fein Gold

an einem weissen Zys einer Zins gros.

In Zuckmantela ante paucos annos frustum puri auri Quartzo candido inuolutum libras vij pendens fuit effossum aliquando Pyri magnitudine, etiam minori quantitate saepe reperitur.

Aurum purum statim suum Quartzo adnatum Auellanae ferè magnitudine.

Ein fein rein gediege Goldstueck an einem Quarz.

Habeo ex pago Mauos sub Hirsberga ad Boberum fluvium.

Aurum lotum.

Gewaschen Gold.

Innumeris lauatur locis.

Auri puri grana.

Auriamenta grauiora.

Körnicht Gold / Goldkörner.

In Zuckmantela auff der weichen Zeche Goldbergæ, Leobergæ, Langenouia, in Schmotsseiffen, Voysdorff.

Auri puriamenta leuiora.

ϕημελα χρυσ.

Flemmicht Gold.

Gediegen Goldsteglin.

Goldsteglin.

Ad fontes Albis, beim Hirscha

Hirschbrunnen im Riesen-
grunde / beim kleinen Teiche
auff der Zserwiese.

Riuuli seu fluuij ex mon-
tibus decurrentibus Auri ra-
menta ducunt, Albis, Bobe-
rus, Zacus, Cattus, Isera,
Goldbach propè Gryphi-
bergam, S. Georgenbach
ad Hirschbergam. Taceo in-
numeros torrentes & loca
Ducatum Legnicensis, Iau-
rensis, Suidnicensis & Nif-
fensis, vbi etiam hodie puri
Auriamenta lauantur.

Auri arena.

ἄμμος χρυσῆς.

Goldgrimille / Goldschlich.

Passim in riuulis iam cita-
tis occurrit.

Aureus Dens.

Ein güldener Zahn.

Anno 1593. in pago VVeig-
elsdorff. Ducatus Suidni-
censis puero Rustico Christo-
phoro Müllero cū septimo
ætatis dentes ossei cecidit-
sent, ac tales renati essent, v-
nus eorum nimirum vltim⁹
molaris in sinistra parte in-
ferius productus fuit Aureus,
splendens perpulchrè, alter
penultimus, ne secundo qui-
dem anno redijt.

In Truttis, quæ ob id Au-
ratæ dicuntur, aliquando re-
periri Aurum fertur: at in a-
lio quocunq; Animalī mul-
to minus Homine innatum
Aurum fuisse à condito Mun-
do nullum extat exemplum.

Aurum rude.

Erz das Gold in sich helt.

Pyrites coloris cinerei &
Galenæ, ein grauer vnd bley-
glantziger Byß / welcher Gold
helt.

In Reichenstein.

Silex durus Auri ferax ein
Göldiger Byß oder Quarz.

Goldbergæ, Leobergæ in
der Zechen.

Aurum rude in Quartzo
& Spatho, ex quo interdum
lucent Auri scintillæ.

Goldreicher Quarz vñnd
Spath / in welchen zuweilen
sichtig Gold gespüret wird.

In Schwartzenenthal vulgò
Neudorff.

Pyrites ferri Aurum con-
tinens, Eisenmann so Gold
helt.

Auff der Freyheit ad Ou-
pam fluu.

Aurum coctum.

χρυσός.

Aurum sincerum probè
excoctum.

Geschmelz

Geschmelzt Gold.

Non ignobilis est Hungarico. Aurum ex quacunque vena sit effossum, modò rectè sit repurgatum, æquè perfectum in vna Mundi plaga ac altera, nulla habita temperaturæ loci, calidæ aut frigidæ, siccæ aut humidæ ratione.

Aurum laminatum, Aurifolia.

Geschlagen Gold / blat Gold / fein Gold.

Aurum limatum, Auriscobs.

Geseilet Gold.

Ad Medicinæ vsum præfertur à multis id quod naturâ statim suum purum est.

Aurum in omnibus suis partibus æquale & temperatum, saporis & odoris expers.

Valet ad robur Naturæ & Ventriculæ exolutum reficit. Medetur Cardiacis, Syncopis, Melancholicis & animi mœroribus. Venenis resistit.

Eius scobs antidotum est Arsenici. Auri folium cum vino rubro plebeij homines ad Morbillorum expulsiōnem frequenter exhibent.

In cauterijs actualibus præstat cæteris Metallis.

Belemnites.

DActylus Idæus *Plin.*

Lapis Lyncis *Offic.*

Albschoß.

Donnerkeil vulgo.

Lapis est teres, oblongus in turbinem desinens. Falsum est, ex vrina Lyncis nasci.

Ad ripas fluuiorum & in agris.

Exiccatoriæ est facultatis. Arenulas expurgat & calculosis medetur.

Contra nocturnas suppressiones & noctis ludibria valere vulgus credit.

Belemnites ferrugineus.

Binos ad me misit doctus & perindustrius Dom. Dominicus Heintz pharmacopœus Suidnicensis piæ memoriæ, inter Rhodiæ radices ex Riphæis montibus ad eum delatos repositos. Maior teres, oblongus, digitum minimum crassus, medio terram continens.

Alter gracilior vtrinque in acutum desinit nuclei Dactyli magnitudine.

Vterque ferruginea Ochra quasi inuolutus videtur, grauis odoris.

Bolus.

Aaa

Rubri-

Rubrica Sinopica.

Roter Bolus / rote Erde.

Goldbergæ in Lygijs.

Siccus est & moderate frigidus, obstruit, adstringit. Hæmorrhagiam Narium & Vteri cohibet. Dysentericis utilis. Chirurgis in usu.

Longè præfertur Tokai-kus, qui copiose ad nos affertur coloris rufi: instar butyri in ore dilabitur & omnes ferè notas Boli Armeni habet.

Brontia.

Berthias.

Lapis Bufonum maior.

Großer Bröstenstein / Albstein / Pygmæenstein.

Figura huic ferè dimidiati globi, raro oblonga, varij etiam coloris. Alius subfuscus, alius subrubens, alius subluteus. Aliquibus sunt bini circuli q. quidam moduli; à quorum superiori quinæ lineæ eminentes, æqualibus inter se spacijs diuisæ, procedunt ad inferiorem, quorum singulæ striam habent.

Ad ripas flumium; aliquando aratro excinditur.

Venenis aduersari & fulmine tacta restinguere, Plinius auctor est.

Cadmia metallica.

Cadmia Metallaris Argenti ferax.

Cobaltum Metallicis.

Kadpenn Gracis.

Kobelt.

Lapis est non multum à Pyrite diuersus, sibi aus wie ein weisser Byß.

In valle Gigantum, aliàs vocatur Zincken Erz in Schmotsseiffen: itè Cupferbergi, da er bricht neben einem glantz / vnd sibi einem weisgülden Erz nit vngleich.

Erodendi vim habet & Argentum in igni absomit. Er raubet im feuer das silber.

Cadmia fornacum.

Hüttenrauch.

Gignitur in fornacibus ærarijs, fuligine statu egesta.

Venenum habet perniciosissimum. Eapropter intra corpus haud sumenda. Mures necat. Oculorum medicamentis utilis. Additur Emplastris & collyrijs.

Calcarius lapis.

A' e' Gises. Diosc.

Saxum Calcis.

Kalkstein.

Calcario lapide totus ille tractus Riphæorum circa Kauffungam, ac si diceret Kalk-

Kalckfund, Seittendorff, & Riersdorff abundat: vbi fornaces Calcaria plurimæ, in quibus vritur, indeq; Vratisslauiam & alia vicina loca deuehitur. Nouo inuento ad Freibergum oppidulum Carbone fossili coquitur.

Calx viua.

Ungeleschter Kalck.

Candidissima in Alpendorff ad Gigantum montem vstulatur ex saxo candido Alabastrum æmulante: cuius bonitas & candor in dealbandis parietibus præ alijs commendatur.

Vis Calci inest ignea, mordens, adurens, & crustas inducens. Eapropter discutit, extrahit, consumit. Ad Cauteria potentionalia eligitur.

Calx lota.

Gewaschener Kalck.

Siccatur valenter absque morfu. Ad contumacia vlcera prodest.

Carbones fossiles.

Aspaxes yabbers Theoph.

Aspaxes.

Carbones bituminosi duri.

Bitumen nigrum induratum.

SteinKoln / Pech Stein Koln.

Bitumen sunt induratum & coctum sub terra Pici simile, friabile, facile ignem concipiens.

Effodiuntur ad Gottsburgum, & Schatzlarium prope Roberifontes.

Præferuntur Gottsburgij vt puriores, à fabris ferrarijs, qui ijs loco Carbonum vtuntur: quod multò diutius durent: sed quoniam sua pinguitudine inficiunt ferum & fragile faciunt, ad subtilia opera minus valent.

Carniolus.

Carneolus.

Sarda.

Carneol.

Gemma vulgaris Minij colore, sublanguido tamen, ceu videl. in humanam carnem perspicuitas fusa sit.

Varij coloris passim reperiuntur. Alius insignis rubedinis; alius tenuior pelucidus carni humana similis; alius insignitus candidis pinnulis; alius candidis lineis; alius luteus prorsus.

Nota est propter sigilla Annulorum, quæ crebriò ex illis fiunt.

Sanguinè mitigare, Men-

A a a a

scs

ses, Hæmorrhoides & immodicum Narium fluxum sistere, amuleto Gemmarij tradunt.

Ceraunia.

Κεραυνίας *Gesn.*

Lapis Bufonum maior.

Grosser glatter Bröstenstein.

A brontia differt, quod careat stryis & lineis: lævis est, & nunc rotundus, nunc oblongus: modò clauam, modò cuneum, modò pyramidem repræsentans, modò securim.

1. Coniformis, pyramidem refert, in conum acutus, lævis, varij coloris instar Iaspidis, verùm subobscuri ex rubro fusci & viridis.

Ein Donnerfeil vulgo.

2. Oui Anatis magnitudine est, oblongus, inferiori parte planus, superiori rotundus seu concavus ex fusco cærulei coloris, læuissimus, durissimus, grauissimus, quem lima non tangit.

Ein Schlangenstein.

3. Coloris eiusdem oblongus, teres, Crus ferè repræsentans.

In agris latorijs & fluuijs, quamvis rarissimè, inveniuntur.

Pyramidalis notior, quo

Mulierculæ, nescio, qua ratione, ad Hernias infantium sanandas vtuntur, eum in balneo supponentes, seu loco affecto alligantes.

Chalcanthi Vena.

Kupfer Wassergänge.

Cupferbergi.

In Gigantum valle.

In Schreiber Au.

Zuckmantela.

Zischdorff.

Glocensi Comitatu.

Chalcanthum natium viride.

Χάλκανθος συλακπηκός.

Atramentum sutorium fossile stillaticium.

Natürlich selbstwachsend
Kupferwasser.

In Cuniculis desertis Gigantei montis, è saxorum seu pyritis atramentosi commissuris exudat viride cubi specie.

Chalcanthum natium lauginosum.

Atramentum sutorium candidum tenue Agricol.

Vitriolum natium plumosum.

Wollecht selbstwachsend
Kupferwasser. Kupferwasser
blume.

Ex

Ex Pyrite & Melanteria in Riefegrund & Zischdorff efflorescit instar la nuginis seu capillorum.

Saporem Vitrioli imitatur.

Chalcanthum viride factitium.

Χαλκανθός ἐφθός, Diosc.

Atramentum sutoriū, Offic. Vitriolum.

Grün Kupfferwasser.

Ante aliquot annos decoquebatur ex Pyrite atramentoso in Riefengrund, Schreiberau Cupfferbergi & in Zuckmantel.

Adstringit vehementiss. crustas inducit insigniter calesfaciens & siccans. Gustantibus linguam vellicat, aspero adstringentique sapore. Aluum irritat vomitumque concitat modicè potum.

Chalcanthum vstum.

Caput mortuum, Officin.

Colcotar.

Gebrandt Kupfferwasser.

Todtenkopff.

Fit ex Chalcantho vsto. Multò mitius & moderatius crudo. Adstringit, siccatur, sanguinem sistit.

Chalcitis dura cum Pyrite.

Χαλκίτις ὁ λίθος.

Atramentum rubrū, Offic.

Pyrites ærosus.

hart rot Atrament.

Lapis rubicundus, ex quo ipsum Æs conflat. Recentioribus est vitriolum ab Aëre alteratum. Eius loco officinæ quædam vitriolo Romano probe purificato in Compositis vtuntur.

Cupfferbergi.

Chelonites.

Βατραχίτις.

Crapodina, Gesn.

Myexis.

Kleiner Krötenstein.

Graver Krötenstein.

Lapis est figuræ hemisphæricæ cauus intus, foris conuex⁹ coloris in candido fusci. Interdum notulis candidis seu liuentibus notatur.

Ex Rana Rubeta & lapide nominatur: quod nonnullis persuasum fuerit, ipsum in capite huius bestię venenatæ ex succo lapideo, dum lambit terram, nasci. Alij in mineris procreari affirmant.

Vires eius expertæ sunt, quod gestatus tollat Renum dolores etiam antiquos, & calculi prohibeat generationem. Venenatis ictibus haud paruum affert auxiliij.

Aaa 3

Suo

Suo enim contactu & blando attritu Inflammationes à venenatis bestiis illatas discutit, ac virus omne elicit.

Chrysocolle nativa.

Viride montanum.

Berggrün.

Metallum est Aeris putrefactum, & fit vel aqua aliove liquore acidulo fluente in venam Metalli.

Chrysocolle globosa Aeris ferax. Berggrün förner/so da Kupffer halten.

Goldbergæ in Lygijs.

Chrysocolle Pyriti ærario adherens, quæ abrasa arenæ similitudinem gignit.

Berggrün an ein Kupffer=tyß.

Cupfferbergi.

Chrysocolle in lapide ærario cornuto.

Berggrün an einem Hornstein.

Cupfferbergi & ad Schatzlarium.

Chrysocolle in spatho, Berggrün an einem Spahr.

Ad Brunsitium in Lygijs.

Chrysocolle in lapide fissili æroso. Angeflogen Berggrün an ein Kupfferschliefer.

In Hermansleiffen sub Nigro monte.

Chrysocolle herbacea ad

pyritem ærosum adnata, Schiefergrün.

Cupfferbergi.

Chrysocolle aluum soluit & vehementer vomitum concitat, valenter digerentis & siccantis facultatis. Intra corpus non tutò sumitur.

Pictores ea utuntur: præfertur Hungarica.

Cinis montanus.

Weid asche/vulgò.

Bergasche/Steinasche.

Fit ex cœruleis seu cinerei coloris duris fluoribus, qui in montanis passim ad flumina inveniuntur.

Comminuti cum cinere ex antiqua Abiete permisti in furno coquantur: veluti in Pittersdorff ad Zacum fl.

Insectoribus lanarum utilis ad pannorum infecturas.

Cinnabaris nativa.

*Archeæ. Vitruv.

Cinnabaris metallica, Minium nativum.

Berg Zinober.

Selbstwachsener Zinober.

Zum Schlegel.

Lauatur etiam ad Albipolim Boiemie cum auri ramentis. Insultus Epilepticos inhibet.

Chemicis utilis. Ex Boemico

mico per descensum extrahitur Mercurius.

Cinnabaris artificialis.

Cinnabrium factitium.

Gemachter Zinober.

Ex Argento viuo & Sulphure ab Alchymistis paratur. Pictoribus nota.

Deleteriae est naturae. Vnguentis contra vlcera gallica miscetur.

Citrina gemma.

CrySTALLUS luteo Citrij fulgore splensens.

Ein Citrin/Gemmarijs.

In agris Suditorum territorij Hirsberg. aliquando magna frustra aratro excinduntur.

Ceruleum nativum.

Lapis Lazuli vel Azuli, officin.

Κόινος λίθος, Diosc.

Κυάνιον.

Bergblaw/ Lazurblaw.

Blawe Erde/vulgò.

Gleba est metallica seu lapis caerulei coloris, scintillis seu stellis aureis aliquando distinctus. Generatur cum salis & acidus humor corroserit materiam metallicam.

Lapis stellulis micans au-

reis cum caeruleo.

Lazurstein mit güldenem Sternlin.

Cupfferbergi in ararijs.

Caeruleum nativum cum Chrysocollo.

BergLazur mit angeflögtem Berggrün.

Chrysocollo aded gaudet caeruleo, vt hi duo succi concreti frequentissime simul nati, vni eidemque glebae metallicae.

Cupfferbergi & in vetustis puteis ararijs Lygiorum ad Haselam.

Caeruleum nativum cum lapide rudi candido. Lazur an einem Quarz. Ibidem.

Sapor huic mistus, acris & parum adstringens.

Vehementis est purgationis & timorosa, tam per secessum, quam per vomitum.

Aduersus Melancholicos affectus, Maniam, Melancholiam, Quartanam, Cancrum, efficax.

Cos.

Ἀχόνια πέτρα, Diosc.

Wegestein/ Schleiffstein.

Saxum est durum & asperum, siue Lapis Marmoris proximus, quo cultri & alia ferramenta acuntur.

Aquaria seu Rotaria gyralis,

ratis, quæ in gyrum agita-
tur, Schleiffstein.

In latomijs Leobergæ,
Goldbergæ & Naumburgi
ad Quissum.

Quod exacuendo ferro
deteritur, vulgò Schliff/
Schlich / refrigerat, Alopecias
ad pilum reducit, virginum
Mammas cohibet: contra
Colicā, vulgi medicina.

Cos Lydia.

Χρυσίτης λίθος.

in λίθῳ, Theoph.

Cotricula.

Probirstein.

Goldstein / Strichstein.

Cotis est species, colore vt
plurimum nigerrimus & læ-
uore insigni, duritie ferri,
Aurifabris nota.

Ad ripas fluuiorum gla-
reosas legitur.

Probaturnigra & sulphu-
ris expers.

Contra suffusiones Ocu-
lorum cum lacte teritur in
coticulis.

Crystallus.

Κρύσταλλος.

Crystallum, Plin.

κελλεύδρον ὕδωρ.

Ein Cristall.

Gemma est candida &
limpida suam naturalem ha-

bens figuram, id est, sexan-
gulam perspicuitate sua A-
damanti similis.

In præruptis Montiu scopolis
superficietenus cohæ-
rentes passim inveniuntur.
Plures interdum parui simul
nascuntur Chæradū seu stru-
marum instar, magnitudine
inæquales. Sape in agris;
aliquando in latomijs oc-
currunt.

Siccatur, refrigeratur, veneno
Arsenici resistit & contra
Mercurium epotum singula-
re antidotum. Aqua fri-
gida humectata & sub lin-
gua detenta, in febribus si-
tim restinguit.

Dentifricijs miscetur pulu.

Amuleto vertigini resi-
stere Gemmarij ex vulgi per-
suasione affirmant.

Diphryges.

Διφρυγες.

Aliud est perfecti æris
quasi subsidens fax cohæ-
rens imæ fornacum parti.

Vnter Ofenbruch in Bup-
fer Ofen.

Aliud fit ex pyrite Chal-
cathoso, multos dies, vt Calx,
cremato, donec rubescat, vt
Rubrica, vulgò Todtenkopff/
rote farbe. Etiam lutei exis-
tit

stet coloris Ochram ferè representans.

In Schreiberau ad Zaccum fl. iuxta ligneos lacus vbi paucis ab hinc annis coquebat vitriolum.

Luteo vtuntur Pictores & Arcularij: Rubro architecti regulas inficiunt.

Eisdem cum Chalcitide vsta viris obtinet.

Abstergit, adstringit, & veluti caustica virtute fluorem omnem comprimit. Ad putrescentia oris vlcera cum Melle vtile.

Dryites.

Eichenholz zu Stein worden.

Lignum est quercinum in lapidem duratum.

In vetustis Argenti fodinis Zischdorffij ad Boberum reperta est Quercus Anno 1597. lapidis duritie, Melantheria & Pyrite Atramento-fo quasi inuoluta.

Ebenum fossile.

Erdsstöcklin.

Lignum est nigricans seu purpurascens in lapidem mutatum.

In scrobe argillacea extra Hirsbergam.

Elatites.

Dannenholz in Stein verwandelt.

Habeo Vratislavia à D. Hieremia Gesnero Medico Gryphibergensi.

Exhalationes ardentes.

Witteringen / wenn zu Nacht Feuer aus der Erden scheuffet.

In montanis ad Sudetum radices Autumno frequentes. Aestate etiam nocturno tempore visui nostro occurrunt, ijs plerunq; locis vbi Metallorum venæ latent. Huc pertinent Ignes volantes & saltantes Irwisch qui noctu sæpe Viatores à via abducunt.

Ferri Metalla.

Schmiedberg oppidulum ad latera Gigantæ montis situm à fabrorum frequentia, ac si diceret Fabrorum Montem, denominatum, venis ferri celeberrimum.

Venæ diuites Pyritis ferrei puri nigricantis Rein gediegen Eisenstein / bricht gemein auff Schmiedebeeg am Eisenberg.

Albipolis oppidulum vs Schmiedeberg Boiemiam versus ad Albim fluu. primum,

Bbb

mum,

mun, ferri metallis nitet
vulgo Hoh Elbe.

In Raufchengrunde.

Querbach.

In Kalenberg circa fontes
Quisi.

Lapis ferri puri, Gediegen
Eisenstein/ Eisengraupen.

In Oupa fluu. legitur nul-
lis apparentibus venis.

Lapilli rubentes ferri fe-
races.

Röthliche Körner so Eisen
halten.

Lauantur in Schreiber Au
ad Zacum fluu. Aurum con-
tinere Peregrini quidam
mihi retulerunt.

Terra rubra pratenfis fer-
rugine quadam infecta.

Wiesen Eisenstein.

Ad Sagam Urbem & in
Giesmansdorff, alijsq; vici-
nis locis, vtpote syluis vastis
Görlicensibus magna in co-
pia eruitur, fossis ad altitu-
dinem tripedaneam actis.
Ea decennio renata rursus
foditur.

Vena Ferri prosa Eisens-
schüßig Kupfer Erz / Kupf-
riger Eisenschuß.

Cupferbergi.

Ferrum.

El Dreg.

Eisen/ geschmolze Eisen.

Ferrum tenax ductile.
Zäh / weich schmeidig Eisen/
Schmiedebergisch Eisen.

Ex hoc fiunt opera varia
& subtilia Schmidebergi.

Ferrum durum fragile.

Hart Eisen.

Hammer Eisen.

Quale circa Saganum in
Heiden cuditur.

Ferru refrigerat, adstrin-
git, siccit, digerit scirrhus
& Lienis tumores.

Vinum aut aqua in qua
candens ferrum sit restin-
ctum, potu Coeliacis, Dysen-
tericis, Spleneticis, Cholera
laborantibus & dissolutis
Stomacho, vel vrinam con-
tinere non valentibus auxi-
liantur.

Ferri squamma.

Eisen-Hammerschlag.

Latum est illud & tenue
quod ferro excidit, dum
percutitur.

Imposita calceis siccit pe-
des humidus odore graues.

Ferri scobs.

Limatura Ferri.

Rasura Ferri.

Eisenfeile.

Eiusdem cum Ferro fa-
cultatis.

Ex hac fit Crocus Martis
& Ele-

& Electuariū quod Cache-
Aicis commendatur.

Ferri scoria.

Σκωρία σιδήρεα Diosc.

Zunder/ Eisenschlacken.

Calefacit, siccatur, attenuat,
digerit validiss. Pulvis ex a-
ceto acerrimo decoctus Au-
res purulentas sanat.

Balneum ex Ferri scorijs
Schlackenbad adstringit, in-
crassat, sistit Menses super-
fluos, fluxumq; Hæmorrhoi-
dum; roborat Ventriculū
laxum, cohibet vomitum &
diarrhœam. Medetur Lieno-
sis, tumores pedum Oede-
matosos resoluit, Articulos
roborat,

Ferri rubigo.

Ῥίς σιδήρεα Diosc.

Ferrugo.

Eisenrost.

Ferri vitium est situs, ge-
neratur per putrefactionem
Ferri.

Egregiè restringit & siccatur
erosionis expers. Illita sa-
cris Ignibus & Papularum
eruptionibus medetur.

Fluores.

Glasse.

Translucidorum & opa-
corum fluorum varietatem
passim Metallici norunt.

Galena frugifera.

Ἰδος μολυβδαεὶδης Diosc.

Lapis Plumbarius.

Bleyertz/ Bleyglantz.

Bleyschweif/ Glasertz.

Vena est vel Plumbitan-
tūm, vel Plumbi & Argenti
simul.

Plumbago simplex seu di-
ues Bleinspeisigen Glantz.

Plumbago globosa Grob-
speisiger Glantz.

Turnoutij.

Gotsbergij.

Gabelz.

In Dietmansdorff.

Vis ei refrigerans & con-
densans. Cætera cum Ar-
genti spuma paria habet.

Galena sterilis inanis.

Blende.

Ein weisser tauber Glantz.

Colore non absimilis fru-
giferæ: sed prorsus est steri-
lis, omnis Argenti & Plum-
bi expers. Læuore faciliè
deprehenditur.

In Grounau ad Hirsber-
gam alijsq; Metallorum ve-
nis interdum occurrit.

Gemma huius.

Charcedonius candidus
non perspicuus.

Speckstein.

Bbb ij

Gamae

Gamelichen Gemmarijs.

Gemma minus dura, colore candida pinguior sedimento nigro & cinereo.

In Ducatu Nissenli reperitur.

Ad Ectypas sculpturas aptatur.

Granatus.

Rubinus nigricans.

Granat/Granatlin.

Rubra est gemma perlucida similis colore Balauftijs, obscurior Carbunculo.

Lauatur in Iseræ prato, plurimisque Suditorum riuis.

Amuleto Cor confortat, Atræ bilis symptomata, hoc est, tristitiam timoremque demulcet.

Granati sylvæ, non perspicui.

Matrices Granatorum.

Wilde rothe Granaten.

Granaten Mütterlin.

In metallis plumbi candidi & ferri.

Nullius quod sciam usus.

Gypsum.

Thos.

Gypsi vena.

Gyps/Sparsalck.

Saxum, Calcis parens est, ut lapis specularis extremitas videtur gypsi.

In Lygijs.

Terrenæ est substantiæ. Vis eius siccans, adstringens, obstruens, emplastica.

Sanguinis eruptiones sudoresque cohibet & Menses ac Dyfenteriam sistit.

Potum, quia alligat & obstruit venas, spiritum intercludendo interimit.

Halinitrum.

*A*Λινιτρον.*

Sal petrinus factitius.

Salpeter/Salnitro.

Coquitur ex terra pura falsuginosa è stabulis eruta.

Valde tenuium est partium, saluam ex alto prouocat & aluum subducit: attenuat crassos humores, viscidos incidit.

Hematites verus.

Αἷδος αἰμαλιτμος.

Rechter Blutstein.

Refrigerat, adstringit, extenuat, excrementa reprimat. Contra omnem Hæmorrhagiam utile remedium.

Vnicum habeo in cella Cereuisiaria Hirsbergæ repertum, in propria vena nondum

nondum in Silesia deprehendi.

Hamatites spurius.

Blutstein.

Braunstein / Braunfarbe
Figulis.

Non procul ab arce Leh-
nensi ad Boberum fl.

Vnus crocum Martis co-
lore & effectu refert: ad san-
guinis eruptiones compes-
cendas vtile remedium.

Figuli Hirsbergij cotin-
gunt fictilia.

Hyacinthus.

ῥάκινθος.

Amethystrus Nonn.

Ein Jazinth / Goldstein.

Gemma est fulua seu flauo
coloris.

Ad Iseram fluu. & torren-
tem Georgij prope Hirsber-
gam.

Hyacinthus citrina.

Hyacinthus aurea.

Ein gelblicher Hyacinth.

Ad Electri colorem in-
clinat.

Iisdem natalibus gaudet.

Hyacinthus imbecillita-
tem pellere fertur & contra
pestiferæ contagionis noxas
maximopere commédatur.

Hyacinthus aquea.

Ein Bleicher oder wässri-
ger Hyacinth.

In flauo albescit.

Ibidem.

Vilis est & effœtarum vi-
rium.

Iaspis.

Ἰᾶς ἰάσπις Diosc.

Ein Jaspis.

Jeschke vulgo.

Gemma, Antiquis sum-
mo in precio habita, multa-
rum specierum.

Iaspis viridis.

Ein grüner Jaspis.

In Sudetis.

Oculorum aciem suo vi-
rore reficit.

*Iaspis viridis guttis sangui-
neis aspersus, siue rutilis
punctis stellatus.*

Ein grüner Jaspis mit ein-
gesprengten roten Blutes-
tropffen.

In agro inter arandum
Kempnicij repertus.

Aduersus venena vsurpa-
tur, sanguinem vndecunq;
manantem gestat⁹ cohibet.

Iasponyx.

Jasponychel.

In vna sui parte est Iaspis,
in altera Onyx.

Iaspis

Iaspis ruber.

Ein roter Jaspis.

Iaspis ruber spurius.

Ein roter bastart Jaspis.

Huius ingentia frustra ad
Kauflungam pagum vidisse
memini.*Iaspis variè coloratus.*

Gefarbierter Jaspis.

In Sudetis Boiemiam
versus am Zrshfenberg.Multi annulis Iaspidem
inferunt, scalpuntque in eo
Draconis seu Scorpionis ef-
figiem, Sole versante sub si-
gno Scorpionis. Quem à
Calculo præsruare & ven-
triculo languido robur ad-
dere, summopere prædicant.*Iolithos.**Althos.*

Lapis violaceus.

Violenstein / Steinblüten
Sil.Lapis est cinereus seu po-
tius Muscus subrubeus, qui
acrescit saxi firmiter ac si
lapides efflorescerent, odo-
rem Violæ Martiæ spirans.In petrosis Suditorum su-
percilijs.Odor Cordi familiaris ac
gratus.

Reponitur ad vestimenta,

vt ijs odorem conciliet & à
tineis præsruet.*Iudaicus lapis.**Althos Iudasius Diosc.**Turkathos.*Jüdenstein / steinerne Oli-
uen / Oliuenstein.Lapis est oliuæ penè spe-
cie subrotundus, seu glan-
dis effigie.Lineis inter se æqualibus
velut torno factis distingui-
tur.Non solum in Iudæa nasci
hunc lapidem, verumetiam
in Silesia, hætenus depre-
hendi.Calculosis & difficulter
mingentib⁹ commendatur.
Pulu. cum sacch. Candi in-
fantibus Calculosis à femi-
nis exhibetur.*Lapilli nigri splendidi.*

Globuli nigri lapidei.

Schierle / schwarzer
Schierle.Differunt magnitudine,
figura, colore.Lauantur ad Iseram fl. &
torrentem D. Georgij.Ab Italis expetuntur ad
fluores Zum Schmelzwerke,
non vt inde Aurum elici-
ant, ex vulgi persuasione.
Carent enim Metallo.*Lapis*

Lapis fissilis sterilis.

Fissile nigrum sterile.

Tauber Schiefer.

Lapis fissilis arosus.

Rupfer Schiefer.

Grauer Rupfer Schiefer.

In cinereo candicat. In Hermansseiffen circa Arnobium generos. Baronis Hannibalis à VValtstein.

Lapis fissilis plumbo candido fertilis.

Schiefer Zwitter.

Zihn Schiefer.

In Gieren ad Quissum fl.

Lapides topiacei fistulosi.

Ad thermas D. Iohannis & in riualo pagi Schönvalde.

Lapis in viridi caeruleus arosus.

Ein schöner glatter blau-grüner Hornstein / sieht aus wie ein Türkis.

In ararijs Cupferbergi.

Lateres.

Ziegelstein.

Ex terra pingui & arena formantur & in furno coquantur ad rubedinem.

Candentes aceto acerri-
mo extincti Linteo inuoluti

impositi, Lienis durities resoluunt.

Chirurgi puluer. in Emplastris ad fracturas miscent.

Olenm ex his confractis, quod vulgo Philosophorum vocant, paratur.

Lithargyrium.

Αἰθαργύρεος.

Argenti spuma.

Glette / Silber Glette.

Silberschau m.

Nihil aliud est quam Plumbum Auri vel Argenti vaporibus commistum. Fit dum ab Argento Plumbum separatur.

Ilkusij & Tarnouitij.

Χρυσοῦς, Lithargyrium Aureum, ob coloris similitudinem. Rubet enim.

Gold Glette / Röthlichte Glette.

Αργυρεῖον, Lithargyrium Argenti, Silber glette.

Μολύβδης Diosc. Lithargyrium Plumbi.

Bleyglette / Bley Schaum.

Chryslis omnium optima præcipue quæ foliata.

Siccatur sine manifesto calore aut frigore, modicè adstringit & terget; mollit, caua explet, excrecentia in carne reprimat, ad cicatricem du-

cem ducit, refrigerat & occludit. Ad intertrigines Femorum prodest.

Figuli ea incrustât fictilia.

Magnes.

Ἀἰὼς μαγνήτης.

Siderites, Lapis Hercule⁹.

Ein Magnet/Magnetstein.

Lapis est ferrei coloris nō admodum grauis, attrahens ferrum.

Ad fontes Albis, & riuulum, den Birschbrunnen eruitur: item Cupfferbergi.

Reseruatur obrutus ferri squama.

Hæmatitis modo adstringit.

Marga.

Ἀθήγεινος.

Mergel.

Terra est pinguis & spissa.

Marga candida pinguis mollis.

Marga liquida, Medulla Saxi.

Weisser flüssiger Mergel.

flüssiger Steinmarck.

Marga candida crustacea.

Lithomarga alba.

Weisser schirblicher Steinmarck.

In latomijs & saxorum commissuris.

Contra Epilepsiam & Dys-

enteriā albam dictam, Vorn weissen wehe vulgi medela.

Marga candida friabilis.

Meel Erde.

Substantia seu terra quædam est fungosa, alba, leuissima, farinæ instar, saporis & odoris expers.

In Lygijs ad Brusnitium.

Aquæ mixta, albo Lactis colore eam inficit. Siccat sine morfu. Vlceribus deficcandis inspergitur. Intertriginem & ambusta sanat.

Marga rubra.

Roter Steinmarck.

Eius natales saxorum fibræ sunt in Lygijs.

Eisdem vires cum Bolo Armeno habet.

Prodest ruptis, ex alto deuolutis, Hæmoptoicis, Dysentericis. Medetur fracturis ossium, venenis morbisque pestilentibus resistit.

Marga lutea, gecler Steinmarck.

In Grode lapide.

Marga Cinerea lapidosa.

Aschfarber harter Steinmarck.

In Lygijs.

Margarita fluuiatiles.

Μαργαρίτης.

Eucis Perlen.

Inter

Inter arenas Quissi fl. prope Gryphibergam lauantur pulcerrimæ Pisi magnitudine, rotundæ, teretes, oblongæ. De his inter Aquatilia, Deo dante.

Marmor Metallicorum.

Spathum Metallicis.

Spath.

Saxum est politius, densius, in Metallorū venis obuium. Colore variat.

Marmor porphyrium rubrum.

Ein roter Marmel.

In Arnisdorff prope Arnobium.

Marmor Zotense varium.

Marmel am Zottenberg.

Marmor est subcinereum venulis nigricantibus & albidis ex luteo virescentibus.

Ad Zabothis montem eruitur.

Fiunt ex hoc Epitaphia, Mortaria & porphyrij lapides.

Marmor nigrum.

Βόρρας, Misenus.

Bisaltes, Agric.

Siderites, Gesu. à ferri colore & duritie.

Ein Meissnischer probierstein.

Ein Meissnischer harter Eisenfeger Marmel.

Crescit forma & magnitudine ligni mediocris, singularis quidem, sed copiosus atque ita iunctus coaptatusque, veluti ab Arculario arte commissus esset: septem, sex, quinque nonnunquam; sed rarius quatuor angulorum, omnino figura trabis erectæ, foris lævis & tactu minimè asper, ferrugineus, duritie Adamantina.

Extra Laubam ad Quissum fl. Im Steinbruch vorm Brüder Thor.

In pago VVise ad Gryphimontium. Greiffenstein arx super eiusmodi saxum extructa est, quamuis paululum degeneret. His lapidibus arx Stolpa Misniæ cum adiunctis ædificijs insistit.

Fabri ferrarij, bractearij (qui Aurum cudunt) & Librorum colligatores ad artificia sua incudis vice, Stolpeni vtuntur. Verùm prius ad vsum aptari necesse est.

Melanteria.

Μελαντρία.

Atramentum nigrū, Offic.

Schwartz Atrament.

Ccc

Vena

Vena est Chalcanti pura non cocta.

In Zischdorff, & ad Gigantæum montem. Ex hac sæpe Atramentum sutorum Capillorum seu lanuginis instar efflorescit.

Sapore adstringit vt triolum.

Mica.

Sterile nitidum.

Steinglimmer / Sandglimmer.

Eisenglimmer.

Varia est, coloris aurei, argentei, galenæ, res aliæ nullius momenti.

In lapidibus, arenis, metallis lucet, vt his adnata separari non possit.

Morion.

Fluor nigricans pellucidus, Agric.

Ein schwarzer durchsichtiger Stein.

Color ei aut nigerrimus aut cum nigro mixtus est alius color, nempe vel Carbunculi vel Sardæ vel Hyacinthi. Videtur radix esse istarum gemmarum.

In agris & propria vena repertus.

Onychites.

Chalcedonius.

^{Onyx}, Onyches.

Ein Charcedonier / Katzen-donier / Onychel.

Gemma est vulgaris è fusco & albo composita, seu pallescens, humanum vnguem colore subliuido referens durior Crystallo.

Onyx candidus pellucidus, Ein reiner Charcedonier.

Onyx impurus, ein trüber Charcedonier.

Onyx cornei coloris lacteis zonis distinctus, Ein Charcedonier mit weissen Strichen.

Sculptoribus utilis.

Libidinem coercere & agitationes phantasticas ex Melancholia subortas pellere, nonnulli tradunt.

Ophthalmici.

Augensteinle.

Lapilli sunt laevissimi lubricique Chelidoniæ instar, incertæ figuræ & inæqualis magnitudinis. Quidam rotundi, alij oblongi teretes instar seminis Lini; alij Milij magnitudine; quidam Lenticulis pares: alij maiores. Color eis ut plurimum lucidus Crystallo; nonnullis fuscus. Durities miræ splendor ceu oleo inuncti.

In

In scaturigine Therman Hirsbergensium.

Oculos expurgant, si quid in eos inciderit.

Osteocollus.

Φαρμάκτος, ὀστέος.

Stein Beinwelle / Bruchstein.

Lapis est fistulosus candidi & cinerei coloris, ex sabulo ossium specie prognatus. Varia ei figura.

Nascitur in fonte limpidissimo pagi Schönvalda.

Siccatur, adstringit sine acrimonia, sistit, linguæ leuiss. adhærent eius frustula.

Ossa fracta per aliquot dies sumtus & extrinsecus Emplastris additus mirifice consolidat.

Dentibus nitorem conciliat.

Plumbi candidi venæ.

3 Zhn Bergwerck.

Venæ, plumbi candidi feraces sunt in tractu isto Suditorum, vbi Quissus exoritur: veluti in Gieren, Querbach, Vlrichsdorff, &c. ditionis generosi Domini Christophori Gutschij.

Plumbum candidum nativum purum in lapillis cinereis & fuscis.

Zhn greuplin.

Gediegen zhngraupen.

Granula parva fusca lauantur ad Gigantæum, vbi Albis exoritur: quæ si Carbonibus candentibus iniiciantur, Stannum purum finium reddunt.

Seiffen Zhn.

Plumbum candidum.

Stannum germanicum.

Κασίτερον.

Zhn.

Coquitur ex lapide fissili, Quartzo & alijs solidis lapidibus, auffm Gieren.

Ex hoc parantur omnis generis stannea vasa.

Plumbum nigrum.

Μόλυβδος.

Bley / Schwartz Bley.

Liquatur Tarnovitiij & Ilkufij ad fines Silesiæ, ex terra flava.

Plumbum refrigerat admodum & adstringit.

Charta plumbea, ἐκαστος μόλυβδος, Bleyblech / Lumbis instrata Genituræ fluorem per insomnia prohibet insigniter refrigerans, Gangliumq; dissipat illigata.

Mortarium fit ex plumbo in vsum Medicum ad quosvis liquores frigidos in ea

CCC 2 ducen-

ducendos vt crassescant se-
ipsoque frigidiores euadant.

Plumbum vstum.

Μόλυβδος καυαυθός, Diosc.

Bley asche.

Mistas habet vires. Re-
frigerat, siccatur, attenuatur. Ul-
cera rebellia, cancrum, carne
implet ac cicatrice tegit.

Plumbi recrementum.

Σκωρία μολύβδου, Diosc.

Abstrich / Abzug / Bley-
schlacken.

Pars est terrea & lapido-
sa venæ plumbi, eliquata si-
mul cum plumbo.

Maiores habet vim ad-
stringendi & siccandi quam
plumbum vstum.

Pramnion.

Schwartzter Crystall / vulgò.

Gemma est nigerrima ra-
dice & mucrone.

Crystalli figurâ sexangulâ.

In propria vena post ar-
cem Kynast.

Pulvis tormentarius.

Pulvis pyrobolus.

Büchsen puluer.

Paratur ex Carbone Tiliæ,
Nitro, Sulphure & aceto a-
cerrimo.

Contra pestem & Vnga-
ricam febrem à Quibusdam

bibitur. Scabiem Capitis
sanat contagiosam.

Pyrates.

Πυρίτης λίθος.

Marchasita, Arabum.

Ein Byß / Marchasit.

Lapis est varij coloris vt-
plurimum anei.

Foditur omnium Metal-
lorum ferè fodinis genere &
colore diuersus; plerunque
tamen aureis scintillis vel ar-
genteis seu galenæ respersus.

*Pyrates prorsus aurei co-
loris.*

Marchasita aurea.

Gold Byß / Goldgeeler Byß.

Schöner geeler Byß / wie
ein Gold.

Est propriè Pyrites Aeris
& propria Arabum Marcha-
sita, vnde æs conflatur.

Frequens in ærarijs Cup-
ferbergi.

Mista ei vis sec. Aëtium.
Excalefacit, siccatur, abster-
git, insigniter ea, quæ coie-
runt in aliqua Corporis par-
te, discutit.

Collo Infantum appen-
sus, Lemures & Lamias non
timere, superstitione Arabes
scripto prodiderunt.

*Pyrates coloris aurei ar-
gentosi.*

Gees

Geeler Byß/ der eine farb
hat wie ein Reiniſch Gold o=
der Meſſing.

In Metallis Plumbi can-
didi zum Gieren / auff der
Kupferzeche, & aris, Cup-
ferbergi.

Pyrites argentarius.

Marchaſita argentea.

Ein Waſſer Byß.

Ein Weiſſer wäſſriger Byß

In Rieſgrund & alijs ple-
riſq; locis. Sulphureus eſt &
Metalli expers.

Pyrites ſimilis Galena.

Kiſum Metallicis.

Pyrites Reichenſteini.

Ein glantziger Byß.

Colore Galenæ ferè eſt.

Vena communis Argenti,
Auri, Plumbi nigri Tarno-
uitij, Reichenſteini, Gots-
bergi & in Dietmansdorff.

Pyrites cineraceus.

Ein grawer Byß.

Ex hoc Aurum & Argen-
tum Reichſſteini & Alden-
bergi excoquitur.

Pyrites coloris ferrei.

Pyrites ferreus.

Eyſen Byß/ Eyſenſtein/ Ei-
ſen Erz.

Opacus eſt, minimè luci-
dus. Ex hoc ferrum conſla-

tur in Schmiedeberg tenax
& tenue.

Pyrites atramentofus.

Lapis Atramenti ſutorij
plenus.

Atrament Byß.

Kupferwaſſer Byß.

Cupferbergi in Zuckman-
tela, in Rieſgrund, Schrei-
berau.

Conſlatur ex hoc Atra-
mentum ſutorium.

Pyrites innatus Dryita, ex
quo Atramentum tenue la-
nuginofum efflorefcit.

Kupferwäſſriger Byß / in
einer verfallener Eiche ſo zu
Stein worden.

Qui in Schreiberau effo-
ditur, Aluminis & Atra-
menti ſutorij ferax eſt.

*Pyrites rotundus gle-
boſus.*

Boden Byß Metallicis, à
teſtium ſimilitudine, Mara-
ckſitt.

In Querbach.

*Pyrites quadratus teſſeris
ſimilis.*

Ein würfelter Byß / Vier-
ecketer Byß.

Schmiedebergi in metal-
lis ferri. Ferrum rubedine
inficit & fragile facit.

CCC 3

Pyri-

Pyrites Cubicus.

Ein lenglichter Wassertyß.
In Lygijs, sterilis est &
metalli expers.

*Quartzum.**Silex Metallicis.*

Ein Quartz / Ein Riesel-
stein.

Species Marmoris Non-
nullis. Candidus est, sublu-
teus & subæfij coloris.

Rubinus.

Carbunculus ruber paru⁹.
Spinellus, Espinella La-
pidar.

Ein Rubin / Spinell.

Color huic egregiè ruber
fulgorque sed plerunque
paruus.

In Iseræ prato, riualis &
torrentibus Montium inter
arenas lauatur, vbi & Au-
rum plerunq; inuenitur.

Aduersus pestilentem Aë-
rem pro insigni amuleto
portatur.

Rubinus candicans.

Carbuncul⁹ candicās Agric.
Ballasius.

Ein Wese.

Weisser schieler Rubin.

Extremo visu nubilum
quid præfert, aliquantulum
rubens.

Rubinus gilvus.

Lignitis Agric.
Carbunculus remissior.
Ein gelblichter Rubin.

*Salsula.**In Salzbrunnen.*

Paruo milliari ab arce an-
tiqua & celebri Fürstenstein,
sub monte qui vulgo der
Hochberg nominatur, in pa-
go zum Salzbrunnen ad ri-
pam torrentis arenoso solo
emanat Aqua pura, clara,
limpida, quæ ob prædomi-
nantem salsedinē der Salz-
brunnen nuncupata fuit.

Cingitur muro quadrato,
in cuius medio, doliolo in
terram defosso fons includi-
tur.

Sulphuris exigui est par-
ticeps: Ochra etiam ferrugi-
nosæ, Aluminis, maxime
Salis materiam habet.

Ochra rubra ferruginei
coloris ad latera & canalem
adhæret: insuper sulphure-
um quiddam aut Oleagine-
um telæ aranæ simile colo-
ris varij innatat. Odoratus
grauem fumum ex sulphure
obijcit. Sal copiosum per-
mixto Alumine ex decoctio-
ne & destillatione depre-
henditur.

Sapor

Saporem salis aliquantum adstringens.

Potum gratissimus est & vicinis Agriculis notus, qui Æstate & Messis tempore ad potum quotidianum summo perè desideratur.

Sitim enim restinguit, appetitum excitat, ventriculum laxum roborat & à pravis humoribus liberat, sine Abdominis seu Intestinarum inflatione.

Siccatur, aperit, abstergit, consumit, roborat, Ventriculo relaxato & pituita referto subuenit. Cruditates emendat, concoctionem promouet, & Mesaraicas venas referat. Renum, Vesicæ obstructions tollit, diureticus est, Calculos pellit. Ventris dolores & tormina ut Colicam potum aufert.

Ferunt Hydropicos, Tabidos & Cachecticos eius frequenti usu fuisse pristinae sanitati restitutos.

Potum in Bobus Lactis copiam augere gens rustica affirmat: Ob id frequenter Boves ad scaturiginem aquam sorbentes accurrunt.

Sapphirus.

Κίανος.

Σάπφειρος λίθος, Diosc.

Ein Saffier.

Sapphirus mas cæruleus.

Ein blauer Saffier.

Pasim Goldbergæ, Leobergæ, Boleslavia, Hirsbergæ in torrentibus & riuis lauuntur Sapphiri; magni & pulcherrimi in prato minore Iseræ, qui expoliti sæpe pro orientalibus veneunt.

Additur præparatus Cardiacis & Antidotis, quæ aduersus venena & pestiferos affectus parantur.

Eadem præstare amuleto Gemmarij asserunt. Terrores etiam vanos & Melancholicos tollere & atræ bili aduersari idem confirmant.

Oculorum vires reficit, tranquillos reddit, & sitangat sapius, à variolis ne infestentur, præseruat.

Aliud genus Sapphiri opaci non perspicui nigricantis splendidi loco citato vbertim per lotionem colligitur & pharmacopœis pasim pro veris obtruditur.

Gar kleine schwarzlichte Saffier von der Iserwiese.

Num rectè & tutò veri Sapphiri in medicamentis locum suppleant, docti Medici dijudicent.

Sapphi-

Sapphirus candidus.

Sapphirus candidus.
Cyanus subcandicans.

Ein weisser Saffier.

Notior est viliorq; , Adamantem admixtione candidi coloris interdum ita æmulatur, vt nonnullos plerunque fefellerit.

Sardonyx.

Sardonyches.

Partim Carneol / Partim Onychel.

Sardonychel.

Mixtum habet è Sarda & Onyche nomen. Rubro enim Sardæ corpori candidum Onychis sternitur.

Aduersus venena & animi fastum valere creditur.

SAXUM ARENARIUM.

Sandstein / Werckstein.

1. Candidissimum, ex tenuissima arena cõstat, quod sculptura efficitur æquale.

Schlemstein.

Naumburger Werckstein.

In latomijs Naumburgi ad Quisum.

Fiunt ex hoc Epitaphia, Columnæ & alia.

2. Candidum, arenam habet crassiore : quale est Leobergense.

Leoberger Werckstein.

Durius est & crassius.

3. Cinereum, cui arena est crassissima & Saxum vocatur molare.

Μολινος λίθος.

Grob Sandstein / Mülstein.

Eruitur in Grunou agri Hirsbergij, ad Lehnium in VVundschendorff, in Gufmansdorff & alibi.

Ad ædificia præstat cæteris, cum Aëris iniurias cæteris facilius ferat.

Lapidis Molaris feruefacti & aceto acerrimo extincti vapor naribus exceptus, præstantiss. remedium Hæmorrhagiâ laborantibus.

SAXUM CORNEUM.

Lapis corneus.

Silex.

Hornstein / Bisplingstein.

Sewerstein.

Ad flumina, in agris, cuniculis calculorum notissimum.

In sternendis vijs & igni vsus præbet.

SAXUM.

Grindstein.

Saxum vile quod ex scabie nomen accepit ex diuersa materia compositum.

Schisti nodi.

Glaschöpfste. Metal.

In ve.

In venis Metalli, *Em*
Schlegel/ Ducat. Niss.

Stannum.

Plumbum candidum ar-
gentosum.

Zinn / welcher Silber heist.

Plumbum est candidum,
cui Argentum est immixtū.

Zum Gieren. Separandi
modus nondum innotuit.

Stibium.

Antimonium, *Officin.*

Antim, Diosc. Sic.

Spießglas / Spießglantz.

Metallica res est, seu me-
tallum sui generis, colore
nonnihil simile plumbario
lapidi: sed magis nitet &
candidius est.

Huius venæ Aldestadij, v-
bi etiam excoquitur. Vis e-
ius vsto Plumbo similis. Re-
siccat, adstringit, reprimat,
meat⁹ obstruit, excrementia
in carne cohibet, vlcera ad
Cicatricē perducit; sordes &
oculorum vlcera expurgat.

Stibij vitrum.

Stibium Hyalinum.

Antimoniū præparatum.

Spießglas.

Modum liquandi Chemi-
ci norunt.

Vim deiectionem sortitur
vehementissimam, quam a

maligna seu venenata qua-
litate, quā Naturæ humanæ
aduersum est, consequitur.
Copiosè enim per aluum,
per os & per poros insensi-
biliter expurgat, maxima
cum virium iactura.

Veteres hoc non vteban-
tur ad purganda Corpora.
Hodie apud Empiricos &
Tonsores nihil vulgatius, quā
eo sine iudicio aduers⁹ quos-
uis Morbos, non ad purgan-
da Corpora, sed ad iugulan-
dos homines abutuntur.

Stiria aruginosa.

Grünlechte Zapfen in Kup-
fergruben gewachsen.

In puteis vetustis Cupfer-
bergi stiria nascuntur ob-
longæ, teretes, pollicem cras-
sæ, ex vna parte in acutum
desinentes, intrinsecus ferru-
ginei coloris, in superficie vi-
rides Chrysocolia quasi tin-
ctæ; aliquando concauæ.

Stiria lapidea.

Altes steinliches.

Stein Zapfen.

Lapis est stiria instar ob-
longus, albus seu cinereus,
grauis, durus, ex petris &
subterraneis antris stillans.

Passim in montanis occur-
runt.

Valent ad ossa fracta.

Ddd

Xenob.

Succinum aureum fossile.

Χρυσόπληκτον.

Succinum fulvū in rubro.

Goldgeeler Agstein.

Rotgelber Börnstein.

A Pruttenico nec colore,
nec odore & perspicuitate
differt.Sub arce Greiffenstein ad
pagum Rabsau eruitur.Pestem & omne Veneno-
rum genera arcet, eiusdem
cum Pruttenico facultatis.*Succinum nigrum.*

Αἰδος γαγύτης Diosc.

Ampelitis terra.

Schwarzer Börnstein.

Schiferichte Steinkolen.

Piceæ Carbonibus est si-
mile assulatim subscissile, bi-
tuminosæ substantiæ.

Vinū habet dissipandi.

Sulphur viuum.

Θείον ἄπειρον Diosc.

Schwefel.

Sulphuris venæ passim in
Eckersdorff Comitatus Glo-
censis: Cupferbergi ex Py-
rite purum statim suum ef-
florescit: in Gerardsseiffen
& alibi.Calefacit, siccatur, extrahit,
terget, discutit & celeriter
concoquit.*Sulphur factitium.*

Θείον πετροποιέτον.

Getödtter Schwefel.

Kramer Schwefel.

Leprâ, Lichenes, scabiem,
ungues scabros cum Tere-
binthina aufert illitum.Pruritus Corporis cum
Nitro deterfum sedat.*Sulphur sublimatum.*

Sulphuris flores.

Schwefelblumen.

Cal. Linctū profunt tussi-
entibus, sudores propellunt
& valde siccant.Dantur Asthmaticis, Hy-
dropicis, Phthificis.*Terra.*

Γῆ.

Erde.

Terrarum variæ sunt spe-
cies; quædam simplices, aliæ
compositæ.Simplices variant colore:
Alia rubra, candida, pulla,
cinerea, fulua, nigra.Sapore: Alia pinguis, dul-
cis, salsa, amara, adstringens.Alijs qualitatibus: Alia
licca, densa, soluta, arenosa,
calculosa.Composita est, quæ cum
re fossili vel aliquo succo est
permista; vel lapidibus, suc-
cis concretis aut metallis.Omnis Terra ad meden-
di v-

di vsum recepta summam & primam vim habet refrigerandi, meatusq; obducendi, occludendiq; sed specie distat, cum alia adiunctis quibusdam ad alia sit utilis.

Terra figulorum albisima.

Weisse Erde.

Weisser Malthon.

Terra est albisima, quæ tactu pinguis deprehenditur in aqua mox diffuens.

Ad ripas Boberi fl. infra Leobergam colligitur.

Figuli hac pingunt fictilia, Pictores in Officinis Vittrarijs, vitra.

Terra violacei coloris.

Violbraun Erde.

In Lygijs.

Terra figulorum flava.

Terra crocea Boleslauiensis.

Geele Erde.

Braunfarbe Figulis.

Terra est flava Ochrea ferè similis; quâ Figuli Boleslauienses fictilia inficiunt, quæ vsta purpureum acquirunt colorem.

Terra variegata.

Gefarbierte Erde.

Mixti est coloris partim candidi, partim lutei & vio-

lacei, strijs rubris intercurrentibus.

Circumforanei hanc magnarum virium & ex remotissimis locis allatam prædicant.

Admixto Vitriolo stirias parant oblongas, Vlceribus putridis & malignis conueniens iacantes remedium.

Eruitur circa Brunsitium in Lygijs.

Terra Sigillata Stregomienfis.

Terra sigillata Slesiacæ.

Terra sigillata germanica.

Sigillum Stregomienfe.

Axungia Solis Chemicorum.

Striegische gesiegelte Erde.

Schlesische Sigillata.

Geele Terra sigillata.

Terra est flava, pinguis & viscosa, instar butyri in aqua vel ore diffuens.

Generatur in Auri fodinis montis Acuti seu D. Georgij ad Stregomium oppidum Duc. Suidnicensis, inter durissimas rupes. Inde eruitur, & summa diligentia, ordinatione Magistrat^o præparatur & in formam orbiculorum, impresso sigillo vrbis redigitur.

Naturæ est Solaris & veluti Extractum Auri in visceribus

Ddd 2 ribus

ribus terræ densatur. E genere est Alexiteriorum. Inprimis aduersatur toxicis, philtis, ac venenis crudelissimis ac robustissimis, aut cuiusq; generis per os assumptis; eaque per vomitum expeditissimè ac felicissimè reijcit, si vel antè vel statim post hausta venena sumatur: sin aliquanto tardius per sudorem eadem expellit.

Eadem Naturæ, admiranda facultate crudelissimo & horrendo Pestis contagio resistit; non solum ab hoc præseruando tutos reddens eos qui hac vtuntur; sed iam infectos & semimortuos ab Orci faucibus & præsentissima Morte, miraculosa celeritate reuocando.

Non dissimili virtute omnium ferè venenatorum Animalium & Insectorum moribus, ictibus aut punctiombus, itidem vulneribus ab infectis & venenatis armis, quocunque modo illatis, si quid aliud, promissimè medetur.

Singularem & suauem quandam amicitiam & admirabilem sanè sympathiam cum vitalibus humani corporis partibus habere compertum est, ita vt mi-

rum in modum Cor ipsum confortet, Cerebrum reficiat, & alijs quibuscunq; viscerum malis strenuè aduersetur. Hinc omnem ferè Cephalalgiam demulcet, Cardialgiam remouet, palpitacionem Cordis sedat, Oculorum vulnera & laciones, inflammationes, lippitudines ac fluxiones curat. Itidem in Testium & Cerebri vulneribus, inflammationibus ea remedia præstare hanc nobilissimam Terram Experientia docuit, quæ vix vlla alterius generis medicina vel promittere, vel exercere possit.

Contra omnem Hæmorrhoiam, siue ex venis siue ex arterijs ipsis vel ex quacunque tandem Corporis parte sanguis effluat, nullum præstantius aut fortius remedium.

Simili quoq; ratione Catarrho, Rheumati, Coryzæ ac grauidini medetur.

Dysenteriam, Lienteriam, Diarrhœam atq; omne Ventris molestum profluuium non minùs feliciter, quàm commodè curat & omnè hypercatharsin sistit.

Ambustis vel ab igne vel ab aqua feruente, vel lique-

factis

factis Metallis peroptimè succurrit, tū prohibendo ne ascendant pustulæ, tum partes oblasas citissimè restituendo.

Vulnera recētia & vlcera in ueterata ac maligna pulcerimè sanè ac maturè curat.

Contra Anginam & aliarum partium internarum inflammationes præsentissimum est remedium.

Contra pruritus, scabiem fœdam ac curatu difficillimam commodissimè hæc Terra vsurpatur.

Omnibus Morbis, qui per sudores expelli queunt, propulsandis conuenientissima.

Hæmoptoicis, Phthisicis, exiccando vlcus Pulmonum & alijs Pulmonum vitijs multum utilis.

Tandem optimum præseruatium aduersus aërea subterranea; venena. Ea propter fossoribus Metallorum vtilissima. Attrahit enim omnem Aërem noxium ad se venenatumq; vnde excellentissimum Bezoarticū.

Sigillata hæc Slesiacæ, studio & industria Iohan. Montani Medici clariss. detecta, Viris magnis ac eruditissimis multò nobilior & præstantior censetur adstipulante Ex-

perientia, quàm vetus illa Lemnia, quæ rarò in Officinis legitima habetur. Cuius locum rectè & tutò supplere potest.

Pharmacopœi sibi diligenter caueant ab Impostorum Sigillata, quæ potius lutum aut argillaceū quiddam in formam placentularum affabrè affictum & varijs notis insignitum passim credulæ plebeculæ obtruditur, magno sæpe Aegrotantium incommodo.

Genuinam iusto præcio quiuis habere poterit à Senatu ampliss. vrbis Strigomienensis.

Terra Sigillata candida.

Bolus candidus Legnicensis.

Terra sigillata Goldbergensis.

Axungia Lunæ Chemicis. Weisse Sigillata.

Lignische gesiegelte Erde.

Ad Goldbergam in Lygijs & Stregomium.

Colore alba est & ex Argento oritur.

Agnatam & ingenitam cum Argento vim & Virtutem in medendo fortitur unde ad ea, quibus argenteæ medicinæ conducunt, vsui.

Ddd 3

Au-

Aurea minus aestimatur. Omnes Capitis dolores mulcet & mitigat. Cerebro familiaris. Ad Diarrhoeam, Dysenteriam, albumque Menstruorum fluorem apprime utilis.

Terra Sigillata prasinæ.

Terra sigillata ex luteo virescens.

Axungia Veneris Chemicis.

Geelgrüne Sigillata.

Pinguis est terra ex luteo virescens.

In puteis & venis ararijs Cupferbergi & Goldbergæ ad Haselampagum inuenitur.

Aeris & Aeruginis naturam imitatur sed minus acris. Siccat, abstergit, extenuat, expurgat. Ulcera putrida & maximè à Lue venerea suborta curat. Chirurgis utilis intra Corpus minimè sumenda.

THEBMAEHIRSBERGENSES.

Der warme Brunn.

Das Hirschbergische warme Bad.

Hæ ab Hirsberga regali oppido parui miliaris itinere, intra Sudetes elegan-

ti planitie ad Zacum fluvium Meridiem versus scaturiunt.

Loca quæ Balneis destinantur, duo sunt exiguo intervallo à se diuisa: utraq; scaturigo colligitur in scrobe effossa, quælibet in propria. Quarum altera quæ ligneo pariete asseribus continetur, Balneum ligneum seu Egenorum, *Das hölzerne Bad / der armen Leute Bad* appellatur: Quæ verò lapidibus quadratis foris circumdata est, intus verò asseribus, Lapidearum nomen habet, *Das steinerne Bad* primæ auctoritatis hominibus saltem dicatum.

Lapideis contiguum est Sudatorium, in quo decimo quarto quoq; die solent sudare & scarificare, præsentem Balneatorem ex Frideberga oppido cum Incolæ tum peregrini.

E latere occasum versus ædes sunt duplices lapidibus extructæ, hypocaustis, cubiculis, cellis ad lauanti-um usum distinctæ. Quæ Thermis annexæ, spectant ad Gen. Dom. Christophorum Gutschium, & lauanti-bus commodissimæ sunt,
Des

des Herrn Gutschen Haus: paulò remotiores sunt, ad Zacum fl. quæ vulgo der Probsthof ad Abbatem Grissouiensem pertinent.

Plurimæ circumcirca Rusticorum casæ, quæ etiam hospitium peregrinis præbent.

Pagi ad Zacum fluu. & in Montium conuallibus frequentes.

In monte præcelso montana versus Castrum probè munitum, nobiliss. Domus. Gutschiorum familia celebre conspicitur, horarum duarum itinere, der Bynast.

Balneum lapideum seu Diuinum.

Profilit ex saxo durissimo, excauato, ab ortu meridionali.

Aqua ultra primum gradum calida, adeò vt etiam manui in scaturigine detentæ caloris excessu nonnullam inferat molestiam.

Alueus in saxum excisus longus & latus pedes circiter quinq; angulos ferè æquales habens, qui sensim deorsum ad scaturiginem coangustatur, vt homines bini & quidem incuruati absq; Cutis exulceratione

vix possint immorari, nullo stratus pavimento. Cum repletur, profunditate quinq; cubitus non excedit.

Color aquæ balneum ingredientibus apparet thalassinus illi persimilis, quo Mare, altum æquor nauticantibus tinctum cernitur, accedente summa claritate & perspicuitate. Ex vitro pellucido Sapphirum album colore repræsentat ad cæruleum nonnihil vergens.

Tactu temperatè sunt calidæ, Corpori nostro conuenientes, vinctuosæ nonnihil, Odor sulphureus. Accedentibus enim mox halitu graui foetido sulphureo Nares percellit & insidentibus Caput replet.

Gustata subdulcis est, tantillum adstrictionis & acridinis in lingua relinquens. Ore detenta per foramina palati etiam odorem Cerebro comunicat sulphureum.

Hinc manifestum fit, Aquas has, medicatas maxime sulphuratas esse; quod à prætereuntibus etiam citò apprehenditur. Halitibus verò sulphureis præcipuè abundant, qui longa coctione deperduntur & euanescent. Præterea emolliunt,

discu-

discutiunt, scabiem sanant,
Caput aggrauāt & replent.

Pyritem Aluminis &
Chalcanthi feracem atte-
stantur odor foetidus grauis;
color venetus: sapor in fine
tantillum adstrictionis & a-
crimonix linguae imprin-
dens.

Effectus, quoniam mor-
dicat, abstergit, adstringit,
Ventriculum roborat, vlce-
ra sanat manantia. Addo
vicinos Montes abundare
venis Pyritis Aluminosi &
Chalcanthosi.

Ferrum ex ramentis fer-
rei pyritis in cœno & arena
latentis colligitur. Vicinæ
sunt diuites Ferri fodinæ in
Schmiedeberg. Insuper con-
trahunt, consolidant, Arti-
culis robur addunt.

Bitumen, aquæ superfi-
cies vnctiuosa & læuis con-
firmat. Aggrauat Caput,
calefacit Cerebrum, offen-
dit Oculos & emollit insi-
gniter omnes totius Corpo-
ris partes.

Cinerem tandem vehit,
qui à lauantibus facile con-
spicitur, aquæ innatans.
In fundo seu scaturigine
lapilli, scrupi, Calculi, & gla-
rea tenuissima cum cœno
pingui & vnctiuoso.

Natura & facultates.

Thermarum vires è suis
mineralibus pendent. Sulphuris
ratione calefaciunt, exic-
cant, aperiunt, emolliunt,
extenuant, trahunt à centro
ad superficiem, digerunt,
discutiunt, Caput lædunt.

Ob Bitumen eodem mo-
do sensim calefaciunt, emol-
liunt partes vniuersi Corpo-
ris, etiam tendines scirrho-
sas, Caput aggrauant & fu-
mis opplent, Oculos læ-
dunt.

Propter Chalcanthum &
alumen calefaciunt, abster-
gunt, constringunt, desic-
cant, vlcera purgant, con-
solidant.

Causa ferri siccant, ad-
stringunt, roborant, consoli-
dant, fluxiones reprimunt.

Hinc ob mixturam dicto-
rum facultates Aquarum
thermalium resultant con-
trariæ partim aperientes,
emollientes & resoluentes,
partim constringentes ac
meatus coarctantes.

Calefaciunt ergò tempe-
ratè vel ad primum gra-
dum. Emolliunt, resoluunt,
aperiunt, maturant, abster-
gunt, aluum solvunt, vrinas
pellunt, rarefaciunt, atte-
nuant

nuant per insensilem transpirationem digerunt, tumores Oedematolos & scirrosos discutiunt.

Vsus in Balneis.

IN triplici habentur vsu: ad potum, stillicidium & balneum.

In Balneis, & quidem frequentissime, salutare sunt maximè frigidis & humidis malis vniuersi Corporis, Catarrhis & Destillationibus, Capitis frigidis affectibus, Cephalæ, Hemicrania, Sibilis, Aurium susurro & tinnitui, earumque fluxionibus & doloribus. Purgant enim & corroborant Caput & Cerebrum refrigeratum, Catharrum exiccant, fluxiones absumunt. Dentium dolores, nisi à corrosione sint, auferendo causam tollunt. Saluationi & Gingiuæ affectibus opitulantur. Ventriculo imprimis conducunt, cum eius laxas fibras constringere potenter valeant, eius humidam & frigidam intemperiem sanant, humores p. n. in eo exiccant, absorbent. Cibi fastidium auferunt & appetentiam excitant, concoctionem promouent, dolorem mitigant, vomitiones

pituitosas compescunt.

Obstructiones viscerum tollunt. Intemperiem Intestinorum frigidam corrigunt, flatus interiores crassos resoluunt, discutiunt. Ea propter Colicam morbo ex frigida causa maximè diuexatis magno sunt præsidio.

Renes à saburra & arenulis expurgant, Vreterum obstructions amoliuntur, Calculum atterunt deiciuntq; Lumborum ac Dorsi, etiam Laterum cruciat⁹ resoluunt, gonorrhœam percurant.

In Matricis humidis & frigidis Morbis admodum efficaces. Vterum impurum expurgant, frigidum excalescunt, lubricum & humidum exiccant, roborant, sterilem fecundum reddunt ac conceptioni idoneum. Menses retentos prouocant, nimium fluentes reprimunt, inordinatos corrigunt. Albos foeminarum fluxus futuros promouent, præsentibus discutiunt. Matrici peruersæ, tumenti & induratae conferunt. Contra Vteri strangulationem eiusq; procidentiam & Ani prolapsum proficua. Abortui obnoxijis admodum salubres. Ex morbo longo & diuturno con-

Ecc

uale-

ualescentes ac imbecilles reficiunt, iuuant Quartanarios & Quotidiana diuturna afflictos.

Refrigeratos Nervos & tendines emolliunt, calefaciunt, dolores sedant, frigidosque eorum affectus insigniter iuuant.

Vnde Nervorum & Musculorum doloribus, Articulorum imbecillitati, immobilitati, Arthritidi à frigida fluxione, Chiragræ, Podagræ, Coxendicum dolori intolerabili auxiliantur.

Nervis item frigidis eorumque Resolutionibus, Induratis, contractis, tremulis, distortis tensisque & duris, ut Hemiplexiæ, Tremori, Stupiditati.

Tumores duros & tubercula dissolunt, Oedemata Crurum emolliunt, resolvunt Articulos ex Colica resolutos & immobiles fere brevi restituunt.

Vagos Brachiorum & Crurum dolores die lauffende Gicht / mitigant, tollunt.

Insuper Impetiginem, vitiliginem, Pruritum, scabiem sanant, Cutis maculas abstergunt, aliaque eius vitia emendant. Tandem ulcera humida, rebellia, curatu dif-

ficilia ex affluxu humorum recte curant: siccant, ad cicatricem perducunt.

In his ij tantum lauant, qui non sunt de infima plebe & quidem certis solummodo horis. Neque enim quemlibet Erronem scabie scatentem ulcera sua inferre sinunt. Et insident in alveum illum homines ad summum sex, ob loci angustiam. Si qui supra hunc numerum se ingerunt, ijs standum est toto lavationis tempore, nisi aliquibus egressis succedant.

In Stillicidio.

Per instillationem seu embrocham frigidam & humidam Capitis intemperiem corrigunt, Aurium strepitum, surditatem, Linguae Paralyfin, tremorem Articulorum & alia diuturna ac inveterata mala curant.

Quoniam verò facile Caput afficiunt & lædunt, præstat incoquere herbas exiccantes & roborantes Cerebrum, ut sunt Rosmarinus, Betonica, Salvia, Stachas Arabum, Lauandula, Lilium Conuallium, Nux moschata, Agaricus & similia.

A Stillicidio abstinere suaserim eos, quibus Caput temperamento calidius & humi-

humidius ac Oculi debiles.

In Potu.

Minus sunt utiles & commodæ. Cum quod Ventriculus nauseabundum reddant, Aluum insent, doloremq; & febres retentæ concitent; tum quod malè & sinistrè utantur ijs Aegri, nulla habita ratione præparationis, temporis, mensuræ & aliarum circumstantiarum, quæ ad Potum aquarum medicatarum necessariò requiruntur. Frequenter in sorbitionibus ad ignem concalescatis addito pane & butyro haurire solent; qua ratione vis medica deperditur.

Nec tamen prorsus inutilem & noxium earum potum dixerim, maxime si fiat secundum rationem & Medici præscriptum. Experientia enim edoctus, Multis eximiam contulisse opem in grauiorib. Morbis, ut in Colica, Nephritide, Scabie & Hystericis affectibus.

Nota.

Obfunt Hirsbergenses Thermae calidis & biliosis Naturis, Morbisq; ex simili causa prognatis, febricitantibus, acutis Morbis; Asth-

maticis, phthificis, Tabidis, viscerum inflammationibus, Hydropicis, Maniacis, Melancholicis, Grauidis, Lue venerea infectis, Vlceribus serpentibus, Infantibus, senio confectis & aliis.

Balneum Egenorum.

Das hölzerne Bad.

Therma lignæ publicæ sunt & cuius patent, Pauperi plebeculæ destinata. A lapideis exiguo intervallo distant. Nulla illic ingens structura, sed solum exiguum turgurium, in quo quilibet vestes exuere potest, & inde alueum ingredi.

Puteus longior est, minus profundus, vndequaq; tabulis ligneis cinctus: pavimentum asseribus perforatis stratum, hinc exitus patet aquæ quibusdam bullulis candidis emergenti.

Scaturiunt non ut Lapideæ dictæ, ex saxo, verum ex argilla seu cæno lento pingui copioso arena & glarea permixtis sensim promanant. Dentis tabulis in fundo aqua prorsus turbida redditur.

Minus calidæ sunt quàm Diuitum, quod calor, aliarum frigidarum affluxu, obtunda-

Ecc 2

tunda-

tundatur : sed grauius sulphur redolent. Cætera paria habent præter argillam, quæ in his maximè abundat, subadstringens & Emplastica.

Frigidiores licet aliquantulum, multò tamen efficaciores ab omnibus vno Ore prædicantur. Mediocriter calefaciunt, emolliunt, exiccant validè, abstergunt, roborant, cohibent, sistunt.

Caloris excessu minus offendunt Hepar & Renes. Ex alto trahunt, digerunt, discutunt, & similes ferè cum Lapideis fortiuntur vires.

Exiccant Capitis Catarhos & fluxiones: Achores, Serpiginè *Den Haarwurm*/Morphæam.

Nervos diu induratos & immobiles insigniter extensibiles reddunt.

Artuum dolores pertinaces curant & præcauent: vagos profligant.

Articulorum Contracturæ, Resolutioni, Contusionibus, immobilitati, tremori saluberrimæ.

Menses immodicos, qui nullis medicamentis cohiberi potuerunt, restringunt. Ad vlcera chronica *хроничн*, dysepulota, Vulnere insani-bilia, Scabiem malignam in-

ueteratam, Lepram Græcorum, Psoram, Lentiginem, Pruritus, sunt efficacissimæ. Humores enim vitiosos subcutaneos absumunt, valenter siccant & abstergunt.

Tandem Cachecticis & omnibus alijs quibus totum Corpus vel vna aliqua pars exiccatione indiget, apprimè vtilis.

THERMÆ D. IOHANNIS.

Fons calidus S. Iohannis.

Der Johannis Brunnen.

Ad fines Silesiæ intra Sudetes Meridiem versus sub monte nigro dicto in sylua densissima Aquæ profiliunt medicatæ subtepidæ, limpidissimæ, omnis odoris & saporis expertes, quæ à D. Iohanne cui olim erant dicatæ, nomen acceperunt.

Omni carent metallo præter succum lapideum & calcarium lapidem, quo totus ille Mons vnde promanant, refertus est. Vaporis quidam fuliginosi & exusti, habentes odorem sulphuris, Nares percellunt.

Lapides in his nascuntur porosi & fistulosi subflauis spongiarum instar.

Calefit Aqua lapidibus ignitis in lauacra & solia injectis :

ieftis: & hac ratione balneis idonea redditur. Vnde sunt, qui vim lapidibus potius quam aquæ tribuant.

Potu & balneis salubres.

Frigidis affectibus, defluxionibus, Asthmaticis, Arthriticis medentur. Venter frigidum & laxum firmant. Intestina frigidiora calore reficiunt. Renes arenulis & calculo liberant. Colicæ opitulatur & ex ea paralyfin emendant. Matricis ex frigida causa prognatos affectus expugnant. Tusa, luxata, conuulsa restitunt, Tophos & callos ex pituita collectos emolliunt, resoluunt, dissipant. Podagricis conuenientissimæ.

Boiemi ad has frequenter confugiunt & quidem circa solstitium seu festum D. Iohanni sacrum, ea persuasione ducti, tunc temporis esse saluberrimos.

THERMAE LANDECENSES.

Aquæ medicatæ Landecicæ.

Fons S. Georgij.

Landecker Bad.

S. Georgen Brunnen.

In Comitatu Glocensi ad Landecium opoidulum aliæ existunt Thermae Anno 1501.

renouatæ & restauratæ beneficentia Illustriss. Princip. Alberti, Georgij & Caroli frat. Elect. Imperij Rom. Duces Monsterberg. & Comites Glocenses; Dom. à Constaudio & Poidebrada. Cerussæ cal. Sulphure, Alumine, Sale & are imbutæ, colore subuirides, multis in balneo salutare. Et has, quia multum frigent, ad ignem calefacere necesse est.

Calefaciunt, siccant, extenuant, abstergunt. Nervos roborant frigidos & Articulos resolutos: ob id ijs qui ad Apoplexiam, Hemiplexiam, Paralyfin proclives & dispositi sunt, prophylacticum egregium. Opitulatur Contracturæ, Spasmo, Convulsioni, Podagræ, Chiragræ, alijsq; à frigida causa subortis morbis. Aurium sonitum & susurrum resoluunt, discutiunt.

Oculorum dolores mulcent & visum exacuunt. Pectus excalefaciunt ac Thoracem, Catarrhos exiccant.

Medentur ventris torminibus & Colico dolori.

Præcipuè feminas ex uteri frigidityte steriles solantur. Vasa enim genituræ inservientia, frigore lan-

Ecc 3

guentia

guentia calore reficiunt.

Iecinori, Lienī & reliquorum viscerum oppilationes adaperiunt. Hydropi incipienti & bilis suffusioni commodæ. Renes & vesicam excalefaciunt, appetitum prostratum erigunt, Lumbricos & tineas ventris enecant.

Cutim abstergunt, Scabiem, Impetiginem, Lichenes, maculas desent.

Ulcera inueterata, putrida, manantia purgant, exiccant & ad cicatricem perducunt.

In summa ad omnes frigidiores, tam internos quàm exteriores affectus apprimè conueniunt.

Topazius.

Topázios.

Ein Topas / Topazier.

Gemma est, cuius fulgor in Auri colorem exit.

Passim in montibus ad lacum maiorem, in agris etiam ad Schildauium, alijsque multis locis.

Valet aduersus sanguinis eruptiones, contra phrenesin & tristitiam, collo suspensus & tritus diligenter, medicinis ad eisdem affectus præscriptis permixtus.

Turchesia.

Idem turcica.

Turchoïdes.

Ein Türckis.

Gemma est Aëri & cœlo matutino Autumnali similis, hoc est, viridis siue cœrulea lacteq; suffusa, non perspicua neq; subtilis, sed saturata.

Alia in cœruleo albicat, alia dimidia sui parte viridis, alia sereno cœlo cœrulea.

Reperitur ad Strigomum urbem, in prato Iseræ, & alijs montium riuulis lauatur.

Cor & Oculos recreat. Ferunt, si annulo gestetur, Hominis cadentis ictum excipere, & seruato homine dirumpi.

Veneficijs aduersari Gemmarij prædicant.

Vasa fictilia.

Ollæ, urnæ fossiles.

ErdTöpffe / Gewachsfene Töpffe.

Zwerg Töpffe.

Horum collum plerumque est angustum, venter tumidus. Quædã ansas habent singulares, alia binas, partim ternas. Nonnulla operculis tectæ; alia non item. Quædam cinerei sunt coloris; alia flaua

flava sunt aut rubent. In summa, quantitate & forma multum differunt.

Plerisque locis ad Gubernam, Sorauium, Sommerfelt & alibi effodiuntur, propè madida, mollia & terrena; mox paululum in Aërem sublata & detenta indurescunt & subduriore redduntur.

Vulgus in terra natas opinatur. Multi Nanos his ipsis usos credunt. Eruditi coniectantur istic olim sepulturas Gentium fuisse; qui cum venis carerent, ollas interrim cum cinere, igne, fauilla & reliquis instrumentis, ex rogo relictis in signum pietatis collegerunt condentes tumulo, mediaq; inhumarunt arena.

Vitrum.

Talos.

Glas.

Opus est artis pyrotechnicæ, quale naturæ, Gemmæ: vnicum fragilitatis humanæ exemplum.

Materia translucida, quæ coquitur ex succis quibusdam concretis, & sabulo, arena, sale, vi ignis & arte subtili exprimitur.

In Schreiberau, supra Zaccum fluuium. Probantur vitra maximè quæ candida & pellucida sunt.

Pulvis Mures enecat, & Emplastris aduersus vlcera serpiginosa miscetur.

Vitri fel.

Aphrouitrum.

Vitri spuma, recrementum.

Glas Galle/ Glas Schaum.

Cum Vitri materia igni liquescit, agit spumas, quæ de ea verriculo, tanquam recrementum de Argento detrahuntur, mox verò concretæ in panes candidos coguntur.


Sapor huic mixtus, magis tamen amarus, quàm salsus.

Aurifices ad Argenti scobem, cum ex ea massam conflare volunt, addunt, vt citius igni liqueat.

FINIS LIBRI TERTII.

Soli Deo gloria.

INDEX



I N D E X

M O R B O R V M R E

M E D I A, E T A L I A I N H O C

O P E R E N O T A T V D I G N A

C O N T I N E N S.

A.

A Bortus, 31.140.208.401	Aluum laxantia 12.23.26.29.
Achores capitis puerorū 335	55.72.75.118.123.127.
Aegyplos remedium presentancum	131.136.181.188.212.
197	218.221.227.237.242.
Aëris contagia 14.19.22.102.	251.256.261.262.269.
114.205.231.390.397	273.281.288.289.299.
Aestus febrium 23.49.187.194.	303.307.309.310.321.
212.213	323.326.348.366.373.
Alarum graueolentia 236	374.380
Albus feminarum fluxus nimius	Ambusta 82.100.105.119.160.
116.126.135.137.140.	165.188.194.195.206.
173.182.210.228.231.	212.213.215.239.241.
247.307.398	248.293.309.344.347.
Alopecias sanantia 223.313.376	356.384.396
Alui fluxiones sistentia 10.31.46.	Amuletum insigne aduersus Epi-
51.57.83.87.90.104.108.	lepsiā 220
112.113.115.118.132.140.	Anasarca 80
145.151.156.157.160.	Angina 66.80.87.131.218.
163.167.169.173.174.	219.282.301.397
182.185.188.189.194.	Angustia pectoris ex percussa sca-
210.213.217.226.230.	bie 158
231.238.255.264.281.	Ani procidentia 105.161.
291.301.307.308.316.	215.264
317.327.347.362.379.	Annona caritatem premonstrantia
396.398	35.210
Aluum purgantia 45.142.279.	Anodyna 47.58.215.230.
290.298.311	275.281.284.302.402
	Fff
	Apo-

I N D E X.

- Apoplexia* 45. 49. 123. 168.
206. 252. 405
- Appetentiam cibi excitantia* 7. 82.
134. 181. 188. 240. 241.
247. 249. 257. 265. 304.
320. 330. 337. 347. 358.
391
- Apum & Vesparum ictus* 36. 131.
136. 147. 239. 301
- ab Apum ictu manus praeferuare*
305
- Aquas purgantia* 63. 82. 136.
198. 206. 251. 269. 285.
307. 321. 332
- Araneorum ictus* 66. 305. 357
- Arteria exasperata* 238. 257.
277. 300. 322
- Articulorum vitij vtilia* 49. 120.
139. 168. 181. 196. 308.
335. 402
- Articulos roborantia* 139. 379.
400. 402
- Arthriticis conuenientia* 11. 24.
49. 86. 119. 120. 168. 173.
275. 402. 405
- Ascarides puerorum pellentia* 190
- Asthmaticis vtilia* 5. 14. 19. 23.
47. 48. 62. 83. 102. 111.
119. 135. 137. 160. 164.
199. 209. 219. 221. 223.
242. 255. 284. 299. 314.
330. 335. 339
- Auicula cibum fastidientes* 15
- Auicularum cibus* 36. 46. 90.
159. 189. 248. 331
- Aures purulenta* 119. 321. 379.
- vermiculosa* 45. 248. 321.
- Aurium dolores* 24. 45. 51.
160. 199. tinnitus 101. 401.
405
- Aureus dens innatus in homine*
368.

B.

- Bilem flauam purgantia* 12. 33.
44. 45. 47. 72. 75. 76.
103. 133. 136. 188. 205.
206. 208. 218. 226. 258.
279. 289. 290. 298. 307.
310. 332
- Bilem atram purgantia* 48. 103.
125. 164. 284. 299. 342
- Bilis feruorem comprimentia* 261.
326
- Bubo pestilens* 35. 81. 139.

C.

- Cachexia* 7. 47. 48. 75. 77. 226.
247. 260. 315. 379. 391.
401. 404
- Calculus* 5. 10. 11. 18. 21. 22.
25. 27. 28. 29. 30. 42. 44.
45. 47. 48. 52. 55. 65. 67.
68. 71. 75. 76. 79. 83. 90.
100. 101. 105. 109. 114.
119. 122. 124. 125. 131.
136. 142. 143. 146. 147.
151. 157. 158. 161. 163.
164. 167. 168. 173. 184.
191. 206. 213. 221. 230.
232. 242. 245. 249. 250.
257. 260. 263. 270. 275.
296. 301. 308. 313. 315.
322. 330. 334. 339. 369.
373. 382. 361. 404

à Cal-

I N D E X.

<i>a</i> Calculo praeservantis 373. 382	Carnes ut vindicentur a vermi- bus 154
Calli & topi ex pituita collecti 405	Casus ne ingenerentur vermes 30
Calvaria fracta 29	Catharrus 401. 404. 405
Cancer 82. 250. 275. eius ardor 28	Cerebri vulnera 396
Canis rabidi morsus 22. 25. 28. 51. 58. 133. 184. 203. 227. 256. 276. 299. 305. 341. 360	Cerebrum mundantia 33. 56. 282. 298. 340. Obstructum aperientia 305. roborantia 23. 196. 252. 258. 261. 300. 307. 336. 347. 365
Capillos tingentia 28. 35. 40. 68. 117. 123. 130. 164. 166. 188. 201. 216. 246	Cerevisia ne acescat 150
Capiti dolorem inferentia 72. 112. 113. 125. 255. 256. 265. 308. 312. 313	Chiragra 402. 405
Capitis dolores sedantia 35. 46. 69. 120. 121. 136. 153. 182. 194. 195. 196. 215. 216. 218. 231. 242. 252. 266. 331. 336. 398. Ca- lidos 161. 197. 212. 288. Frigidos 170. 299. 334. 338	Cholera morbus 182. 208. 240. 241. 280. 304. 378
Capitis scabies contagiosa der Erbgrind 207. 388. ma- ligna 81. 188. vulnera 24. 321. Ulcera manantia 45. furfures 68. 117. achores, serpigo 404	Cicatricem inducentia 24. 45. 72. 119. 204. 293. 362. 365. 383. 388. 393
Caput purgantia 17. 33. 35. 190. 241. 269. 284. 298. 299. 300. 310. roborantia 226	Cimices necantia 72. 287
Capillorum defluuium 123	Cocta & preparata in vasis aneis natura incommoda 360
Carbones pestilenciales 35. 159. 192. 202. 299	Cœliacis vitia 41. 132. 146. 159. 167. 240. 263. 264. 305. 306. 327. 347. 378
Cardiaca 37. 290	Colica 12. 40. 65. 67. 92. 103. 134. 152. 153. 159. 217. 225. 227. 244. 258. 269. 284. 291. 296. 313. 376. 401. 403. 405
	Color fuscus in Sole contractus 167
	Color sœdus virginum 47. 247
	Columella seu vna prolapsa 156. 167. 282
	Contractura articularum 404. 405
	Convulsio 38. 61. 86. 113. 122. 123. 132. 170. 195. 223. Efff 2 253.

I N D E X.

235. 239. 245. 246. 252.	104. 118. 126. 129. 130.
255. 290. 293. 405	132. 138. 140. 145. 146.
<i>Cordis amica</i> 8. 21. 24. 34. 37.	156. 157. 159. 160. 163.
41. 91. 102. 104. 123. 186.	167. 169. 173. 174. 182.
190. 226. 242. 245. 247.	184. 188. 189. 190. 193.
252. 261. 265. 305. 307.	194. 202. 208. 213. 217.
314. 325. 332. 333. 347.	237. 240. 263. 264. 280.
365. 380. 396. 406	289. 290. 296. 301. 305.
<i>Cordis palpitation</i> 37. 123. 252.	316. 317. 327. 347. 362.
333. 365. 296	363. 370. 378. 380. 384.
<i>Coxendicum dolor</i> 402	396. 398
<i>Cruditates curans remedium</i> 281	<i>Dysenteria alba, das weisse</i>
<i>Culices necantia</i> 55	<i>wehe vulgo</i> 384.
<i>Cutum abstergentia</i> 273. 406.	E.
<i>erugantia</i> 33	<i>Effascinationes amolientia</i> 11. 20.
<i>Cynanche</i> 266.	25. 126. 155. 164. 204. 227.
D.	232. 297. 311
<i>Deliquium animi</i> 123. 170.	<i>Enterocela</i> 41. 64. 104. 157. 190.
252. 314	196. 202. <i>puerorū</i> 121. 126.
<i>Dens aureus innatus in homine</i>	<i>Epilepsia</i> 30. 33. 42. 49. 84. 128.
368	160. 206. 220. 233. 271.
<i>Dentes mobiles firmantia</i> 15. 74.	282. 297. 300. 316. 338.
167. 173. 185. 240. 304	341. 363. 366. 384. 396
<i>Dentium dolores</i> 21. 31. 49. 109.	<i>Epilepsia amuletum insigne</i> 220
119. 137. 145. 159. 160.	<i>Epilepticos excitantia</i> 183. 205.
170. 173. 193. 208. 250.	335
271. 286. 313. 328. 331.	<i>Erysipelata</i> 12. 34. 67. 85. 100.
401. <i>vermes</i> 163	134. 194. 215. 321. 325
<i>Distillationes</i> 74. 145. 226.	<i>Euaporationes sursum tendentes si-</i>
248. 282. 317. 318. 327.	<i>stentia</i> 56. 264.
308. 312. 401	F.
<i>Dolor vagus brachiorum & crurū,</i>	<i>Faciei maculae, lentigines</i> 30. 33.
<i>die lauffende Gicht</i> 402	39. 62. 74. 119. 124. 136.
<i>Duros abscessus maturatia</i> 17. 293	162. 167. 220. 226. 284.
<i>Dysenteria</i> 10. 12. 22. 28. 31. 34.	291. 297. 312. 321. 323.
40. 41. 53. 56. 64. 74. 86. 87.	<i>Vari</i> 74. 125
	<i>Fauci-</i>

<i>Fauciū inflammatio</i> 21.77.110.	140.173.182.210. 228.
129. 169. 173. 197. 219.	231.247.307.398
270.301.313. <i>ardor in fe-</i>	<i>Fractura</i> 30.86.168.202.321.
<i>bribus</i> 29. <i>ulcera</i> 170.282	383.384.387.393
<i>Fatigatos iuuantia</i> 15.30	<i>Fungorum venena</i> 330.347
<i>Febrilem ardorem mitigantia</i> 23.	<i>Furfures capitis</i> 68.117.
49.182.187.194.212.213	G.
<i>Febres tertiana</i> 6.44.45.104.	<i>Gallinarum pituita</i> 293
130.199.249. <i>notha</i> 39.	<i>Gangrena</i> 116
<i>erratica</i> 99. <i>putrida</i> 20.84	<i>Genituram argentia</i> 270.272.
<i>Febres maligna</i> 51.193.217.	316.320
330. <i>Pestilentes</i> 7.8.14.31.	<i>Gingiuā sanguinolenta</i> 160
58.113.121.155.156.	<i>Gingiuas roborantia</i> 74.167.
192.193.231.247.258.	304.401
261.276. <i>ardentes</i> 49.50	<i>Gingiuarum putrida ulcera</i> 144.
194.289	210
<i>Febris Quartana</i> 44.69.103.	<i>Gonorrhæa</i> 5.115.119.137.
120.125.164.225.249.	146.288.387.401
299.357.402. <i>eius amule-</i>	<i>Grando porcorum</i> 63.121.
<i>tum</i> 39	H.
<i>Februm rigores</i> 299.231	<i>Halitum oris emendantia</i> 19.231.
<i>Febricitantibus vitia</i> 60.74.83.	261.286.299.365
127.143.193.257.265.	<i>Hamodia dentium</i> 326
280.285.303.	<i>Hæmorrhagia narium</i> 31.64.
<i>Febricitantiū suis</i> 234.331.376	129.163.166.204.366.
<i>Fistula</i> 137.160.172.190.	370.372.392
236.277.363	<i>Hæmorrhoides nimium fluentes</i> 81.
<i>Flatus disquietentia</i> 40.41.56.71.	202.363.372.379
92.105.113.135.158.	<i>Hæmorrhoides aperientia</i> 178.
203.221.227.230.231.	255.274.286. <i>sanantia</i>
232.234.248.272.275.	146.193.216
299.306.308.312.337	<i>Hæmorrhoidum dolor</i> 58.77.81.
<i>Fluxiones fistentia</i> 58.61.117.	196.216.239
170.225. <i>biliosas</i> 189. <i>è ca-</i>	<i>Hælicis vitia</i> 15.147.148
<i>pite</i> 226.248.282.308.312	<i>Hemiplexia</i> 402.405
<i>Fluxus albus mulierum nimius</i> 26.	<i>Hepatis remedia</i> 24.29.59.
64.65.116.126.135.137.	<i>Fff</i> 3 142

I N D E X.

142. 190. 192. 199. 217.
 225. 291. 299. Obstructio
 8. 21. 23. 40. 41. 45. 47.
 49. 50. 60. 67. 68. 69. 72.
 75. 82. 85. 99. 105. 113.
 116. 123. 125. 133. 135.
 142. 143. 150. 152. 157. 158.
 160. 164. 193. 195. 197. 199.
 201. 229. 232. 237. 241.
 243. 247. 249. 250. 260.
 266. 275. 285. 297. 308.
 316. 334. Inflammatio 51.
 60. 68. 74. 104. 197. 218.
 282. 289.
 Hepar refrigerantia 7. 8. 104. 146.
 roborantia 6. 7. 50. 21. 104.
 226. 332
 Hernias sanantia 13. 24. 25. 61.
 82. 105. 110. 115. 157. 160.
 162. 172. 204. 321
 Hilaritatem excitantia 33. 242.
 265. 305. 348. 380
 Humores viscosi intestinis inhaeren-
 tes 210
 Hydrops 6. 7. 10. 12. 23. 24. 48.
 49. 63. 75. 76. 80. 82. 120.
 123. 143. 153. 158. 160. 170.
 188. 197. 206. 212. 232. 233.
 250. 259. 262. 285. 299.
 324. 335. 339. 341. 391. 394
 Hydropicorum sitis 231.
 F.
 Icterus 20. 21. 29. 30. 34. 38.
 44. 45. 48. 49. 51. 56. 60.
 65. 70. 75. 77. 83. 85.
 101. 105. 118. 122. 123.
 125. 133. 135. 142. 150.
 157. 158. 163. 164. 170.
 174. 197. 201. 212. 217.
 224. 232. 233. 237. 245.
 246. 247. 248. 250. 258.
 259. 260. 268. 275. 278.
 286. 289. 290. 291. 316.
 324. 334. 341
 Infantes calculosi 382. convulsi
 61. 150. 219. 250. 276. E-
 pileptici 60. 67. 139. 219.
 276. 363. Herniosi 105.
 239. 371. Scabiosi 152
 Infantum Ascarides 190. capi-
 ra papulosa & exulcerata 100.
 Enterocela 121. 126. Liche-
 nes 257. Syriasis 267. tineae
 203. tormina 36. 55. 203.
 tussis 272. 331. vermes 31.
 urina retenta 124
 Inflammationes reslinguentia 15.
 54. 60. 71. 104. 109. 121.
 134. 141. 156. 160. 161.
 211. 215. 218. 281. 284.
 293. 301.
 Inflammationes vulnerum pro-
 hibentia 126. 138. 239.
 276
 Ignis sacer 34. 58. 82. 152.
 174. 195. 197. 243. 295.
 301. 325. 379
 Igni ambusta 82. 100. 105. 119.
 160. 165. 188. 194. 195.
 206. 212. 213. 215. 239.
 241. 248. 293. 309. 344.
 347. 384. 396
 Inguinum tumores 25. 115
 Ischias 30. 99. 120. 145. 223. 301
 Infor-

- Insomnia grauia* 164
Internas suppurationes rumpentia 205
Intertrigo 119. 384. *iumento-*
rum 167
Intestinorum exulcerationes 61.
 189. 199. *rosiones* 210.
 L.
Labiorum rima 72
Lac augmentia 150. 161. 198.
 260. 267. 275. 312. *enu-*
cantia 230. 231. 288. *coa-*
gulantia 82
Laterum dolores 38. 47. 121.
 133. 152. 153. 169. 191.
 215. 225. 235. 295. 319.
 401. *inflammatio* 218
Lepra Gracorum 404
Leibargicis auxiliantia 300
Leucophlegmatia 160. 226
Lichenes 125. 220. 321. 322.
 361. 394. 406
Lienis obstructio 21. 23. 40.
 45. 46. 47. 67. 69. 74. 75.
 82. 85. 99. 125. 133. 150.
 152. 158. 164. 195. 198.
 229. 232. 237. 243. 247.
 249. 258. 260. 275. 297.
 308. 334. 406. *Scirrhus*
 23. 101. 265. 383
Lienem absumentia 198. 310. 323
Lienosi 72. 143. 146. 156. 164.
 198. 217. 225. 236. 238.
 241. 244. 249. 278. 299.
 346. 378. 379
Lienteria 47. 396
Lingua fissura in febris 326.
paralysis 402
Liures & sugillata 33. 116.
 134. 155. 297. 300. 313
Loquela deperdita 45. 170
Lues venerea 12. 51. 76. 127.
 163. 203. 250
Lumborum dolores 23. 250. 408
Lumbrici & tinea ventris 6. 40.
 45. 72. 77. 84. 85. 99. 127.
 145. 155. 191. 193. 202.
 203. 224. 226. 227. 234.
 240. 249. 261. 272. 276.
 297. 306. 310. 312. 313.
 341. 406
Luxata 23. 27. 28. 68. 82. 160.
 164. 168. 300. 405
 M.
Malacia grauidarum 261
Mamma dura 49. 67. 89. *Inflam-*
mata 67. 85. 239. 265. 313.
 316. 347. *à partu turgentes*
 24. 51. *earum tumores* 157.
 347. 366
Mammillos, ne increcant, probi-
bentia 51. 159. 376
Mammis lac extinguentia 51
Manus dealbandi 20
Marisca, ficus 50. 51
Marrubij aquatici color pertinax
 133
Melancholici 45. 48. 54. 77. 103.
 134. 164. 303. 305. 314.
 365. 366. 375. 391
Melancholiam purgantia 54. 103.
 136. 279. 366
 Memo-

I N D E X.

Memoriam roborantia 23. 336.

Menses trahentia 14. 21. 22. 23.

32. 35. 40. 44. 45. 46. 47. 51.

52. 54. 55. 56. 67. 68. 84. 85.

101. 109. 113. 114. 120. 122.

123. 127. 133. 137. 158. 166.

183. 193. 195. 197. 201. 203.

225. 230. 232. 234. 235.

237. 246. 247. 249. 258.

260. 269. 270. 275. 276.

278. 282. 289. 290. 291.

292. 299. 308. 310. 312. 314.

316. 319. 330. 335. 336. 343.

345. 401. Sistentia 10. 31. 34.

41. 53. 73. 74. 83. 87. 112.

129. 130. 137. 140. 146. 151.

153. 163. 167. 173. 189. 194.

201. 208. 228. 240. 168. 290.

301. 379. 380. 401. 404.

Mesenterij obstructiones referantia

7. 82. 391

Morbillos & variolas prouocantia

22. 245. 276. 296. 309.

331

Morsus bufonis 35. serpentum

268. 276. 305. 319

Mulierum sterilitas 186. 275

Mures necantia 40. 203. 213.

287. 370. 407. maiores fu-

gandi 107

Muscas perimentia 81. 103.

129. 130.

N.

Narium hemorrhagia 31. 64. 129.

163. 166. 204. 366. 370.

372. 392. Fistula & vlce-

ra 22. 100. Polypus 164.

Nausea 134. 182. 264. 268.

275. 304. 347

Nephritici 92. 134. 250. 296.

313. 315. 373. 403

Neruis conuenientia 45. 49. 71.

168

Nerui contracti 133. luxati 68.

Obstructi 139. 340. resoluti

212. 284. 336. 402. stupidi

128. 170. 290. 299.

O.

Obstructiones viscerum aperien-

tia 10. 33. 39. 41. 46. 47. 50.

66. 75. 82. 89. 90. 92. 198.

226. 233. 249. 250. 275.

286. 321. 401

Oculis amica 47. 49. 70. 76.

105. 140. 216

Oculorum albugines, cicatrices

30. 39. 74. 105. 132. ca-

ligines 225. argemone, nube-

cula 152. inflammatio 36.

58. 91. 123. 194. 195. 197.

263. 267. 284. 312. 396.

lacryma 274. lippitudines

160. 194. 396. prurigo 275.

rubedo 39. 121. Suffusiones

376. vlcera 393

Ophthalmia 65. 128

Oris halitum emendantia 19. 231.

261. 286. 299. 365

Oris vlcera 8. 29. 30. 85. 167.

169. 181. 209. 210. 215. 233.

293. 304. 377

Orthopnoici 102. 198. 212. 305.

Palpe-

I N D E X.

P.	
Palpebrarum pilos augendi	366
Palpebrarum phlegmone	121
Panaritium sanantia, vulgò den Wurm	143
Papillæ exulcerata	117
Papillarum fissura in puerperis	293
Paralysis	33
Paraphrenitis	49
Partum facilitantia	38. 51. 123. 131. 133. 282. 323. 363. accelerantia 293. 362
Partus & secundas trahentia	22. 23. 32. 35. 47. 54. 134. 170. 190. 201. 232. 260. 310. 335. 343
Pecorum morbi	122. scabies 121. tusis 292. vermes 107
Pectoris affectus	19. 21. 22. 24. 29. 33. 38. 54. 62. 84. 85. 101. 102. 111. 113. 119. 131. 133. 137. 140. 150. 155. 158. 164. 191. 192. 201. 209. 216. 217. 225. 227. 229. 230. 237. 242. 284. 295. 299. 301. 312. 348
Pectoris vomicae rumpendi	212
Pediculos & lendes necantia	40. 54. 68. 103. 205. 279. 287. 312
Podum tumores discutientia	12. 27. 120. 198. 206. 379
Pernionum unguentum utilis.	269
Pestis	17. 22. 24. 31. 40. 49. 62. 84. 101. 103. 114. 127. 137. 138. 171. 196. 201. 203. 208. 216. 231. 249. 252. 259. 261. 265. 271. 279. 313. 345. 381. 384. 388. 394. 396.
Phrenesis	439
Phthiriasis	287. 293
Phthisis, tabes	26. 29. 47. 49. 79. 119. 131. 140. 147. 148. 160. 171. 183. 209. 217. 229. 249. 301. 316. 322. 345. 391. 394. 397
Pilorum in supercilijs defluuium	119.
Pituitam purgantia	48. 56. 63. 103. 119. 120. 128. 133. 136. 164. 181. 188. 206. 212. 251. 258. 269. 279. 284. 285. 290. 311. 342.
Pituita impetum in articulos a- uertendi	181
Plagas sanandi	116
Pleuritis	58. 60. 135. 151. 152. 221. 238. 249. 250. 296. 303. 336
Podagra	13. 20. 26. 27. 65. 80. 109. 118. 119. 165. 339. 402. 405. Calida 12. 141. 160. 194. 267. 347. 348.
Polypus narium	164
Porriginis	301
Prurigo	150. 287. 315. 362. 394. 402. 404.
Psilochra	73
Radendorum vlcera	85. 150. 167.
Puerperarum à partu dolores	242
Ggg	Puerpe-

I N D E X.

Puerperas purgantia 22. 133.
135. 198. 375. 292. 316.
324.

Pulices necantia 15. 56. 154.
312.

Pulmones exulcerati 169. 171.
275. *inflammati* 219. 266.
335. *obstructi* 195. 284.
308. 310. *vas in pulmone vel*
pectore fractum 228.

Pulmonia 103. *pecorum* 279

Pus è pectore extrahentia 191.
193.

Pus promouentia 157. 338

Pustula nigricantes 10. *urentes*
60. 104

Q.

Quartana febris 44. 69. 103.
120. 125. 164. 225. 249.
299. 357. 375. 402. *eius a-*
muletum 39.

Quotidiana febris diuturna 402.

R.

Rauedo 111.

Redunia 33

Renum calculus 33. 90. 105. 125.
141. 157. 161. 168. 197.
244. 266. 286. 308. *arenula*
41. 113. 122. 144. 219.
330. 401. 405. *Obstructio-*
nes 90. 122. 152. 157. 191.
197. 229. 260. 316. 391.
Ulsera. 119. 160. 172

202. *remedia* 51. 74. 82.
104. 119. 152. 190. 192.
199. 258. 277. 291. 339.

Rima inter digitos manuum &
pedum 164.

Ructus acidus sedandi 56

Rupti, ab alto deuoluti 30. 40.
41. 61. 64. 84. 86. 110.
113. 122. 132. 133. 195.
196. 199. 206. 208. 215.
228. 235. 245. 246. 255.
293. 301. 310. 311. 321.
384.

Ruptura 84. 162. 202. 228.
239.

S.

Sal Absinthij 6. *Artemisia* 22.

Salinam prouocantia 54. 67.
137. 171. 299. 311. 328.
338. 380.

Salinationem prohibentia 56.
401.

Salios & adustos humores trahen-
tia 76. 188. 212. 285. 289

Sanguinem purgantia 6. 44. 76.
77. 127. 250. 334.

Sanguinem sistentia 10. 12. 26.
30. 31. 34. 51. 53. 82.

86. 87. 90. 104. 173.
175. 188. 189. 220. 289.

307. 333. 347. 372. 380.
381. 396. *vulneribus cohi-*
bentia 80.

Sanguinis grumos discutientia 31.
167. 168. 169. 202. 253.

299. 310. *à corde repellen-*
tia

419 I N D E X.

<i>tia</i>	125	218. 240. 241. 257. 261.
<i>Sanguinis sputum</i>	28. 29. 34.	265. 288. 327. 331. 358.
	38. 41. 49. 53. 58. 64. 110.	391
	130. 140. 152. 161. 171.	<i>Spasmus flatulentus in pregnantibus</i>
	185. 190. 202. 226. 228.	206.
	238. 240. 255. 301. 322.	<i>Somnum conciliantia</i>
	384. 397	60. 105.
<i>Scabies</i>	30. 75. 76. 117. 119.	112. 131. 152. 186. 187.
	120. 127. 133. 150. 178.	218. 229. 230. 248. 285.
	188. 190. 193. 217. 219.	288. 318. 322.
	287. 289. 292. 295. 297.	<i>Sternutamenta scientia</i>
	311. 361. 362. 394. 397.	35. 56.
	400. 402. 404. 406.	62. 69. 102. 178. 190. 282.
<i>Scabies contagiosa capitis, Der</i>		298.
<i>Erbgrind/</i>	207. 388	<i>Stomachi ardor</i>
<i>Scirrhus iecoris</i>	23. 45. 126. 157.	347
	300. Lienis 101. 265. 383	<i>Stomachici</i>
<i>Scorbutum sanantia</i>	18. 31. 64.	38. 62. 276. 341
	100. 144. 145. 262. 310.	<i>Stranguria</i>
	328.	54. 55. 56. 67. 71.
<i>Scorpionum ictus</i>	357	105. 122. 124. 141. 153.
<i>Scrofula porcorum</i>	63.	158. 173. 191. 193. 199.
<i>Secundae trahentia</i>	22. 55.	223. 225. 237. 238. 256.
	225. 230. 235. 282. 290.	275. 278. 290. 296. 301.
<i>Sedis inflammatio</i>	316.	382.
<i>Semen Scarlea oculis immissum</i>		<i>Struma</i>
<i>eos purgat</i>	282	24. 25. 28. 29. 50. 82.
<i>Senes impotentes</i>	67. 147	84. 116. 125. 128. 164.
<i>Serpentes abigentia</i>	14. 55. 69.	184. 208. 269. 297. 301.
	72. 75. 114. 129. 130.	321.
	145.	<i>Sudorem mouentia</i>
<i>Serpentum morsus</i>	268. 276.	6. 12. 22.
	305. 319.	40. 48. 65. 77. 83. 110.
<i>Singultus</i>	230. 235. 264.	122. 124. 158. 195. 198.
	297	203. 208. 232. 249. 292.
<i>Sitio</i>	8. 74. 186. 194. 213.	310. 312. 394. 397.
		<i>Sudores immodici & venenati</i>
		76.
		<i>Suggillata</i>
		33. 116. 134. 154. 297.
		300. 313.
		<i>Suppurata rumpendi</i>
		117.
		<i>Syncopa</i>
		123. 168
		T.
		<i>Tela, cuspides, furculos ex-</i>
		Ggg 2 trahen-

I N D E X.

erabentia 12. 23. 125. 151.	Venas resperantia 60. 285.
235. 240. 277. 287.	Venena fungorum 330. 347.
Tenesmus 22. 215.	Venenatorum morsus 10. 22. 24.
Testium tumores à flatu, aut frigiditate 215. vulnera 396	26. 30. 63. 84. 109. 122.
Tinea & Lumbrici ventris 6. 40.	127. 135. 166. 171. 201.
45. 72. 77. 84. 85. 99. 127.	249. 252. 264. 276. 299.
145. 155. 191. 193. 202.	311. 337. 343. 373. 396.
203. 224. 226. 227. 234.	Venenis aduersantia 14. 15. 18.
240. 249. 261. 272. 276.	19. 22. 24. 30. 31. 38. 40.
297. 306. 310. 312. 313.	41. 46. 54. 58. 59. 62. 75.
341.	83. 84. 102. 109. 111. 120.
Tonsillæ inflammata 66. 77. 110.	122. 123. 127. 131. 133.
210. 219. 274.	158. 162. 163. 171. 193.
Tormina 21. 24. 30. 40. 47.	196. 201. 223. 226. 227.
55. 62. 71. 86. 98. 113. 123.	230. 231. 234. 235. 246.
136. 158. 165. 183. 195.	247. 249. 250. 252. 260.
203. 206. 230. 239. 244.	261. 265. 292. 299. 308.
249. 268. 281. 299. 308.	309. 313. 319. 334. 335.
317. 335. 405.	336. 342. 357. 366. 384.
Tremor 168. 290. 301. 402	391. 394. 396.
Tumores 15. 24. 47. 116. 123.	Venerem stimulantia 76. 147.
124. 128. 154. 157. 269.	148. 231. 236. 255. 260.
270. 281. 287. 312. 401.	270. 272. 281. 282. 319.
Tussis 10. 19. 22. 23. 24. 38.	320. 337. inhibentia 105. 248.
54. 60. 102. 113. 119. 152.	285. 346. 386.
164. 189. 191. 212. 221.	Veneris à dyuricis corrigentia 21.
227. 230. 238. 255. 257.	67. 147.
275. 277. 284. 286. 295.	Ventriculo auxiliantia 6. 7. 40.
310. 314. 330. 335. 336.	56. 60. 136. 140. 153. 181.
341. 394.	226. 234. 252. 258. 265.
Tympanites 227	285. 307. 320. astuanti 7.
V.	182. 197. 199. 213. 257.
Vari faciei 74. 125.	288. 304. 331. 347. bilioso
Varicellæ & morbillos prouocantia	74. 249. Frigido 102. 247.
22. 245. 276. 296. 309. 331	291. 292. 308.
	Ventriculum roborantia 6. 7. 261.
	264.

I N D E X.

264. 275. 290. 303. 305.	150. 155. 197. 402. gallica
308. 332. 378. 379. 382.	12. 250. 375. 398. maligna
301. 400. 491.	12. 107. 361. 406. Serpigi-
<i>Vermes vlcerum interimendi</i> 26.	nosa, der Wurm/ 116. 197.
<i>Vermes puerorum</i> 31. 90	thoracis 305.
<i>Verruca</i> 207. 341.	<i>Vngues scabrosi</i> 118. 178. 394.
<i>Vertigo</i> 33. 48. 49. 122. 123. 153.	<i>Vocis intercepta certiss. remedium</i>
206. 252. 268. 290. 334.	244
337. 376.	<i>Vomitum scientia</i> 23. 27. 75. 82.
<i>Vesica vitia</i> 52. 74. 104. 119.	103. 120. 142. 188. 189. 229.
146. 158. 192. 229. 237.	237. 262. 276. 290. 332.
258. 277. 291. 391. vlcera	366. 373. 374. reprimentia
131. 159. 266. 192. scabies	54. 136. 140. 234. 182. 213.
256	226. 230. 276. 306. 379
<i>Vesicas excitantia</i> 179. 183	<i>Vrina cruenta</i> 161
<i>Vestimenta à blattis & tineis vin-</i>	<i>Vrine acrimonia</i> 267. 339. ardor
<i>dicantia</i> 120. 121. 201. 242.	388. incontinentia 378
296	<i>Vrinas scientia</i> 10. 11. 14. 18. 21.
<i>Vinum Euphragiatum</i> 70	23. 27. 29. 33. 35. 40. 41.
<i>Vinum pendulum vt restituatur</i>	46. 47. 49. 52. 60. 67. 68.
141. 170	71. 74. 76. 77. 79. 90. 101.
<i>Vino odorem & saporem aroma-</i>	105. 109. 112. 119. 122.
<i>ticum conciliandi</i> 189	123. 124. 126. 127. 136.
<i>Virginum color sedus</i> 47. 247	137. 144. 146. 158. 163.
<i>Virgula diuina</i> 57	164. 170. 173. 181. 192.
<i>Visum acuentia</i> 21. 39. 170. 188.	193. 195. 198. 203. 225.
215. 216. 275. 337. 345.	229. 230. 232. 236. 237.
381	246. 247. 250. 255. 259.
<i>Vlcera vetera & recentia sanans</i>	260. 270. 272. 275. 278.
<i>remedium</i> 293	281. 291. 292. 296. 299.
<i>Vlcera oris</i> 8. 29. 30. 85. 167.	308. 312. 314. 319. 320.
169. 181. 209. 210. 215.	322. 330. 334. 335. 336.
233. 293. 304. 377	342. 345.
<i>Vlcera cancrofa</i> 82. 193. 388.	<i>Vteri affectus</i> 22. 29. 47. 101.
<i>capitis manantia</i> 45. <i>capitis</i>	134. 135. 152. 158. 284.
<i>puerorum</i> 133. <i>caua</i> 157. <i>fau-</i>	290. 291. 308. 310. 336.
<i>cium</i> 170. 282. <i>fluentia</i> 118.	401. 405. <i>durities</i> 63. 293.
	Ggg 3 flatu

INDEX.

<i>flatus</i> 299. <i>inflammatio</i> 295.	102. 110. 119. 124. 126. 137.
<i>obstructio</i> 150. <i>procidencia</i>	138. 139. 140. 144. 145. 147.
172. 264. 401. <i>strangulatus</i>	154. 155. 157. 160. 162.
29. 33. 48. 113. 123. 155.	168. 169. 171. 172. 174.
282. 290. 313. 316. 401.	190. 196. 199. 202. 206.
<i>strangulatus ex flasibus</i> 337.	224. 239. 247. 255. 260.
<i>Ulcera</i> 159.	263. 270. 277. 287. 298.
<i>Vitro strangulatas excitantia</i>	299. 302. 311. 312. 329.
183. 335. <i>resicientia</i> 299	384. 397. <i>interna viscerum</i>
<i>Vulnera</i> 5. 18. 20. 22. 24. 26.	101. 104. 110. 126. 189.
29. 30. 31. 34. 42. 45. 47.	204. <i>intestinatorum, thoracis</i>
48. 49. 53. 54. 59. 64. 66.	61. à <i>venenatis armis</i> 396. <i>in-</i>
72. 75. 77. 82. 84. 86. 90.	<i>sanabilia</i> 404. <i>vulnerum san-</i>
92. 99. 100. 101. 107.	<i>guinem sistencia</i> 80.

FINIS.

ERRATA GRAVIORA SIC RE- PONITO.

Pagina 2. linea 15. lege *Fegopyron*, *Pimpinella* ib. lin. 16. adde, vt *Millegrana*, *Sedum minimum* &c. ib. lin. vlt. nascuntur, vt *Quercus*, *Abinthium vulgare*, *Artemisa*, *Petroselinum* &c. pag. 5. b. l. 27. *Hidroticum* est. *Sudoriferis* & *pedum lotionibus* additur. p. 11. b. l. 11. *Salenæ*. p. 13. b. l. 24. *Cratæ* p. 17. b. l. 22. solo culto ac læto. p. 24. b. l. 19. *Aleber Sil.* p. 25. a. l. 16. facultatis p. 35. b. l. 11. ad aggeres viz regie circa *Vratislaviam*, & ad arcem *Lehnhaus* pag. 41. a. l. 10. *Benedit Sil.* p. 45. b. l. 31. *Velbaum Sil.* p. 52. a. l. 31. locis. Ad arcem *Lehnhaus* & alibi pag. 56. a. l. 19. *Niesekraut / Klein Flöhkraut* p. 56. b. l. 34. *Schiesbeeren* dele p. 57. b. l. 32. *Ziegenbeine* p. 61. a. l. 3. *Aconitum* *Mattiol.* *Cratoni* ib. post lineam 15. adde. *Aconitum Matthioli nostri hîc (Vratislaviæ)* reperi. *Radix* è terra exempta *Alabastri* modo splendet & caudam *Scorpij* imitatur: sicca, qualis sit apparet. Primo vere colligitur, atq; tunc tanquam *æxus* emittit caulem floribus purpureis: is exeunte *Aprili* perit, itaq; radix amplius reperiri nequit. De folijs nihil dum certi potui cognoscere. Nam superstitione ante *Georgij* diem radicem effodiunt & destillato illius, magno sanè successu, vt ipse de fide dignis hominibus cognoui, contra *Epilepsiam* vtuntur. Certè plus hoc destillatum prodest quàm *Canicæ* pulvis de *Gemmis* atq; *crystallo*. *Crato in epistola manuscripta ad Cons. Gesnerum* p. 62. a. l. 25. *wild Dorant / Niesekraut* ib. b. l. 11. *Zinziber* putatum *Rhizotomis Silesia.* p. 65. b. l. 16. *Geeler Wasser* p. 79. b. l. 7. *Rhellinge* p. 82. a. l. 1. *Wals stroh*

stroh p. 83. b. l. 20. Oupam p. 84. b. l. 8. autumnalis p. 86. b. l. 18. in-
 star, at. p. 87. a. l. 2. *Ischaemum* p. 115. b. l. 12. nascitur caudis ad mon-
 tem arcis Furstenstein. Iulio exerit spicam purpurascentē p. 122. a. l. 15.
 weisse Hirschwurz/Weyrauchkraut/Hirschwurz/ Sil. p. 124. a. l. 15.
 Darrkraut *Vratisl.* Iulio viget. Aduersus tabem multā commenda-
 tionis pag. 127. b. l. 16. tota p. 133. b. l. 19. perpetuū p. 140. a. l. 14.
 canescentes p. 143. a. l. 14. Siegentod / Sil. p. 144. a. l. 25. flosculis
 Maio prata exornat, ib. b. l. 2. gros Habichtskraut p. 162. b. l. 33.
 Silbkraut Sil. pag. 175. b. l. 2. Sieben Fingerkraut p. 178. b. l. 11.
 langer Wasser-Zanenschuß p. 183. b. l. 12. subrubentis genera, magna
 Maio gliscit copia p. 184. b. l. 27. Rubiola p. 186. a. l. 25. *Rubus Idæus*
 fructu candido weisse Hindbeeren. Eiusdem odoris & saporis est, colore
 saltem, qui prorsus candidus, differens. Rarius occurrit in montanis
 territorij Hirsbergensis ib. l. 19. calore, ad intinctus.


Reliqua *σφάλματα*, si qua occurrant, quia propter temporis
 inopiam conquiri & consignari non potuerunt, Lectori a quo tollenda
 relinquuntur.



L I P S I Æ,


IMPRIMEBAT MICHAEL LAN-
TZENBERGER


Anno M. DC.




425

1-6-461







005645834

16